

44371/B

J xxv Roe

Regia Intendenza

DELLA

Provincia di S. Remo

N.º

di Protocollo

Siv.

N.º

del Copia lettere


Risposta alla Lettera

de

N.º

Si ricordi in margine il Numero di Protocollo,
e quello del Copia Lettere.

Una libbra e mezzo d'acqua
distillata.



E L E M E N T I
D' O S T E T R I C I A

DEL DOTTOR
GIO. GIORGIO ROEDERER

TRADOTTI E CORREDATI DI FIGURE IN RAME

DA GIUSEPPE GALLETTI
CHIRURGO FIORENTINO


DEDICATI A SUA ECCELLENZA

M I L O R D
N A S S A U C L A V E R I N G

CONTE DI COWPER, VISCONTE DI FORDWICH,
BARONE DI WINGHAM, E CAV. BARONETTO,
PARI DELLA GRAN BRETTAGNA.



IN FIRENZE MDCCLXXV.



Nella Stamperia già ALLIZZINIANA all' Insegna del Sole.


Con licenza de' Superiori.

THE
OCTOBER
1891
LONDON
PUBLISHED BY
THE
WELL-COME
LIBRARY
1, AVENUE ROAD, LONDON, W.1



THE
OCTOBER
1891
LONDON
PUBLISHED BY
THE
WELL-COME
LIBRARY
1, AVENUE ROAD, LONDON, W.1

22



ECCELLENZA



O', non è vero, che io stimolato e mosso da ambizioso pensiero di adornare, e di arricchire con uno splendore non suo

questa mia piccola fatica , sia stato co-
tanto ardimentoso di porle in fronte
l' autorevole illustre nome di VOSTRA
ECCELLENZA . Può essere , che in altri
tempi taluno abbia pensato così , e avrà
avuto in tal caso le sue non disprez-
zabili ragioni . La tenuità spesse vol-
te , e la picciolezza dell' argomento ,
digiuno in se stesso e nudo o di pub-
blica utilità , o d' interna bellezza ,
spinge l' Autore a rivestirlo , e quasi
diffi impinguarlo di una insolita mae-
stà di Nome , che se non in tutto , in
parte almeno lo ritolga da quella cieca
oscurità , in cui sen' giace . A me non
sembra invero di essere in tali critiche
strettezze ed angustie , trattandosi dell'
Arte Ostetricia ; argomento il quale è
si accreditato nel presente secolo , trat-
tato dai primi Uomini dell' età nostra ,
tanto vantaggioso ai nati , e ai nasci-
turi ,

turi , e tanto alla fine interessante tutta l' Umanità . Confesso ingenuamente però , che questi miei fogli non farebbero giammai stati di mio buon grado pubblicati , ma contenti a sufficienza di servire privatamente di scorta al Traduttore ne' suoi pratici ordinarij esercizi di quest' arte , se l' ECCELLENZA VOSTRA non avesse loro benignamente data la mano , ed incoraggiato l' Autore a far loro godere la pubblica luce . Quel lodevole e nobile spirito , che signorilmente regna in tutta la saggia e dotta Nazione Inglese , di beneficiare altrui , e di diffonder nel Pubblico ciò che al Pubblico stesso può essere di utile e di giovamento , e per cui valicò lontanissimi ignoti mari , visitò i due Poli , fece scoperte , profuse tesori , rese perfette le Arti , e specialmente quella ,

la , che è il soggetto della presente traduzione , e per cui resero il loro nome immortale i famosi Burton , e Smellie , e novellamente il celebratissimo Hunter . Questo stesso spirito , che in modo maraviglioso lampeggia nella degna Persona Vostra , o SIGNORE , e pare tutto in Voi solo rinchiuso e ristretto , fu quell' unico , che mi spinse a divulgar con le stampe questi miei studj , e a dedicargli al Vostro gran Nome . In fatti , a qual' altro mai doveva io consagrargli , che all' ECCELLENZA VOSTRA , che cortese fino dal bel principio gli aggradì , gli patrocinò , e con innata Bontà diede loro in certo modo la vita ?

Essi pertanto a Voi , o SIGNORE , si umiliano come Vostri , e come tali hanno altresì piena sicurissima fiducia , che vogliate continovar loro la vale-

vole

vole Vostra protezione: di che implo-
rando umilmente la gloria, godo in-
tanto quella di potere col più pro-
fondo rispetto dichiararmi

DI VOSTRA ECCELLENZA

Umiliss. Devotiss. ed Obbligatiss. Servit.
GIUSEPPE GALLETTI.

-o q'ni dda ih : noisroq aslo / olon
 -ni obog : aing al onomino dhar
 -oq iig loc onog ih allap dhar
 -oq iig loc onog ih allap dhar

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY



P R E F A Z I O N E .



Tutte le parti della Chirurgia , e tutte le operazioni di mano , debbono con ugual premura ed impegno studiarsi da chiunque aspira di pervenire al possesso, ed alla perfezione dell' Arte . Ordinariamente però succede , che quasi ogni Professore sceglie soltanto una parte , o per genio , o per disposizione naturale , o per consiglio e stradamento altrui , o per desiderio di gloria , o per utilità de' Malati , o propria , o per altri particolari motivi , ed in quella impiega i suoi maggiori studj per riuscirvi eccellente , senza però trascurar punto il resto della Chirurgia . Io per me ho creduto che l' Ostetricia , o dir vogliamo l' Arte di soccorrere le Partorienti , sia della massima importanza e necessità , perchè interessa a un tempo istesso la vita di due persone . Nell' avere io dunque all' Ostetricia indirizzate le mie principali applicazioni , e fatiche , mi sono stati somministrati i maggiori lumi , ed i più concludenti ajuti da questo Libro , di cui a principio io aveva nella Toscana favella trasportato quando uno , e quando un altro dei più interessanti capitoli , e solo per mio studio e comodo particolare , essendomi servito della ristampa Latina fattane in Colonia nel 1763. corretta ed accresciuta dall' Autore medesimo . Veddi

§ §

poi

poi che in questo capo d' Opera tutto era prezioso , che l' Autore aveva sviscerata a fondo ed esaurita la materia , nè eravi che precisione , buon' ordine , chiarezza , e brevità ; soprattutto ho sperimentato in pratica effettivamente veri e utilissimi i di lui insegnamenti in molte operazioni di Parti laboriosi , delle quali io debbo all' indirizzò dell' incomparabile Autore la felicità .

Ritrovandomi pertanto di averlo , quasi senza accorgermene , tutto intiero tradotto , non ho creduto una superfluità il pubblicarlo colle Stampe . Comunque venga ricevuto , io ne avrò se non altro arricchita la nostra lingua nativa , imitando chi ha arricchita la Francese colla traduzione e stampa di esso medesimo Libro in quell' idioma , e chi all' incontro ha trasportato in Italiano la famosa Opera di MAURICEAU .

So bene , che in Italiano vi è non solamente l' Opera nominata di sopra , ma anche un Trattato dell' Eccellentiss. Sig. GIUSEPPE VESPA in 4. Firenze 1761. Altro del Chirurgo Sig. FRANCESCO VALLI di stampa di Parigi dell' anno 1767. in 8. e il recentissimo Libro di M. TANARON , in 3. Tomi in 8. Venezia 1774. oltre le antiche Opere intitolate La Comare di SCIPION MERCURIO , e di SEBASTIANO MELLI . Pur nondimeno io spero che questa mia qualunque siasi fatica , unicamente stimabile per l' intrinseco pregio dell' immortale ROEDERER , non sia per essere disapprovata , ma piuttosto gradita . L' utile che ne risulterà non si restringe ai soli Professori d' Ostetricia , nei casi de' Parti difficili , e scabrosi ; ma molto vi sarà da imparare anche per le stesse Levatrici , qualora realmente come si converrebbe studiassero la loro arte , e particolarmente questi Elementi , relativamente ai Parti naturali , e ordinarij . Esse s' istruirebbero dei loro doveri a fondo , si spoglierebbero d' alcuni pregiudizj pur troppo comuni , e saprebbero evitare il pericolo di rendere difficili per colpa loro molti Parti , che di loro propria natura
tali

tali non sarebbero : ma ciò che più rileva , imparerebbero a distinguer bene quando fosse necessario che si astenessero dall' operare , e di chiamare il Professore , e in quali casi questo possa risparmiarsi , ed esser sufficiente l' opera loro ; e in quali altri l' indugio della chiamata possa riuscire pregiudiziale e pericoloso . (1)

Non è arricchita questa traduzione , che di pochissime e brevi note . E' per altro corredata d' un buon numero di rami ricavati dai più celebri Autori moderni , come SMELLIE , BURTON , e LEVRET . Questo produce il comodo di trovare in un sol Libro , poco meno che quanto contengono di più interessante , in materia di figure , le Opere di questi nominati rispettabilissimi Professori . Ho poi inserito nell' ultimo del Libro la figura e dichiarazione d' un nuovo Istrumento , sul piede d' un meccanismo di mia invenzione , per estrarre la testa del Feto staccata , e restata nell' utero .

E siccome nel corpo dell' Opera sono nominate varie misure Oltramontane , così per maggior comodo del Leggitore si dà qui esattamente il valore di esse , ridotte essendo alla nostra misura Italiana , come appresso .

Il Piede del Reno , o di Leida , ridotto a soldi e danari di braccio nostrale , secondo i rapporti dati da AUZOÛT di soldi 10. e danari $9\frac{2}{3}$

Il Pollice di esso piede è di danari 10. e $\frac{5}{6}$

La linea di questo piede è di $\frac{7}{8}$ di danaro .

Il Piede Reale di Parigi ridotto a soldi e danari di braccio come sopra , secondo i rapporti più precisi dedotti dalla Tesa portata in Toscana da M. DE LA CONDAMINE , è di soldi 11. e denari $1\frac{7}{10}$

Il pollice del medesimo piede Reale è di danari 11. e $\frac{7}{5}$

La linea di esso piede è di $\frac{23}{2}$ di danaro .

Il Piede Inglese , o di Londra , secondo il mentovato

§ § 2

AU-

(1) Veggasi l' Istoria , o Caso relativo a quanto quivi si dice a pag. 293.

AUZOÛT ridotto a soldi e danari di braccio parimente nostro è di soldi 10. e danari $5\frac{1}{5}$

Il pollice del piede Inglese medesimo è di $10\frac{13}{30}$

La linea di un tal piede è di $\frac{43}{50}$ di danaro.

Notifi che per braccio nostrale, altro da noi non s' intende, che il braccio ordinario a panno Fiorentino.

In ultimo a questa Prefazione serva di aggiunta una notizia, per la quale il Pubblico non può essere indifferente.

La traduzione di ROEDERER, che mi ha da lungo tempo occupato, e non altro teneva presente al mio spirito che idee d' Ostetricia, risvegliommi il pensiero di fare una serie di Preparazioni, o Modelli in terra cotta, e parte anche in cera, per rappresentare le diverse specie dei Parti, sì naturali, che laboriosi; la qual serie incominciata da me ad eseguirsi, si trova presentemente quasi perfezionata. Queste configurazioni sono tutte al naturale, sì nella grandezza, che nel colorito, e pongono sotto gli occhi, caso per caso, tutto ciò che può interessare la teoria, e la pratica degli Studenti. Oltre le parti muliebri esterne, ed interne, e le diverse situazioni del feto, e della madre, vi si vedono espresse ai loro luoghi le espansioni e le contrazioni dell' utero, le conformazioni viziose della pelvi, la qualità e l' azione dei ferri, e le impressioni che fanno sulle parti del Feto, e della Partoriente, nell' atto che essi agiscono in mano dell' Operatore. Non manca altresì, dove occorre, la figura e l' atteggiamento della mano operante quando non bisognano ferri. Vi è perfino alcuna di queste preparazioni dove si esprimono, pure al naturale, quando l' una, e quando l' altra dell' interne parti dei Feti. Mi lusingo che il corredo di tutte queste Modellature potrebbe a suo tempo riuscir vantaggioso per chi volesse dare delle lezioni, o de' corsi intieri, in sì fatto genere di studi, e come, piacendo al Cielo, dandosi un sufficiente numero di Studiosi concorrenti, vorrei sperare di privatamente poter dare in mia Casa.

Ed ecco alquanto appianata e resa comoda la via a tutti quelli, che volessero applicarsi di proposito ad una parte di Chirurgia, quanto scabrosa, altrettanto utile e necessaria. Qualunque poi sia l'incontro, che avranno appresso il Pubblico queste mie fatiche, dirò colla indifferenza ed espressione del Poeta:

Che voler ciò curare è bassa voglia.



T A V O L A

DE' CAPITOLI.



Cap. I.	D ella pelvi ossea .	Pag. I. §.	I.
Cap. II.	Dell' utero nello stato di verginità .	II. §.	33.
Cap. III.	Dell' utero gravido .	15. §.	49.
Cap. IV.	Dell' uovo .	21. §.	68.
Cap. V.	Della teoria del parto .	31. §.	93.
Cap. VI.	Della verginità .	36. §.	115.
Cap. VII.	Della gravidanza .	42. §.	126.
Cap. VIII.	Del parto .	53. §.	164.
Cap. IX.	Dello stato dell' utero dopo il parto .	66. §.	199.
Cap. X.	Della divisione del Parto .	69. §.	209.
Cap. XI.	Del riscontro .	85. §.	253.
Cap. XII.	Di quelle cose , che si debbono praticare nel parto .	89. §.	263.
Cap. XIII.	Di quello che si deve fare nel Parto difficile .	113. §.	324.
Cap. XIV.	Dello staccamento della placenta .	118. §.	343.
Cap. XV.	Dei segni del feto vivo , e morto .	128. §.	370.
Cap. XVI.	Condotta che si deve avere nel parto preternaturale .	134. §.	391.
Cap. XVII.	Del parto difficile , e preternaturale nel caso che il feto si presenti col capo .	145. §.	413.
	Sezione I. . . . a cagione della mole del capo .	145. §.	414.
	Sezione II. . . . A cagione della situazione obliqua dell' utero .	163. §.	449.
	Sezione III. . . . per causa di pessima situazione del capo .	184. §.	508.
	I. . . . La faccia è diretta verso le ossa del pube .	184. §.	509.
	II. . . . Si presenta prima la faccia .	185. §.	515.
	III. . . . La faccia è posta a traverso .	189. §.	529.
	IV. . . . Il feto è voltato in un lato .	190. §.	533.

Se-

Sezione IV. . . . Per qualche ostacolo,
che si ritrovi nel corpo del feto . Pag. 193. §. 543.

I. . . . Il cordone ombellicale avvolto
intorno al collo del feto . 194. §. 544.

II. . . . Il tralcio troppo corto . 197. §. 554.

III. . . . Spalle troppo larghe . 198. §. 557.

IV. . . . Allorchè il fanciullo ha le
braccia incrociate sul suo dorso . 198. §. 561.

V. . . . Dal basso ventre del feto gonfio
di aria , o di umore . 199. §. 564.

VI. . . . Quando si trovi esservi due
feti tra loro attaccati , o veramente
un feto solo , ma ricresciuto di qual-
che membro oltre il numero ordinario . 200. §. 567.

Sezione V. . . . A cagione di qualche
vizio dell' utero , o della vagina . 202. §. 571.

I. . . . Il tronco del corpicciuolo è ritar-
dato per la contrazione dello sfin-
tere dell' utero , o della vagina . 202. §. 571.

II. . . Prolasso dell' utero , o della vagina . 203. §. 576.

III. . . L' utero si rovescia dopo il parto . 205. §. 583.

Sezione VI. . . . Del capo staccato
dal tronco . 207. §. 588.

Cap. XVIII. Del parto difficile , e preternaturale per
causa che il fanciullo si presenti con
altra parte del suo corpo , fuori della
testa . 209. §. 591.

Sezione I. Del parto detto agrippino . 209. §. 591.

Sezione II, Del parto difficile , e pre-
ternaturale a cagione , che il feto si
presenti colle ginocchie voltate verso
la bocca dell' utero . 216. §. 609.

Sezione III. . . . a cagione , che il fan-
ciullo presenta le natiche alla bocca
dell' utero . 217. §. 612.

Sezione IV. . . . A cagione della situa-
zione trasversale del feto . 221. §. 622.

I. . . . Il collo presentatosi il primo . 223. §. 628.

II. . . . La spalla , e la scapula . 224. §. 631.

III. . . . Il braccio . 224. §. 633.


IV. . . . Il petto . 227. §. 649.

V. . . . Gl' ipocondrij , e il basso ventre . 228. §. 652.

VI.

	VI. . . . Il dorso .	Pag. 228. §. 655.
	VII. . . . I fianchi .	229. §. 659.
	Sezione V. Del metodo da tenersi per estrarre il capo staccato dal corpo, e restato nell' utero.	230. §. 661.
Cap. XIX.	Del parto difficile, e preternaturale a cagione del venir fuori il tralcio ombellicale.	234. §. 674.
Cap. XX. Per motivo di perdita di sangue.	235. §. 680.
Cap. XXI. A cagione delle convulsioni che sopraggiungono alla partorienti.	240. §. 690.
Cap. XXII.	Del parto dei due feti.	244. §. 701.
Cap. XXIII.	Dell' aborto.	248. §. 716.
Cap. XXIV.	Sezione I. Della mola.	255. §. 737.
	Sezione II. Dei concepimenti spurj.	257. §. 747.
Cap. XXV.	Delle diverse parti del corpo, nelle quali alcuna volta contro il con- suetto accade che si faccia il con- cepimento, siccome delle vie o ma- niere per le quali in tali casi si viene a capo di partorire; e delle conseguenze di questi parti.	258. §. 751.
	Sezione I. Del feto concepito fuori dell' utero.	258. §. 751.
	Sezione II. Del feto che esce per qual- che strada insolita.	263. §. 761.
Cap. XXVI.	Dell' operazione di tagliare, o sia di mettere in pezzi il feto nell' utero.	267. §. 772.
Cap. XXVII.	Del parto cesareo.	269. §. 776.





ELEMENTI

DELL' ARTE


DI RACCOGLIERE I PARTI

PER USO

DI LEZIONI PRELIMINARI.

CAPITOLO I.

DELLA PELVI OSSEA.

§. 1.  E parti, tra cui è racchiuso il Feto da darfi in luce, e per cui è costretto a passare, sono *la Pelvi Ossea, l' Utero, e l' esterne Parti genitali.*

§. 2. La struttura di queste, e l' esecuzione, o pratica dell' arte di raccogliere i Parti, non solo sono cose necessarie a sapersi dal principiante, ma è necessario inoltre, che il medesimo conosca alcune cose più specifiche fra esse.

§. 3. La cavità della pelvi ossea al di sopra, e al di sotto è aperta: *L' apertura superiore* si forma dalla prominenza degli ossi del pube, dalla eminente linea degli ossi ilei, e dalla prima vertebra dell' osso sacro. La

A.

cir.

circonferenza di questa , forma quasi una linea ellittica , il di cui asse maggiore , o trasverso, principia da uno degli ossi ilei fino all' altro : l' asse coniugato poi , ovvero la minore distanza, rilevasi dalla sinfisi degli ossi del pube, fino all' osso sacro.

§. 4. *L' apertura inferiore* è formata dall' arco degli ossi del pube, e dai rami, e dalle protuberanze de' medesimi ossi del pube, e degl' Ischj, dai ligamenti sacro-ischiatici, e dall' osso del coccige . La circonferenza di questa non ha una curvatura tanto regolare, come l' ha certamente la superiore; ma se vogliasi considerare in qualche modo ellittica , allora l' asse coniugato , o sia la minore distanza è dall' arco degli ossi del pube, fino all' osso del coccige ; l' asse poi trasverso, o sia la maggior distanza , è dall' uno all' altro degli ossi dell' ischio .

§. 5. La linea perpendicolare , che parte dal mezzo dell' asse trasverso dell' apertura inferiore, e passa pel mezzo della cavità della pelvi, forma *l' asse della pelvi* . Prolungato questo fino all' incontro con una linea orizzontale , vi cade sopra obliquamente verso la parte posteriore, e forma colla medesima linea un angolo acuto .

§. 6. In fatti se nella pelvi d' una fanciulla si tirino due linee perpendicolari ad un medesimo piano orizzontale , una dall' arco degli ossi del pube, un' altra dall' estremità dell' osso del coccige , si scuopre maggiore essere la distanza dell' osso del coccige dal piano orizzontale medesimo, di quella dell' arco degli ossi del pube; ed è certamente la prima maggiore dell' altra di un pollice, e mezzo . Onde se s'immagini un triangolo rettangolo, l' ipotenusa del quale sia l' asse dell' apertura inferiore della pelvi, il cateto differenza delle distanze, fattone il calcolo secondo le leggi di Trigonometria , si trova essere uno degli angoli acuti di 72. gradi in circa (1).

§. 7.

(1) Il calcolo per ritrovare il Ortogonio Triangolo, si fa col mezzo dei Logarimi molto più facilmente,


§. 7. In questa maniera stà la pelvi della donna, dalla quale è differente quella dell' uomo. Imperciocchè nella pelvi virile.

- A. L'apertura superiore, più stretta di quella della donna, è terminata da tre lati curvilinei, che sono continuati fino all'apertura inferiore, e dal di sopra occupano spazio maggiore, minore al di sotto: Gli angoli si formano dalla sinfisi degli ossi del pube, e dalla congiunzione degli ossi ilei coll'osso sacro.
- B. Le tuberosità degl' ischj, insieme co' femori, sono più discosti nelle donne, che negli uomini.
- C. Dal che ne nasce, che tutta la capacità della pelvi virile sia minore della femminile.
- D. I rami degli ossi del pube nella pelvi virile, si uniscono formando un angolo acuto: nella femminile poi la sinfisi, la quale è formata da una cartilagine più grossa, fa un arco largamente scavato.
- E. L'osso sacro delle donne è più largo, e più convesso dalla parte di dietro; quello degli uomini poi è meno largo, e più piegato al di dentro.

A 2

L'osso

mente, ed anche più esattamente di quel che si trova nel Programma dell'Autore = *De Axi Pelvis* = inserito nella Raccolta dei suoi Opuscoli Medici. Sia in fatti il Triangolo Rettangolo A B D, in cui per le fissate misure sarà



l'Ipotenusa AD, di = 5 = Pollici, ed il Lato o Cateto AB, di Pollici = $1\frac{1}{2}$ =. Dunque per togliere le

frazioni sarà AD, rappresentata dal numero = 10 =, ed AB, da = 3 = che però per i canoni Trigonometrici trovando nelle Tavole il Logaritmo di = 3 = cioè 0, 4771213, e sommandolo col Logaritmo del Seno tutto, o del Raggio 10, 0000000, avremo per somma 10, 4771213, da cui sottratto il Logaritmo di = 10 = 1, 0000000, il residuo 9, 4771213, sarà il Logaritmo del seno-retto dell' Angolo ADB, che mostreranno le Tavole di $17^{\circ} 27'$, prossimamente, il di cui Complemento DAB, ovvero DOQ, sarà in conseguenza di $72^{\circ} 33'$

72° 33'

F. L' osso del coccige delle femmine è più mobile, e si stende meno dalla parte d' avanti, che negli uomini.

G. La superficie, o faccia larga degli ossi ilei nelle femmine è più estesa, e depressa. Laonde gl' ilei larghi, le coscie molto distanti, le natiche molto protuberanti, indicano una pelvi ben formata, e perciò una buona disposizione della donna per facilmente partorire.

§. 8. La pelvi femminile così dalla natura formata, è adattatissima, affinchè il feto al tempo del parto possa venire alla luce. Imperciocchè l'apertura superiore in una pelvi ben formata, avendo un asse trasverso di quasi 5. pollici e mezzo del Reno (Tav. I. Fig. 1. Tav. II. Fig. 2.) il di cui coniugato è di 4. e mezzo (Tav. I. Fig. 1. Tav. II. Fig. 1.) (1) ed il capo del feto di una giusta proporzione, e compresso dalla forza de' dolori, colle sue dimensioni, non eccedendo le sopradette, il feto può certamente avere libero ingresso, e passaggio per quest' apertura. L' aperture della pelvi sono un poco minori del capo, acciò che non scenda l' utero insieme col capo, non compresso (Tav. I. Fig. 3. e 4.). Il maggior asse ancora riceve senza ostacolo agli ossi degl' ilei gli omeri del feto ben disposto, benchè sieno più larghi del capo; perchè quest' asse supera la distanza di un orecchio dall' altro nel feto.

§. 9. La concavità fatta dall' osso sacro coll' osso del coccige, forma un piano inclinato, nel quale il capo cala lentamente, e moderatamente, senza precipitare, e senza lacerare le carni, che circondano l'apertura inferiore della pelvi; il qual piano ancora dirige l' occipite, insieme colla vescica dell' amnio verso l' apertura del seno esterno, che è anteriore all' asse della pelvi.

§. 10. Benchè poi minore sia l' apertura inferiore dalla
su-

(2) Per maggior chiarezza si riducono queste dimensioni del Reno, come anco le Inglesi, e le

Francesi alla misura Fiorentina; e tutte sono riportate nella Prefazione.

superiore, a cagione del suo asse trasverso, che di rado supera 4. pollici (Tav. I. Fig. 2. Tav. II. Fig. 2.) e dell' asse coniugato, che non arriva a 4. pollici (Tav. I. Fig. 2. Tav. II. Fig. 1.) nondimeno queste misure bastano; poichè l'osso del coccige cede verso la parte posteriore, per dilatare l' asse coniugato inferiore, ed il maggior asse lascia passare gli omeri del corpicciuolo stretti, e compressi dalla forza de' dolori, e dagli ossi della pelvi. Se ciò non fosse, la troppa ampiezza dell' apertura inferiore non averebbe arrecato il beneficio del piano inclinato (§. pr.). La troppa distanza ancora degli ischj averebbe fatto coll' acetabulo un' articolazione ai femori meno conveniente, i quali ischj però, ed i femori stessi essendo più distanti nelle donne, che negli uomini, suole quindi avvenire, che sian meglio disposti a reggere l' utero gravido.

§. 11. Nulladimeno, acciocchè non sia troppo angusto lo spazio dell' apertura inferiore, gli ossi sacro, e coccige, sono più distanti dalla sinfisi degli ossi del pube nelle donne, che negli uomini. L' ossa del pube accomodate in forma d' arco, comodamente ricevono il rotondo occipite, e a guisa d' ipomoclio, o sostegno, lo fermano talmente, che l' altre parti del capo possono reprimere il perinèo coll' osso del coccige, acciò esso a poco a poco esca fuori. Per la superiore espansione degli ossi ilei, vien preparata all' utero gravido una sede più libera, e più comoda.

§. 12. La pelvi che si sosta dalla forma fin' ora descritta, è meno idonea, e men disposta a tutte queste funzioni, e quella pelvi per altro si stima particolarmente viziosa;

A. La quale, se s' abbia riguardo alla proporzione di tutto il corpo, è piccola, sia poi nel resto ben formata, o nò. Suole alle volte essere simile a quella dell' uomo, e ciò si conosce dalle natiche più depresse, e dagl' ilei più stretti. La diligente osservazione ci manifesta l' altre specie.

- B. Viziosa è quella, nella quale gli ossi del pube son tanto approssimati all'osso sacro, che si diminuiscono, gli assi coniugati di tutte due l' aperture, e in questa guisa l' una, e l' altra apertura si rende angusta: come pure l' ossa del pube, essendo troppo spianate, o curve all' indentro verso l' osso sacro. La pelvi di tal sorta si chiama comunemente *compressa*.
- C. Viziosa è quella in cui l' osso sacro insieme coll' ultima vertebra de' lombi, forma un angolo troppo acuto, e avanzato verso gli ossi del pube, e che retringe per questo l' apertura superiore.
- D. Quella inoltre, la cui superiore apertura ha la dovuta proporzione, l' inferiore poi è resa angusta dall' osso sacro, e dall' osso del coccige; cioè quando questi ossi si piegano troppo indentro. Peggior si rende questa forma, se aggiungasi l' immobilità dell' osso del coccige. Alle volte infaustamente il vizio B, si unisce al vizio C, e al vizio D.
- E. E' viziosa la pelvi quando l' apertura inferiore peccata talmente da' lati, che le tuberosità degl' ischj siano troppo vicine, e l' arco degli ossi del pube non sia bene scavato. Il superiore vizio D, si unisce talora a questo.
- F. Quando in fine la tuberosità dell' osso sacro nella donna gobba, piega verso l' uno, o l' altro lato. A cagione de' vizj descritti, l' aperture della pelvi alle volte si rendono anguste fino a due, o tre pollici. (Tav. III. Fig. 1.)

§. 13. Varie sono le cagioni di questo male, fra le quali si possono riferire, la originale alterata conformazione delle parti, il sito, e lo sconcio portamento della ragazza, la troppa debolezza, e mollezza dell' ossa, e la rachitide nella prima gioventù.

§. 14. Viziosa ancora, benchè in minor grado, si dee giudicare la pelvi troppo ampia. Il difetto ritrovasi o alla superiore, o all' inferiore, o a tutte due l' aperture, e
fin-

ſingularmente a' diametri coniugati di queſte. Queſto vizio ha origine dalla prima conformazione.

§. 15. Molti fra i più antichi Autori, d' altronde autorevoliffimi, affermano, che gli oſſi della pelvi ſi ſcoſtano nel parto, ma la maggior parte dei moderni non accordano queſta coſa.

§. 16. Gli oſſi della pelvi hanno tre articolazioni; la prima è quella degli oſſi del pube; la ſeconda connette l' oſſo ſacro cogli oſſi ilei; la terza è quella per cui il coccige è unito all' oſſo ſacro.

§. 17. L' oſſa del pube fra di loro, e l' oſſo ſacro, cogli oſſi ilei ſtanno uniti per mezzo della ſincondroſi, che è una ſpecie d' articolazione immobile, per cui fra l' oſſa del pube, e gli oſſi degl' ilei, e il ſacro, ità attaccata una cartilagine ferma, groſſa, conſiſtente, e nata colla ſteſſa ſoſtanza dell' oſſo, anzi piantata nelle foſſette degli oſſi, e ricevente a vicenda le loro prominenze. Queſta cartilagine è più groſſa fra gli oſſi del pube, che fra gli oſſi degl' ilei, e l' oſſo ſacro. Il perioſtio, e i forti ligamenti fermano queſt' unione ſtabile, e conſiſtente.

§. 18. In queſta guiſa ſi rendono affatto immobili queſti oſſi: Imperciocchè la cartilagine non ſi muove ſopra l' oſſo vicino, ſtando fermamente unita al medefimo, nè ſopra le proprie parti, che furono inſieme attaccate con una unione troppo tenace, e ſtretta. Il perioſtio, e i ligamenti impediſcono, che la cartilagine ſi ſeparì dagli oſſi.

§. 19. Per la loro natura adunque, e per la loro congiunzione, non ſi ſeparano queſte oſſa. Acciocchè poi ſi tolgano queſte unioni, è neceſſario che concorrano una violenza eſterna, o un maggiore aumento delle cartilagini.

§. 20. Se a caſo ſuccede, che violentemente ſi rompano, è neceſſario, che ne ſegua il vacillar della baſe di tutto il tronco, e che perciò i piedi della partoriente, e
tutto

tutto il suo corpo non possa far bene il suo officio ; e non può addivenire, che anche con le dita non si riscontri una patente apertura fra le ossa scostate : Le Partorienti in questo caso sogliono per lo più morire . Nè l'una, nè l'altra di queste cose si osserva , dopo compito il consueto parto ; non si sente l'apertura , nè la partorienti è impedita dal camminare , e reggere il corpo , nè sopravvengono altri sintomi , che dimostrino lussazione , o frattura .

§. 21. Concludiamo adunque che quest' ossa nel parto non si scostano violentemente , mancando principalmente la forza , che produr possa questa violenta separazione . Il capo certamente del feto spinto da' dolori dentro la pelvi , ha gli ossetti non tanto congiunti , i quali con minor forza si muovono sopra loro stessi , anzi prima si rompono , che si sciolga l' articolazione degli ossi della pelvi . Aggiungo che di rado la forza de' dolori impellenti è tanto grande , da potere sciorre queste articolazioni , benchè sia robustissimo il capo del feto .

§. 22. Rarissimi sono i casi che dimostrino questa forza sì grande , la quale sia proporzionata , e bastante a separare questi ossi . Allora forse ciò potrebbe accadere quando le cartilagini colleganti hanno tale disposizione , che facilmente si scostino , e il perioftio , e i ligamenti sieno moltissimo rilassati : ciò può accadere alla donna di temperamento cachettico , o travagliata dal morbo venereo , e scorbutico , quando questi mali sieno in sommo grado . Che se avendo questa disposizione sopraggiungono i dolori più gagliardi , o il capo del feto sia troppo grande , o obliquo , o si presentino le natiche , senza dubbio pare che le ossa della pelvi si discostino .

§. 23. Può produrre il medesimo effetto la violenta estrazione del feto fatta colla mano , specialmente quando è mostruoso . Questi casi più rari di malattia , e di violenza , non bastano a distruggere il mio sentimento .

§. 24. Molto più specioso è l' argomentare di coloro, che con gli antichi stabiliscono, che il mucco abbondantissimo nel tempo del parto ammolisca le cartilagini, e rilassi così le fibre, che il capo in esse venendo spinto possa stenderle.

§. 25. Ma queste ragioni vacillano, perchè non si può dimostrare la strada, che conduca alle cartilagini questo mucco, il quale si trova all' orifizio dell' utero, e si separa nella vagina, e nel seno esterno; che anzi neppure basta ad ammolire quelle fibre cartilaginose per renderle capaci di allungamento. Manca ancora in quel tempo stesso, in cui è grandissimo il di lui uso. Imperciocchè nel parto difficile, in cui il capo del feto spinto negli ossi della pelvi rimane serrato, cessa di separarsi, e le parti si seccano, s' infiammano, s' irrigidiscono; nel tempo poi in cui si separa, ed è pronto, resta come superfluo.

§. 26. Nell' utero gravido concorre maggior copia di umore, e adesso vicine sono l' ossa della pelvi; onde non si dee dubitare, che anche queste non siano bagnate da più copioso umore. Quindi n' è insorto, che un certo Autore moderno stabilì, che le fibre delle cartilagini si distendano, e si dilati la pelvi.

§. 27. Che se poi la donna gravida non sia da malattia particolare (§. 22.) travagliata, e sia giunta al termine della sua gravidanza, la resistenza delle fibre ossea, e cartilaginose è maggiore, o almeno eguale all' impulso degli umori concorrenti, laonde rimane ancora la medesima misura delle cartilagini, e degli ossi.

§. 28. Fingasi nulladimeno, che le ossa sieno allargate; la distanza delle ossa del pube dal sacro non farà maggiore; essendo laterale l' unione e degli ossi del pube, e dell' osso sacro cogli ossi degl' ilei, di modo che essendosi allungate le fibre delle cartilagini, il solo asse maggiore divien più lungo (§. 3.); e questo certamente, se si paragoni col tardo aumento del corpo adulto, non sarà molto grande.

§. 29. Per questo nè gli ossi del pube, nè gli ossi degl' ilei si separano dal sacro nel parto, se non (§. 22.) rarissime volte.

§. 30. Differente poi è la ragione dell' osso del coccige. Che sia mobile nelle donne lo dimostrano primieramente,

- A. L'istesso meccanismo dell' articolazione, la quale si fa coll' osso sacro per mezzo di una cartilagine flessibile, e degli articoli delle apofisi oblique da ambe le parti, mobili alcuna volta colle rispettive simili prominenze dell' osso sacro.
- B. La stessa osservazione fatta nei vivi, e nel cadavere recente, la quale fa vedere, nelle donne le quali hanno alcuna volta partorito, potersi mandare indietro, o rimuovere per la dimensione d' un pollice.
- C. Se non fosse mobile, farebbero superflui i muscoli coccigei; l' uso de' quali per altro è di far tornare nel suo stato primiero il coccige, rimosso che fosse di luogo.

§. 31. Adunque non si può mettere in dubbio la mobilità dell' osso del coccige. Ancora l' asse coniugato minore dell' ampiezza del capo, e l' inferiore minore del superiore, fa che nel parto maturo il medesimo osso, insieme col perinèo; e coll' ano più o meno ceda. Tuttavia non si dee considerare nel parto naturale come un insolito impedimento, quando per lo più obbedisce alle sole forze de' dolori, e al capo che scende in un piano inclinato.

§. 32. Diviene più grave l' ostacolo dell' osso del coccige, da superarsi dalla forza de' più vigorosi dolori, o dall' arte, tutte le volte che l' asse coniugato inferiore è vizioso, o la parte presentata si è troppo grande, ovvero obliquamente voltata verso la parte posteriore, cose tutte che rendono il parto difficile. (1)

CA-

(1) Per acquistare l' idea più luminosa, e precisa di tutto ciò che

ha rapporto alle proporzioni, ed al sito degli ossi, che compongono

CAPITOLO II.

DELL' UTERO NELLO STATO DI VERGINITA'.

§. 33. **L'** Utero , organo principale della generazione, resta situato nel mezzo della pelvi, tra la vescica orinaria, e l'intestino retto, e rappresenta la figura di una fiaschetta schiacciata. Davanti, e di dietro è leggermente arcato: lateralmente è terminato da due linee curve, le quali verso le parti inferiori a poco a poco accostansi insieme: nel prolungarsi vanno formando il collo, il quale termina in un cono troncato, forato nel mezzo da una fessura trasversale. (Tav. V. Fig. 1.)

§. 34. La maggior larghezza dell' utero resta dove s' inferiscono le tube Faloppiane. Si finga ivi l' utero tagliato trasversalmente: il solido prodotto superiormente a questa sezione, si chiama il *fondo dell' Utero*. Da questa immaginaria sezione si passi ad un' altra pure immaginaria, la quale si concepisca trasversale nel luogo dove è la minore larghezza dell' utero, ed il solido, che è di mezzo a queste due immaginarie sezioni forma il *corpo dell' utero*. Il resto che rimane sotto questa sezione, si chiama *cervice*.

§. 35. Quella parte della cervice, che si avvanza dentro la vagina, si chiama *l' orificio dell' utero*, o *bocca di tinca*, la di cui figura trasversale, si suole chiamare *l' apertura esterna dell' orificio dell' utero*. (Tav. V. Fig. 3. lett. c.)

§. 36. La figura del fondo è arcata: tirate adunque delle linee perpendicolari da questa curva alla prima sezione immaginaria (§. 34.) la massima distanza si trova

B 2

nel

no la Pelvi, basta sol consultare l' Opera di Monsieur André Levret, che ha per titolo = L' art des accouchemens, démontré par des principes de physique, et de me-

chanique; pour servir d'introduction, et de base à des Leçons particulières = Part. I. Cap. I. Art. I. Sect. I. e seg.

nel mezzo fra la sezione immaginaria , e il vertice dell' utero ; la minima poi nel margine all' inferzione delle tube . Quindi ancora nel mezzo del fondo si trova la massima grossezza del fondo medesimo , che è di quasi quattro linee : la minima poi è all' inferzione delle tube , e non forpasse che una , o due linee .

§. 37. La figura del corpo dell' utero è conoidea troncata, la di cui base resta alla prima sezione immaginaria, e il vertice troncato alla seconda dove principia la cervice . Questa base , e vertice troncato , sono di figura ellitticoidea , e quindi anche tutte le sezioni di mezzo hanno la medesima figura .

§. 38. La figura ancora del collo è conoidea doppia , poichè è più larga nel mezzo , ed indi più sottile nel fine , per modo che rassomiglia a due coni troncati uniti nel mezzo insieme colle basi ; un vertice troncato de' quali , coincide col vertice troncato del corpo dell' utero , l' altro poi liberamente si avvanza , e pende nella vagina .

§. 39. Intorno alla più grossa parte della cervice è attaccata la vagina , talmente che il cono troncato inferiore lungo quattro , o cinque linee , ed alle volte anche più , è somigliante ad una proboscide , o muso d' un cagnolino nato di corto , che tutto entri nella vagina . Questo stesso cono si chiama l' orifizio dell' utero , la di cui cognizione è il punto principale dell' arte ostetricia .

§. 40. L' interna figura dell' utero non corrisponde punto all' esterna , non essendo tanto ampia , e rotonda , ma piccola , e compressa . Il fondo cuopre al di sopra la cavità , dai lati la circonda il corpo , al di sotto il canale termina dentro la cervice . Quindi ne nasce , che la cavità sia di figura triangolare , il lato superiore del qual triangolo , costituisce il fondo dell' utero , i lati poi vengono a formare il corpo . Questi lati del triangolo non formano superficie alcuna , ma soltanto linee : per la qual cosa la cavità dell' utero in ogni parte del suo giro è
acuta

acuta per tal maniera, che il piano anteriore col posteriore forma un angolo acutissimo, o una piegatura acuta, non già rotonda, o scavata. Nello stesso modo è il canale continovato nella cervice, donde nasce ancora la fessura trasversale dell' orifizio. Quindi non si dà nell' utero niente di vuoto, posando scambievolmente il piano anteriore sopra il posteriore. Nè i lati del detto triangolo sono rettilinei, ma piuttosto curvilinei, le convessità de' quali si partono in dentro verso la cavità dell' utero.

§. 41. La linea che si concepisce tirata da una inserzione delle tube all' altra, è l' *asse trasversale dell' utero*. La linea che perpendicolarmente posa nel mezzo di quest' asse, e così passa per il mezzo dell' utero, è l' *asse longitudinale del medesimo*. (Tav. II. Fig. 1.)

§. 42. Giacchè dunque quest' asse longitudinale passa per il mezzo della fessura trasversale, la direzione di questa trasversale apertura determina la direzione dell' asse longitudinale.

§. 43. Quest' asse è lo stesso di quello della pelvi (§. 5.) e l' osservazione fatta nelle vergini, e nel parto naturale, ci convince di questo.

§. 44. Al contrario l' asse della vagina non corrisponde coll' asse dell' utero, e della pelvi, ma fa col medesimo un angolo verso le parti anteriori del corpo. Che se la distanza dell' arco degli ossi del pube all' estremità dell' osso del coccige, si prenda di cinque pollici, il centro dell' orifizio vaginale è distante dall' arco degli ossi del pube un grado, ed un minuto primo; dal centro poi dell' apertura inferiore per cui passa l' asse, è distante un grado, e cinque minuti primi. Il detto centro inoltre dell' apertura inferiore, affatto coincide col centro dell' ano per modo, che l' asse della pelvi passa pel centro dell' ano.

§. 45. La principale sostanza dell' utero è composta di fibre motrici, e di vasi portanti gli umori, ai quali si ag-
giun-

giungono i nervi. (1) Le dette fibre sono fornite di molta elasticità, la quale rimane ancora per qualche tempo dopo la morte, e sono fornite di più di una forza particolare, per cui essendo irritate sono stimolate a contrarsi. Sono strettamente ammassate, e tanto più lo sono, quanto più trovansi distanti dal fondo, di maniera che avendo riguardo alle diverse parti dell' utero (§. 34.) sono di una connessione floscissima nel fondo, più fortemente riunite nel corpo, di vantaggio ancora nella cervice, e all' eccesso nell' orifizio, di maniera che quivi riduconsi a rappresentare una cartilagine.

§. 46. Per questa ragione l' orifizio uterino in una vergine esaminato col tatto, si riscontra compatto, sodo, e quasi simile alla cartilagine, in tutto il suo giro liscio, e levigato. Il diametro di esso suole essere di sei linee e qualcosa di vantaggio, in lunghezza poi, è di sette, o otto linee, ovvero di lunghezza, come la dimensione del dito minimo nell' articolazione prima. Occupa esso orifizio la sommità della vagina, per modo che appena si può toccare col dito: discende poi più in quelle donne che hanno i loro mestruai, o che hanno più frequentemente fatto uso venereo. Liberamente pende dentro la vagina, di maniera che si può sentire col dito tutto il giro di esso. La vagina sale un poco più verso l' osso sacro, e si connette colla cervice dell' utero più in alto; per la qual cosa in tal posto l' orifizio dell' utero resta più lontano, che dalla parte che guarda l' osso del pube.

§. 47.

(1) Molte e varie sono le opinioni circa la sostanza dell' utero, perchè alcuni dissero essere carnosissimo - nerveo, altri spugnoso, muscolare, vascolare, e cellulare ec. Ma il Sig. Azzoguidi PP. di Medicina in Bologna colle sue diverse, e molte esperienze ultimamente fatte ha rilevato non essere la sostanza del medesimo muscolare,

nè vascolare, nè cellulare; ma bensì un intreccio di vasi, di tela cellulare, e di fibre muscolari, con questa particolarità, che di queste fibre muscolari molte poche ve ne sono, e sparse, chi longitudinalmente, trasversalmente altre, e qualcheduna circolarmente.

§. 47. La fessura trasversale dell' orifizio verginale è quasi rettilinea; senza alcuna notabile incisura, o cicatrice: si prolunga nel canale della cervice (§. 40.) la di cui interiore estremità si chiama *l'apertura interna dell'orifizio uterino*, la quale per questo riguarda la cavità del medesimo, laddove l'esterna si apre nella vagina. (§. 35.) Nelle vergini, i piani dell'utero sovrapposti perfettamente combagiano (§. 40.): Quindi i canali della cervice, e della sua apertura sono del tutto fra di loro combagianti, nè si possono scostare le labbra se non per la parte esterna col dito, e l'ajuto dell'ugna.

§. 48. Nell'orifizio dell'utero sogliono distinguersi due *labbri*, uno *anteriore*, *posteriore* l'altro; il primo guarda l'osso del pube, il secondo è rivolto verso l'osso sacro. Questi nascono dall'estremità de' due piani dell'utero. Il labbro anteriore è alquante linee più lungo del posteriore. (Tav. V. Fig. 2.)

C A P I T O L O III.

DELL' UTERO GRAVIDO.

§. 49. **Q**ui non appartiene il trattare della teoria della generazione; potrà però chiunque professa l'arte ostetricia prendere alcuni dati, o lumi di fisiologia, per poter meglio conoscere le mutazioni dell'utero gravido.

§. 50. Subito dopo il concepimento appena, si osserva alcun cangiamento nell'utero; indi apparisce una specie di piccolo uovo affai tenero, che racchiude un piccolo embrione nella sua cavità piena di liquore, ed è coperto d'una tunica villosa.

§. 51. Quindi sul principio l'utero non soffre veruna mutazione di figura, e nel primo tempo dopo il conce-
pi-

pimento l'orifizio dell' utero nella donna gravida per la prima volta si trova simile al verginale ; imperciocchè quantunque nell' atto della generazione la fessura trasversale si apra alquanto per ricevere il seme, appena però succeduta la concezione, di bel nuovo si chiude, e torna nel primiero stato, se non quando forse la maggior quantità del muco separata dal maggiore afflusso del sangue, caricando essa rima, non venga a produrvi qualche differenza.

§. 52. Essendo l'uovo incastrato nell' utero, questo soffre un nuovo stimolo. Riceve pertanto maggior copia di sangue. Si dilatano i suoi vasi, e tramandano nell' uovo qualche copia di liquido per mezzo de' vasi comunicanti, il quale uovo è soggetto a una proporzionata espansione; cosicchè per una parte cresca il rudimento dell' uomo, per l'altra la copia del liquido contenuto.

§. 53. Non è adunque maraviglia, che la mole dell' utero successivamente cresca. Si muta la prima parte dell' utero lontana dal collo, o il fondo, i vasi del quale sono meno premuti dalle fibre motrici, e perciò ivi si fa la minima resistenza al sangue, che vi si porta. Il fondo ancora si stende, e si dilata più delle altre parti dell' utero. Le fibrille dell' uovicino crescono contemporaneamente all' intorno, e formano, riunendosi, un particolar corpo che si chiama *Placenta*.

§. 54. Frattanto la cervice uterina non soffre alcuna mutazione, ma l' uovo scosta i due piani della sola cavità triangolare dell' utero nella quale si è impiantato, lasciando intatta la cervice, come più resistente, e più lontana; d' onde ne avviene, che l' interna cavità dell' utero, la quale era terminata da angoli acuti, si muti in figura che si accosti all' ovale, distrutti gli angoli acuti (§. 40.) e convertiti in archi (Tav. V. Fig. 3.)

§. 55. Per la qual cosa l' esterna figura dell' utero si uniforma a quella mutazione che prende internamente,
le

le sezioni da una forma ellitticoidea compresfa divengono più inarcate, e quelle che si accostavano ad essere circolari divengono ellissi. Del rimanente il corpo dell' utero diviene più ampio, ma la cervice rimane come nell' utero verginale.

§. 56. Cresciuto il corpo dell' utero, l' utero stesso diviene più pesante, e perciò da principio spinge più avanti la cervice nella vagina, alla quale discesa contribuisce la stessa espansione del corpo dell' utero, che forza per ogni lato. Quindi passate alcune settimane dopo il concepimento, l' orifizio dell' utero si presenta un poco più basso a chi lo tocca. Cresciuta inoltre e l' espansione, e la gravità, scende più avanti l' orifizio nella vagina, cosicchè il secondo e terzo mese dopo il concepimento, si può toccare introducendo il dito dentro la vagina poco più che alla sua metà (Tav. VI. Fig. 1.) mentre avanti l' ingravidamento appena si sentiva, avendolo introdotto tutto.

§. 57. Dipoi quanto più cresce l' uovo, tanto più si allarga l' utero in tale ampiezza, che la capacità della pelvi non basta più per contenerlo. Intorno alla metà del terzo mese a poco a poco sale in alto, e si posa sopra l' apertura superiore della pelvi, seguendo ordinariamente l' asse della medesima, e trae seco in alto l' orifizio, di modo che successivamente questo orifizio rimanga più alto, e finalmente sul finire della gravidanza, avanti che il ventre si abbassi, appena può toccarsi col dito. L' obliquità della vagina per rapporto all' utero, fa sì che l' orifizio apparisca di dietro mentre sale, e che sia obliquo all' osso sacro. Il tumore poi formato dall' utero, sollevasi a poco a poco verso l' ombellico.

§. 58. Finito il terzo mese, quando l' intero corpo dell' utero ha sofferto qualche espansione, a poco a poco questa mutazione si comunica anco alla cervice: maggior copia di sangue vi si porta, le fibre si allargano, la forte

connessione si scioglie, e diventa più lasca; anzi non scemandosi niente la sostanza, ma più tosto accresciuta la copia del fluido contenuto, viene ad ingrossare. Onde l'orifizio, che avanti il terzo mese col dito si sentiva niente mutato quanto alla sostanza, dopo si trova gradatamente, e un poco più molle, e un poco più grosso. (Tav. VI. Fig. 2.)

§. 59. Così la cervice si dispone ad una ulteriore espansione, che merita di essere principalmente osservata verso il sesto mese, nel qual tempo certamente incomincia ad allargarsi a tal segno, che la parte del tubo superiore all'orifizio si confonda con la comune cavità dell'utero; dalla qual mutazione ancora ne viene che l'orifizio dell'utero divenga più corto, le labbra intorno all'apertura esteriore a poco a poco si allarghino, e la figura conica, o cilindrica resti distrutta. (Tav. VII. Fig. 1.) Molto più poi verso il tempo del parto si ammolliscono le labbra, prendendo una natura spugnosa. Finalmente nell'ultime settimane le labbra si aprono ancora verso l'interna apertura, talmentechè in vece della fessura appaisca un tubo della figura di un dito, le di cui sezioni sono ellittiche; in quel tempo ancora l'interna cavità dell'utero ha la figura ovata. (Tav. VIII. Fig. 1.)

§. 60. Qui non si deve tralasciar di notare, che in molte donne l'apertura esterna dell'orifizio dell'utero si allarghi prima che il centro più interno della cervice. La ragione di ciò pare che sia la maggior densità della sostanza; imperciocchè ella è infinitamente compatta, in quel luogo ove la vagina si connette intorno alla cervice; questa medesima connessione della vagina, stringe più ancora le fibre per una più abbondante, e più ferma cellulosità: non è maraviglia adunque, che quel giro più resista e all'impeto del sangue, e all'espansione del corpo, che non fa l'apertura esterna. Con tutto ciò questa regola non esclude ogni eccezione, tro-

vandosi alle volte femmine, nelle quali quasi al tempo del parto l'apertura esterna rimanga chiusa.

§. 61. Si osservano certamente varie mutazioni delle labbra nell'orifizio dell'utero. Vi sono donne, nelle quali sul principio stesso del parto la bocca dell'utero è talmente ferrata, e contratta, che nel toccarla non vi si scuopre neppure vestigio alcuno di fessura. In altre quest'apertura fino all'istesso parto forma una specie di cicatrice, o di piccola fossetta, la quale in alcune verso il sesto mese si allarga un poco, e in altre alquanto di più in forma di un canale, il quale avanti al parto ammette interamente il dito fino alla prima articolazione. Queste cose ordinariamente si osservano nelle femmine gravide per la prima volta. Nelle donne poi, che hanno altre volte partorito, in tutto il tempo della gravidanza le labbra si trovano tra loro discoste; il canale, o sia l'apertura del mezzo è rotonda, e il suo diametro è della larghezza di un dito; l'apertura poi dei labbri si rassomiglia all'apertura della bocca della faccia. A poco a poco s'aumenta l'apertura, e finalmente il condotto (§. 59.) a segno si apre, che vi si può introdurre il dito, e arrivare a toccare le membrane, che involgono il feto; le labbra allora divengono meno prominenti, e anche avanti il parto totalmente restano scancellate. Il labbro posteriore suol rimanere più lungo dell'anteriore, anzi suole sporgere un poco in fuori, quando quello è del tutto sparito. La positura obliqua dell'utero stringe ancora l'apertura dell'orifizio. Frequentemente ancora l'orifizio, ed il canale sono ripieni di una grossa mucosità.

§. 62. Così certamente si accresce la capacità dell'utero, con tutto che non si diminuisca la grossezza della sua sostanza, la quale in vero dovrebbe scemare, se rimanesse la medesima quantità di sostanza, la quale essendo stata considerata da Uomini famosi nell'arte ostetricia, crederono, ed insegnarono agli altri, che la grossezza dell'utero gravido molto diminuisca.

§. 63. Con artificio poi mirabile cresce la copia degli umori, nella medesima proporzione, che cresce la capacità dell' utero. Imperciocchè i vasi dell' utero sono curvilinei, e serpeggianti, le vene sono prive di valvule, sono più robuste in proporzione della loro grandezza di tutte l'altre del corpo, ma nel tempo stesso più piccole relativamente alle arterie, che sono più grandi, e più deboli. Quindi avviene, che ogni mese nell' utero di una giovane si raduni il sangue, e finalmente rompendo si versi, al qual flusso necessariamente precede qualche gonfiamento dell' utero, e più basso scende l' orifizio, e diviene un poco più molle, e più grosso. Non solo l' esterna, ma ancora l' interna apertura della fessura si apre a tal segno in quelle, le quali soffrono copiosa mestruazione, e si sgravano di pezzi di sangue aggrumato, che il dito minimo di chi tocca per mezzo della fessura, alle volte possa introdursi nella cavità dell' utero; che anzi lo stesso corpo dell' utero avanti il flusso scendendo coll' orifizio, ed essendo duro, facilmente si sente.

§. 64. In maniera affatto somigliante, anzi che in copia maggiore (§. 52.) il sangue si raduna nell' utero gravido, l' uovo poi contenuto ne impedisce il flusso; si trattiene adunque il sangue, viepiù stende i vasi curvilinei in linea retta, dilata i medesimi, di modo che quei vasi, che nel verginale utero furono invisibili, in questo tempo specialmente nel fondo si facciano grossi quanto un dito. Per questa espansione però allungandosi le fibre motrici meno resistono; quanto più adunque si diminuisce questa resistenza, tanto maggiore diventa la copia del fluido influente. Dal che ne segue, che nella medesima proporzione, che si allarga l' utero, cresca ancora la quantità del liquido che vi si porta, e così rimanga sempre la medesima grossezza dell' utero, o più tosto si accresca.

§. 65. L' esperienza ricavata da frequenti aperture egregiamente conferma questa asserzione, poichè da questa impariamo certamente, che la maggior grossezza dell' utero

utero gravido è nel fondo, e nel corpo, la minore nel luogo dove avanti era la cervice. Anche il maggior flusso del sangue si fa nel fondo e nel corpo, e il minore nella cervice. Quindi insieme si rende chiara la ragione, perchè l'apertura o rottura dell'utero si faccia all'apertura superiore della pelvi, dove una volta era la cervice. Successivamente poi si assottiglia la base nel parto, che verso il centro dell'orifizio è sottilissima, grossissima poi verso il giro, o la parete della vagina, e perciò dal giro al centro la grossezza vada scemando fino quasi alla sottigliezza di una carta.

§. 66. L'affare del parto necessariamente richiede questa grossezza del fondo, e del corpo. In qualunque parto lo sforzo, e nel parto non naturale, l'operazione, non potrebbero far di meno di non romper l'utero, se colla capacità accresciuta scemasse la grossezza.

§. 67. Ma *Perchè l'uovo crescendo allarga l'utero, e perchè questo stesso non resta compresso dall'utero accresciuto?* Il medesimo influxo del sangue, colla medesima forza distende i vasi dell'utero, e quelli dell'uovo; adunque ambedue si allargano verso il luogo meno resistente, cioè verso l'esteriore superficie dell'utero. Nè i vasi maggiori sparsi nell'esteriore superficie dell'utero impediscono già questa espansione; ma gli stessi dilatati cedono con la medesima direzione, cioè dal centro alla circonferenza.

C A P I T O L O IV.

D E L L' U O V O.

§. 68. **I**l Feto non stà nella cavità dell'utero isolato, ma è racchiuso in un uovo, cioè in una tunica membranacea divisibile in tre, che soppanna l'intera cavità dell'utero. L'intima laminetta si chiama

Amnios, che è trasparente, sottile, e forte. Per mezzo della cellulare è congiunta a questa al di fuori un' altra più soda, più robusta, più grossa, parimente trasparente, che dee chiamarsi *Chorion*. Verso la faccia uterina poi ita unita la terza, *filamentosa*, o *flocculenta*, e *cellulosa*, grossa, opaca, bianchiccia. Questa membrana verso la placenta diviene più grossa, quasi muccosa, che può dividersi a piacere in molte laminette, o pezzetti, e che finalmente entra nella stessa placenta, e ne cuopre l' esteriore superficie della medesima. Alle volte dopo il parto si manda fuori intera questa filamentosa membrana, altre volte poi nella superficie del *chorion* che risguarda l' utero, si vedono semplici filamenti ammassati, o in grandi, o in piccoli fascetti, i quali col soffiarvi dentro si sollevano in forma di cellule: il rimanente dei filamenti rimane nell' utero, e finalmente si mandano fuori con i lochj.

§. 69. La *Placenta*, che si attacca per lo più nel posto superiore dell' utero, è un corpo rotondo; del diametro di mezzo piede, e più; grosso nel mezzo uno o due pollici (Tav. IX. Fig. 1.) ⁽¹⁾ ed è propagine dell' arterie, e vena umbilicale, tutta formata di vasi, insieme collegati mediante una copiosa tela cellulare.

§. 70. Per mezzo di questa filamentosa membrana l' uovo si unisce all' utero, ma non molto tenacemente fuori che nel giro dove la membrana filamentosa è più grossa, la quale essendo ripiena di vasi più numerosi, e di maggior calibro, tenacemente si unisce ivi colla placenta. Rendono più forte questa connessione della placenta i solchi (Tav. IX. Fig. 2. Lett. BBB.) tra i lobi, ai quali corrispondono le prominenze dell' utero. Quindi l' operatore non prova alcuna resistenza nel separare l' uovo, se non dove comincia il detto giro, o spazio circolare.

§ 71.

(1) La riduzione di queste, come di altre misure, è di già sta-

ta riportata nella Prefazione.

§. 71. Tutte le volte che si trovano nell' utero più feti non attaccati insieme, ciascuno è racchiuso nel suo uovo, e nutrito dalla sua particolare placenta, ora affatto discolta dall' altra, ora unita, il che certamente accade più frequentemente.

§. 72. Un umore sottile, e mucoso, è contenuto dentro alle membrane per l' aumento della gravidanza, il qual' umore va scemando in proporzione della grossezza del feto. Circonda il feto, acciocchè questo possa liberamente crescere, ed essere difeso dall' attaccatura delle parti; difende il medesimo, acciocchè non possa essere offeso o dalla contrazione dell' utero, o dall' azione de' muscoli del basso ventre, e del diaframma, o da altra forza esterna; nel parto, insieme colle membrane, è un ottimo strumento della natura per dilatare l' orifizio dell' utero.

§. 73. Per qualunque leggerissima cagione poi, e sempre sul principio del parto, scorrerebbe se non fosse trattenuto dalle membrane, nè potrebbe mai facilitare il passaggio al feto quando è per uscire; dal che chiaramente si conosce quanto grande sia l' uso di queste membrane.

§. 74. Dalla Placenta nasce e scorre fino all' ombellico del feto un *cordone* detto ombellicale, fatto a spira, e ripieno alle volte di nodi, da cui le donnicciuole formano varj presagj. Ha de' solchi nella sua lunghezza, rare volte ha la forma di cilindro. Contiene due arterie di eguale diametro (Tav. IX. Fig. 1. lett. M) ed una sola vena di diametro molto maggiore, e quasi del doppio (Tav. IX. Fig. 1. lett. N.) Un denso umore o gelatina, che può facilmente farsi uscire spremendolo quando è fresco, empie gl' interstizj della cellulare, per mezzo della quale sono uniti i predetti vasi. Non impedisce però questo umore gelatinoso, che a traverso ad esso non si senta colla dita la pulsazione dell' arterie. La vena porta il sangue, lo riportano l' arterie; compreso questo cordone, si toglie la comunicazione tra la madre, ed il feto.

§. 75.

§. 75. La gelatina sparsa tra i vasi alle volte superando molto la giusta proporzione, accresce fuor di modo la grossezza del cordone, così che quantunque si faccia una stretta legatura, seccandosi poi la sostanza di mezzo, e contraendosi, farebbe per uscire il sangue, se non si usasse una somma diligenza. Un simile *tralcio grosso* sogliono le levatrici chiamarlo *grasso*.

§. 76. All' opposto la detta gelatina talora è in così piccola quantità, che i vasi divengono trasparenti, il cordone è sottile, rosso, facilissimamente si rompe, e la legatura se non si faccia con un filo largo, e con somma cautela, tronca l' intero cordone, particolarmente se sia fatta con un filo troppo duro. Indi alle volte si osservano mortali emorragie. Tal sorte di cordone lo chiamano *sanguigno*.

§. 77. Il cordone rare volte s' inserisce nel mezzo della Placenta, siccome nel margine, ma per lo più ai lati della medesima. Per questa ragione più facilmente si stacca impiegandosi tutta la forza in questa parte, sciolta la quale l' altre vengono dietro spontaneamente. Il cordone è considerabilmente lungo da potere obbedire a tutti i movimenti del feto, e da potere esso feto escir fuori dell' utero, senza che il medesimo resti strappato. Qualche volta però a motivo della sua lunghezza, si rende pericoloso alla vita del feto, perchè si può avvolgere, e legare alcune sue membra.

§. 78. Lo stesso corpicciuolo del feto è molto flessibile, particolarmente verso le parti d' avanti, non essendo per anco moltissime sue cartilagini convertite in ossi; i piedi sono più piccoli del giusto; il capo poi molto grande. Acciocchè possa meglio passare per la capacità della pelvi, l' ossa del cranio non sono per anco interamente perfezionate, nè sono tra loro unite per mezzo delle future, ma congiunte dalle membrane, ed essendo principalmente non finite di formarsi negli angoli, lasciano tra l'

ossa

ossa della fronte e del vertice un'apertura chiusa dal perioftio esterno, ed interno, e da una sottile e molle cartilagine. Tale apertura si chiama *fontanella anteriore*: dal che ne nasce, che gli ossi compressi da una forza esterna si muovano sopra di loro, e così il capo si riduca ad un volume minore.

§. 79. Il feto dentro l'utero è aggruppato insieme a guisa di un globo, ha il capo incurvato sul petto, le cosce alzate in alto, che si appoggiano al ventre, le tibie ripiegate indietro formanti un angolo acutissimo, i piedi incrocicchiati, i calcagni appoggiati alle natiche, gli omeri incurvati, le braccia stivate ai lati del torace, e le gomita colle mani pendenti in modo che toccano le gambe, o elevate in maniera che sostengano la fronte, o la faccia, con la colonna delle vertebre piegata in arco.

§. 80. Il feto così raggruppato, nel parto naturale, occupa col capo il luogo più basso. Se poi ivi stia così per tutto il tempo della gravidanza per anco è indeciso. Gli Antichi stimarono che il feto avanti il settimo mese sedesse nell'utero, col capo sollevato verso il fondo del medesimo, colla faccia rivolta verso il ventre della madre, con le natiche poi insieme ed i piedi collocate all'orifizio dell'utero. Furono anche di opinione che circa al settimo mese il capo precipitasse verso le parti anteriori, cosicchè dopo quella caduta pendendo in giù, fosse rivolto colla faccia verso l'osso sacro.

§. 81. Questa ipotesi si appoggia ad un fondamento poco stabile, nè pare nata se non dal numero settenario, che era sacro e misterioso appreso di loro. Imperciocchè le donne gravide rarissime volte sentono nel settimo mese un tal moto istantaneo, ma un movimento vago, ed incerto, che va crescendo a misura che aumenta il feto, e alcuna volta tanto vivace presso il termine della gravidanza, che ne nascono delle lividure intorno il loro ombellico.

§. 82. La maggior parte de' Moderni tiene la sentenza contraria, affermando che il feto per tutto il tempo penda col capo all'ingiù a cagione della maggior gravità del medesimo, che lo spinge al basso; e pare che gli aborti di minor tempo, i quali si portano fuori innanzi col capo, ci persuadano tal cosa. Che se poi fino dal principio della gravidanza il capo gravissimo pendesse in giù, non veggo come possa succedere che nel parto possano alcune volte presentarsi altre parti, e così nascerne i parti preternaturali; nè veggo ancora come il cordone si ravvolga intorno al corpicciuolo del bambino, e si formino quei nodi chiamati magici.

§. 83. Nè per vero dire di vantaggio mi contenta la vaga situazione del feto, il quale venga poi a determinarsi sul fine della gravidanza nella consueta positura: imperciocchè nessuna causa esiste, che produca quella situazione, mediante la quale la faccia del feto sia quasi sempre rivolta verso l'osso sacro.

§. 84. In questa incertezza di argomento sia lecito di formare un'ipotesi, la quale non sia soggetta a tante, e sì grandi difficoltà, come quella, che il capo del feto dopo il concepimento occupi il luogo superiore, dipoi a poco cali verso le parti anteriori, finchè alla fine occupi il luogo più basso. Pare che ciò confermino la diminuzione del umore dell'amnio, la gravità specifica del feto, e principalmente del capo, che va continuamente crescendo, il volume del capo del tenero embrione, grande in proporzione alla sua gravità, l'asse dell'utero, e altre cose da dimostrarsi altrove.

§. 85. Da ciò si conclude.

- A. Il capo dell'embrione molto leggiero, appoggiandosi al petto, occupa dopo il concepimento la parte superiore, pende verso il ventre della madre, e colla faccia rivolta a quello.
- B. Ritene un tal sito finchè v'è qualche impedimento, che

che gli ritarda la discesa , come può specialmente essere la troppo scarsa copia dell' umore dell' amnio.

C. Scende poi a poco a poco , a misura che diviene più grave .

D. Finalmente la parte più grave del corpicciuolo occupa il luogo più basso .

E. Nondimeno può essere ritardato nello scendere , o ancora questa stessa discesa può essere viziosa per varie cagioni , singolarmente per la scarsità dell' umore dell' amnio , per l' obliquità dell' utero , per i tumori del medesimo , per gli sforzi fatti fuor di tempo , e per violenza esterna .

§. 86. Dall' osservazione almeno impariamo , che non solo nel tempo del parto , ma ancora sul principio , e sulla metà del settimo mese della gravidanza , il capo per lo più si presenta al tatto , il che rare volte avviene avanti questo tempo , ma dopo è raro che non si senta (Tav. VII. Fig. 1.) Che se avanti questo tempo si esamina col tatto la condizione dell' utero , ne' primi mesi niente si distingue nella cervice . Imperciocchè in quel periodo il solo fondo suole mutarsi notabilmente , rimanendo nello stato naturale la cervice (§. 54. Tav. V. Fig. 3. e Tav. VI. Fig. 1.) la quale esaminata col dito si riscontra nella volta , o fondo della vagina , sottile e angusta . Qualche volta alla metà del quinto mese , o quattro mesi e mezzo avanti il parto , e alle volte più tardi , la cervice a poco a poco aumentata , e venendo così a toccare in tutto il suo giro , la volta della vagina comincia a comparire in forma di duro tumore , che va crescendo a poco a poco in durezza , ed ampiezza (Tav. VI. Fig. 2.) ; indi chiaramente col dito esploratore distinguiamo che questo tumore va continuando sino alla stessa bocca dell' utero . Poi la durezza del tumore di nuovo diminuisce , ed esso si trova quasi incavato e molle , contenendo questa cavità un piccolo globo duro , e facilmente mobile ,

quando col dito esploratore si preme la volta della vagina, e la cervice appoggiata ad essa, nel qual tempo la parte della cervice dilatata, ed incalzata dentro la vagina, incomincia ad esser chiamata la *sezione*, o *parte inferiore dell' utero*. (Veggasi Tav. VI. Fig. 2.)

§. 87. Ancora ne' primi mesi della gravidanza, e nella femmina non gravida, la vagina stà pendente, ed attaccata all' orifizio dell' utero, e lo tocca in quasi tutto il suo giro. Per quella ragione poi per la quale si forma la *sezione inferiore dell' utero*, la parte superiore della vagina si dilata come in una volta; e la cilindrica parete della stessa si allontana dall' orifizio dell' utero; così la vagina, che negli altri tempi è molto stretta verso la bocca dell' utero, avanti al parto si allarga in ampia volta.

§. 88. Con maggior difficoltà si distingue la testa del feto dalla *sezione dell' utero*, a cagione della sua mobilità, la quale sovente fa sbagliare verso il terzo mese innanzi il parto, e fa che si possa prendere la *sezione uterina* per lo stesso capo del feto. Ma la grandezza del segmento uterino, l' orifizio di esso utero, che lo seguita allorchè si respinge e preme, e la mancanza di quei moti regolari con i quali salire e scender suole la testa, sono sufficienti indizj per non confondere l' una coll' altra. Realmente il segmento dell' utero per la pressione che soffre si alza, portandosi ad occupare un posto più alto, donde più presto o più tardi torna a scendere, ed è d' altronde più molle o cedente; la testa poi si distingue ancora dall' orifizio dell' utero per la sua durezza, oltre ad avere nel salire, e scendere un moto regolare.

§. 89. Nei primi tempi certamente il globo del capo colla *sezione uterina* si tiene nel luogo più alto della pelvi, e si può toccare solamente nel mezzo del luogo che rimane tra la sinfisi degli ossi del pube, e la bocca dell' utero; e sfugge quasi sempre l' essere ritrovato, facendo cioè, e saltando in su, tosto che resta pigiato, e

immediatamente dopo ritornando verso il basso. Suole nondimeno succedere, che a guisa della sezione inferiore, la leggiera palla del capo non discenda tanto presto, ma soltanto dopo qualche indugio. Ma la donna gravida sente nell'opposta sede dell'utero intorno all'ombelico, o alla fossetta del cuore, o all'uno, o all'altro ipogastrio, il moto della palla che sale, e la percossa momentanea del corpicciuolo dell'embrione tosto cessare quando scende. Le quali vicendevoli salite e discese, è in potere dell'esploratore il rinnovarle in una maniera del tutto simile a quella, con cui ci divertiamo col fantoccino di Cartesio. Il leggero capo dell'embrione, racchiuso in molto umore dell'amnio, e nuotando in questo umore che lo circonda, facilmente si muove, e trae seco nella parte superiore tutto il piccolo corpo dell'embrione, il quale v'è a toccare il fondo dell'utero. Accresciuta di peso e di ampiezza la testa, tocca tutto il giro dell'orifizio, e però si muove all'in su con maggior difficoltà.

§. 90. Indi dal terzo mese fino al parto, la bocca dell'utero suol salire (§. 57.) e scostarsi dall'ingresso della vagina. Inoltre da quel periodo nel quale si tocca il capo nella sommità della vagina, il segmento o porzione inferiore dell'utero depresso nella volta della vagina si dilata, e cede al peso del capo, e si accorcia la bocca dell'utero. Almeno in molti casi la difficoltà di toccar l'orifizio cresce col crescere la gravidanza, divenendo vicendevolmente più vicina la sfera del capo, quanto è più vicino il parto. Non ci maraviglieremo di questo paradosso, se consideriamo la posizione delle parti della pelvi. Quando l'orifizio dell'utero stà pendente nella cavità della pelvi, esso, poco lontano dall'ingresso della vagina, segue l'asse della pelvi; salendo poi lentamente, occupa per modo il centro dell'apertura superiore della medesima, che all'esploratore pare essersi ritirato vicino all'osso sacro. La sfera del capo finchè è piccola si muove pure secondo l'asse della pelvi, e si

tiene in un posto molto più alto, che non è il collo, e l'apertura superiore della pelvi. Crescendo poi il capo di mole, non spinge il segmento dell'utero nella volta della vagina, e nell'apertura superiore della pelvi, più di quello che lo dilati verso la sinfisi degli ossi del pube, essendo più vicino al seno esterno, e per questo ancora al tatto di chi lo riscontra col dito, resta più comodo. Certamente quanto più il termine del parto è lontano, più si riscontra essere spazio fra la testa e la sinfisi delle ossa del pube, e questo spazio sempre in seguito calando la testa, diminuisce a proporzione che la testa cresce di peso, e di mole.

§. 91. Nell'ultimo tempo una, due, tre, anzi quattro settimane avanti il parto, il peso del capo calato suole essere tanto grande, che senza una notabile mobilità non superi l'apertura superiore della pelvi (Tav. VIII. Fig. 1.). Laonde la volta della vagina, con quella parte dell'utero dilatato, si abbassa nel tempo che l'orifizio è tirato superiormente, e l'orifizio inferiore dell'utero al dito esploratore si manifesta teso, e dietro a quello si sente un ostacolo eguale, e occupante tutta la circonferenza della pelvi, duro, e sferico formato dal capo. Nel medesimo tempo il tumore dell'addome suol talmente calare, che sotto le coste spurie nasca uno spazio più libero.

§. 92. Questa certamente può essere la regola: pure non mancano eccezioni al modo naturale, secondo il quale il capo dovrebbe presentarsi il primo. Così qualche volta non tocchiamo il tumore dell'utero, perchè questo troppo alto sale, e totalmente sfugge chi volesse col dito riscontrarlo; altre volte la medesima differenza di altezza fa sì, che il capo troppo alto nel principio non si lasci toccare dalla mano, e quando è più basso si muova. Altre volte nel principio il capo insieme colla bocca dell'utero è basso, di poi è portato così in alto,

alto, che non si lascia sentire, se bene a momenti sia di bel nuovo per ricadere: in alcuni così il capo si mantiene notabilmente mobile, e alto fino al momento del parto.

CAPITOLO V.

DELLA TEORIA DEL PARTO.

§. 93. **L'** Utero è dotato d'elasticità, e perciò gode di una forza, mediante la quale liberato essendo dalla causa distendente, spontaneamente si contrae. A questa forza generale di elasticità se ne aggiugne un'altra speciale propria degli animali, che accresce, e corrobora la prima, per la quale le fibre sono stimulate a contrarsi da un irritamento esteriore. Laonde l'utero gravido stà in un continovo sforzo di contrarsi, e si contrarrebbe realmente se non fosse impedito dalla causa che lo tien disteso, la quale è di maggior forza.

§. 94. Tosto che o questa resistenza scema, o sopravviene l'irritamento, che accresce e corrobora lo sforzo della contrazione (§. 93.) talmente che superi la resistenza, o ambedue queste cause concorrano, quello sforzo di contrarsi si riduce all'atto, e l'utero effettivamente si contrae.

§. 95. Questa forza poi dell'utero di contrarsi, risiede nelle fibre motrici del medesimo (§. 45.) le quali con fortissima unione sono connesse, e cingono tutto il giro dell'utero, che non si possono dividere in strati senza lacerazione, e spesso intralciate co' vasi. Nondimeno possiamo in qualche modo con una legge non costante, almeno per quanto apparisce, distinguere nelle donne gravide, nelle partorienti, e nelle puerpere varie direzioni di fibre, e molti strati, che scambievolmente s'intrecciano in varie maniere.

§. 96. Alcuni strati longitudinali che scorrono dal fondo all' orifizio, venendo contratti rendono più corto l' asse longitudinale, e deprimono verso l' orifizio le parti contenute nell' utero. Questi sogliono quasi unirsi con gli altri strati sparsi nell' esteriore, e interiore superficie dell' utero, e spesso mescolarsi co' medesimi: alle volte le fibre longitudinali sono quasi alternativamente disposte, ed intralciate con un ordine irregolare di fibre oblique.

§. 97. Il più delle volte gli strati trasversali sono i più copiosi, e grossi, alcuni de' quali, che segano i longitudinali quasi ad angolo retto, si possono prendere per rotondi, altri sono più obliqui, o di propria natura, o per essere diramati dai longitudinali, che si dipartono dalla loro direzione. I rotondi del fondo contratti deprimono in parte il vertice dell' utero, in parte ne diminuiscono il diametro, o l' asse trasversale, e uniti coi longitudinali fanno, che quanto si contiene nell' utero, venendo compresso e abbassato, s' accosti all' asse longitudinale. Lo stesso operano i rotondi strati del corpo esistenti intorno alla circonferenza dell' utero, i quali parimente scemano l' asse trasversale, e con egual forza in tutto il giro spingono verso l' asse longitudinale tutto ciò che trovasi nell' utero, e lo tengono sospeso in quella direzione.

§. 98. Gli strati rotondi disposti intorno all' orifizio dell' utero, se superano l' azione de' longitudinali, chiudono l' apertura dell' orifizio uterino, a misura della loro contrazione; vinti poi cedono a questi, si stendono, sono tirati in su dai longitudinali sopra a quella parte dell' uovo, che deve venir fuori, quasi come sopra una troclea, e discostandosi fanno sì, che l' apertura si dilati.

§. 99. Gli obliqui poi sparsi fra gli altri strati, non lasciano quasi verun punto dell' utero senza contrazione nel tempo del parto, sbrigato il quale aiutano l' utero a ritornare a minor mole, premendo i vasi.

§. 100. Sul fine della gravidanza lo stato mutato dell' utero

utero determina la contrazione delle fibre motrici .

(1.) La mole cresciuta del feto, e la diminuita copia del liquore dell' amnio (§. 72.) fanno che le parti estreme del feto tocchino, e dilatino l' utero. Il segmento inferiore fa la minore resistenza a questi sforzi, poichè è più sottile che altrove (§. 65.) ed il suo orifizio, ove per questa parte terminano, o fanno capo le fibre, permette alle medesime una mobilità verso le parti superiori (§. 98.) e guarda contro alla vagina, la quale è più libera (§. 87.) mentre le altre parti dell' utero sono appoggiate alle parti del basso ventre. Per la qual cosa l' uovo agisce contro il segmento inferiore dell' utero, e dilata le di lui fibre, le discosta, le rende più lunghe, e fa più profondamente discendere lo stesso segmento o parte uterina nella vagina.

§. 101. Quando è sceso l' uovo, le fibre del segmento sono divenute più lunghe, e diminuita essendo la resistenza del medesimo, da per se piglia forza il fondo, e il corpo dell' utero; gli strati del fondo (§. 94.) si contraggono, e perciò l' uovo abbassato comprime le fibre del segmento inferiore, e ne avvicina per modo i diversi strati delle medesime, che sono posti gli uni sopra gli altri, che gli umori sono cacciati fuori dai proprij vasi, e i nervi compressi divengono deboli. Il quale effetto certamente debilitando sempre più il segmento inferiore, accresce la causa della contrazione nel fondo. Anzi indebolito il segmento inferiore, e portato nella vagina; il liquore dell' amnio cade insieme col feto, e nel fondo dell' utero lascia uno spazio libero, e tolta la resistenza comparte al fondo nuova forza di contrazione. L' uovo col suo peso premendo perpendicolarmente, o obliquamente, ajuta, e accresce grandemente la forza della mole dilatante.

§. 102. (2.) Cresce certamente la forza delle fibre per l' irritamento (§. 93.) che apportano (a) l' espansione, e compressione prodotte dall' uovo (§. 100.) (b) e la forma,

E

cioè

cioè quando le fibre tortuose si rendono rette, e stese a segno, che non possono stendersi di più senza rompersi. Il parto dei gemelli, che molte volte suol seguire avanti il tempo, l'aborto periodico ec. con verisimiglianza provano accadere nell' utero una tal mutazione. Le cause sopra esposte (S. P. P.) dirigono l' azione delle fibre alla bocca dell' utero.

S. 103. L' utero si contrae in modo, che le fibre trasversali sostengano l' uovo nella direzione dell' asse (S. 97.), e che le longitudinali colle trasversali del fondo lo facciano discendere, e lo premano contro l' orifizio, da una parte conducendo il fondo verso l' orifizio, e dall' altra traendo la porzione inferiore verso il fondo, l' allarghino insieme coll' orifizio (S. 98.) e l' orifizio stesso fino allora prominente nella vagina lo appianino, in modo che per la reiterata azione affatto sparisca la di lui prominenza.

S. 104. Dura poi tanto questa azione, finchè non sia totalmente abbattuta la forza delle fibre del fondo, e del corpo dell' utero, e che di nuovo torni eguale alla forza della porzione, o segmento inferiore, e così ritorni l' equilibrio, lo che succeduto, per la medesima ragione l' umore dell' amnio nuovamente si distribuisce all' intorno del feto, e torna la quiete, che di nuovo si perde quando restituita l' azione del fondo sarà tolto l' equilibrio.

S. 105. Queste varie contrazioni dell' utero non possono succedere senza dolore; quindi con ragione si chiamano *dolori del parto*: nulladimeno non sono sempre questi dolori in proporzione delle contrazioni. Spesso le donne molto patiscono nelle piccole contrazioni, e poco nelle grandi.

S. 106. Nell' ultimo mese della gravidanza l' utero soffre questa contrazione, in alcune più presto, in altre più tardi; cioè secondo che più presto, o più tardi l' uovo fa forza contro il segmento inferiore dell' utero.

S. 107. Siccome poi sul principio la dilatazione del
seg-

segmento inferiore è minore, e l'orifizio dell'utero peranco gonfia nella vagina, in modo che le fibre rotonde del medesimo notabilmente resistono contro tutte le altre fibre; quindi ne avviene, che da principio queste mutazioni sogliono essere più leggiere, durare poco tempo, e più lunghi essere gl'intervalli fra i ritorni delle contrazioni uterine.

§. 108. Tosto che la prominenza dell'orifizio nella vagina è quasi abolita, e il segmento inferiore è più portato in giù, e affottigliato, allora l'azione del fondo, e del corpo, supera l'azione del segmento inferiore con maggior momento; adunque il fondo, e il corpo dell'utero si contraggono con maggior forza, e per più lungo spazio di tempo, con maggior forza premono ciò che trovassì contenuto verso l'orifizio, e dilatano questo stesso con più violenza, cosicchè successivamente si apra sempre più, e più spesso ritorni la mentovata contrazione.

§. 109. Dalla medesima azione del fondo, e del corpo, tutto quanto è contenuto nell'utero è pigiato verso l'orifizio, e perciò l'umore dell'amnio racchiuso nelle membrane, e più mobile del feto, è spinto avanti il capo medesimo, anzi talmente è cacciato dentro l'apertura stessa dell'orifizio, che a guisa di cuneo, o di particolare strumento, dilata il medesimo.

§. 110. A questa contrazione dell'utero si aggiugne ancora un'altra causa, la quale molto ajuta a spingere il feto, cioè la sensazione molesta prodotta dalla contrazione dell'utero, la quale per consenso si comunica al diaframma, ed ai muscoli del basso ventre, in modo che questi si contraggono con gran forza: la qual contrazione involontaria può la partoriente rendere molto più forte con l'azione volontaria aggiuntavi, e col trattenimento del fiato.

§. 111. Acciochè poi l'azione composta dall'azione del diaframma, e dei muscoli del basso ventre agisca nell'

utero colla massima forza, l'utero è posto nell' asse della pelvi, il quale asse certamente è quasi in dirittura colla diagonale di queste azioni.

§. 112. Reiterate queste azioni, finalmente l' orifizio dell' utero del tutto si apre, per modo che la cavità del medesimo forma colla vagina un sol continuato canale. Laonde restano soltanto alcune contrazioni per dilatare la vagina, e il seno esterno, e per mandar fuori totalmente il feto, e la seconda.

§. 113. In questa maniera segue il parto non vizioso, o sano, e come si chiama naturale. Questo poi richiede, che

- A. La pelvi sia ben conformata, e che le due aperture di essa sieno assai grandi per concedere libero il passo al feto.
- B. Il capo del feto sia proporzionato alla cavità della pelvi.
- C. Il feto e l' utero sieno situati nell' asse della pelvi.
- D. L' utero, la vagina, e il seno esterno non abbiano una formazione preternaturale.

§. 114. Perchè questo parto accada compito nel nono mese solare, nessuno ha potuto finora spiegarlo. I periodi stabiliti per la nascita delle creature, se si voglia spiegarli per le loro cause, sono a noi nascosti, giacchè non è lecito esprimere con numeri la proporzione delle resistenze, che si oppongono alle forze impellenti.

CAPITOLO VI.

DELLA VERGINITÀ.

- §. 115. **L**A Donna si può considerare
1. Nello stato totalmente perfetto di verginità, quando cioè non ha partorito, non ha abortito, non ha avuto commercio coll' uomo, e non ha sofferto alcuna violenza.

Co.

2. Come donna in tutto simile all' antecedente, ma stata violentata da esterna causa, sia per disgrazia, sia per libidine.
3. Quella che non ha partorito, nè abortito, ma bensì ha avuto commercio con uomo.
4. Quella che non ha maturato alcun parto, ma soltanto abortito.
5. Quella che in realtà è madre, ed ha al debito tempo partorito.

§. 116. Qual sia poi lo stato attuale nella donna che si esamina, lo dichiara singolarmente la forma dell' orifizio dell' utero, e del seno esterno, data però qualche eccezione, la quale si può dalle circostanze rilevare.

§. 117. Tutte le parti esterne di una vergine intatta sono sode, e da se stesse bene si sostengono. I contorni del seno sono perfettamente congiunti, turgidi, e duri; somigliante è la costituzione delle ninfe, che pure si osservano essere piccole, e coperte dal seno esterno. Suol essere ancora più piccolo il prepuzio della clitoride, che non cuopre la glande, tutte le parti sono terse, lisce, e di color rosso vermiglio. Se poi vi è l' imene intatto, questo si abbia per principal contrassegno della verginità. L' orifizio ancora dell' utero è affatto chiuso; le colonne delle rughe vaginali sono talmente gonfie, che la superiore tocca l' inferiore: e gonfio ancora si osserva il vestibulo; e questo presenta i suoi seni profondi, e pieni di un umore mucillaginoso.

§. 118. Onde ne avviene che il primo commercio non siegua senza effusione di sangue, nè senza dolore, se a forte una maggiore rilassatezza delle fibre non renda la vagina e l' imene immuni dal dolore, e dalla violenta rottura. Quel sangue ancora sparso con dolore, non dimostra sempre una vergine illibata, particolarmente potendo questo o fingersi, o prodursi con arte.

§. 119. Nondimeno una fanciulla munita del suo imene

ne può aver avuto commercio coll' uomo, come insegnano gli esempj di gravide, nelle quali si è conservato detto imene, le quali però restano smascherate dal riscontro, e condizione dell' orifizio dell' utero.

§. 120. La seconda, e terza specie (§. 115.) non si può accuratamente distinguere l' una dall' altra. Imperciocchè l' orifizio dell' utero è in esse come quello delle vergini (§. 46.) e appena vi è altro indizio, se non che l' orifizio dell' utero in quelle che hanno avuta qualche familiarità con l' uomo è più basso: benchè non si può tenere per un segno indubitato di libidine, perchè anche in una vergine intatta la vagina può essere più corta, o anche l' utero calare, come è facile ad osservarsi nelle malattie cachettiche, che producono il rilassamento delle fibre, nell' idropisia, e distensione flatulenta delle intestina, che gravitano sopra all' utero, e lo abbassano; siccome per la procidenza, o rilassamento della vagina, che trae seco l' orifizio dell' utero, per il prolasso dell' utero ec. Queste cause morbose non possono che difficilmente nascondersi a chi diligentemente le ricerca.

§. 121. In queste poi (§. prec.) le parti esterne divengono flosce, i contorni del seno esterno lasciano fra di loro un maggiore spazio; la clitoride divien più grande, e il di lei prepuzio principalmente cresce a tal segno, che cuopre tutta la glande; le ninfe hanno un colore più oscuro, ed escono fuori del seno, e tutte le altre parti che nella vergine intatta sono di color roseo, soffrono la suddetta mutazione di colore. L' orifizio dell' uretra si fa più ampio, ed aperto. L' imene è di colore più oscuro, foscio, diminuito, o irregolarmente strappato, anzi totalmente abolito, a misura della forza della causa che lo ha danneggiato, o distrutto. All' ingresso della vagina sono collocate le caruncole mirtiformi; la stessa vagina è aperta, più ampia, ed ha le colonnette o rughe più flosce (Tav. IV.)

§. 122. Oltre a quella mutazione, che può essere prodotta

dotta nell'imene da cause veneree, altre ve ne sono che lo possono offendere, ed in modo possono distruggere i segnali fisici della verginità, quantunque moralmente non retti tolta essa verginità, come sono per esempio le cause seguenti:

1. La frequente equitazione, e praticata alla foggia degli uomini.
 2. Una disgrazia.
 3. Il prolusso completo dell'utero, ed un maggior prolusso della vagina, e singolarmente della colonna superiore: imperciocchè queste procidenze viziano l'imene, e mutano la forma delle parti genitali.
 4. Ancora le malattie cachettiche, e singolarmente il flusso bianco, e l'emorragie uterine, le quali malattie per altro lasciano l'imene intero, benchè più floscio, mutano il colore terro e lucente in colore più livido, e rilassano la vagina.
 5. Una marcia acre può corrodere l'imene.
 6. Ubriacata ancora una femmina, o resa stupida coll'oppio, può senza colpa perdere la verginità. Ma queste cause però il più delle volte sono d'altronde riconoscibili.
- §. 123. La quarta specie non si può quasi conoscere, e distinguere dalla prima, se l'aborto sarà stato di un embrione, o di una piccola mola. Se poi qualche volta sarà stato maggiore l'embrione, o la mola, si accosterà più da vicino alla specie susseguente, almeno se la donna avrà abortito dopo il seito mese. Avanti a questo tempo l'orifizio dell'utero non diventa più corto, e appianato, come nel parto; ma più tosto alquanto più lungo, più molle, e più gonfio, e solamente tanto si apre che sia concesso il passo alla mola, o all'embrione; laonde seguito l'aborto non si trovano nella fessura trasversale cicatrici verune, o almeno piccolissime, e appena visibili. Il Frenulo non è peranco spianato, ma bensì l'imene abolito.

§. 124. In quanto poi alla donna che ha già partorito, oltre i segni accennati della verginità perduta, altri segni vi sono che la fanno distinguere per madre.

1. Il Frenulo scancellato.

Imperciocchè, mentre il capo del feto vien fuori, il frenulo suole stendersi, e restare affatto appianato con fierissimi dolori; mentre nella femmina che non ha partorito, occupa colla sua larghezza lo spazio che vi è dal perinéo fino alla parte posteriore del seno.

2. La fessura aperta ed ineguale.

Terminato certamente il parto, l'utero ripiglia quasi la primiera figura, ma qualche diversità apparisce nell'orifizio. Imperciocchè questo nella vergine è di figura conica, e chiuso (§. 42.) in quella poi che ha partorito si muta in forma di cilindro, o di cono rovesciato, e divien più grosso. L'apertura esterna si apre ammettendo l'estremità d'un dito, e più cospicue si rendono le sue labbra. Inoltre gli orli interni di esse labbra divengono ineguali come se fossero stati tagliati, e poi cicatrizzati. Queste aperture, e cicatrici se sieno molto copiose, e se specialmente rappresentino un' incisione fatta a guisa di croce, danno un contrassegno indubitato del parto già seguito.

3. Le rughe, e lineette del basso ventre.

Il basso ventre che era dilatato, dopo il parto di nuovo si contrae, ma in varj luoghi è distinto da linee bianche, e splendenti, simili a piccole cicatrici dell'epidermide, che denotano i luoghi ove per l'avanti le fibre distratte, e allontanate, hanno lasciato di ciò i contrassegni. In alcune donne, e singolarmente in quelle di cute floscia, e che hanno più volte partorito, sogliono rimanere e le rughe effettive, ed ancora il basso ventre grande, e pendente.

4. Le lineette delle mammelle.

Nella stessa maniera le mammelle state distese dal latte
allor

allor che cessa l' affluenza e generazione del latte medesimo, tornano flosce, sgonfiano, e conservano simili vestigj di piccole cicatrici, o di lineette bianche, e lustre; anzi pendono rilassate, e più brutte per l' areola, e per i capezzoli divenuti più grandi, e più oscuri. Questi segni sono poi maggiori, e più patenti in quelle donne che hanno allattato dei fanciulli.

5. Le macchie cerulee delle cosce, e delle gambe.

Queste macchie prodotte nelle gravide dalle varici, se le varici sono state grandi, sussistono per più anni.

§. 125. Il valore di questi contrasegni non è sempre lo stesso. Il secondo è quasi infallibile, e costante; nè sogliono ancora ingannare il freno abolito, le lineette lustre del basso ventre, e delle mammelle, e molto più le rughe loro, e le macchie delle cosce. Nondimeno alle volte restiamo dubbiosi nel riconoscere lo stato del freno, se sia corto o lungo. Le rughe e lineette del basso ventre, e delle mammelle, nelle femmine che hanno cura del loro corpo, che non danno latte, e la cute delle quali è fornita di grande elasticità, alle volte ancora dopo alquanti parti, sono talmente appianate, che appena vi rimane alcun segno certo, e non si distinguono dalle vergini. Di più l' idropisia ancora dilata il basso ventre, e dileguata che sia, lascia nella donna guarita le rughe come se avesse partorito. Il colore inoltre delle areole è alle volte oscuretto in quelle femmine, che sono naturalmente di color bruno, in quella stessa maniera che in altre per lo più suol' essere di color di rosa. Nè le sole mammelle pendenti, e flosce, dimostrano il parto seguito, mentre per diverse altre cagioni, e principalmente per l' età, e per la disposizione all' etisia, possono esser tali ancora in una vergine intatta: anzi una quasi verginale robustezza nella forma esposta di sopra, rimane alle volte dopo molti parti. Le macchie delle varici dopo molti anni spariscono,

no, e in molte femmine mancano del tutto colle stesse varici. I segni che si ricavano dalle orine, non meritano di essere neppure considerati.

C A P I T O L O V I I .

D E L L A G R A V I D A N Z A .

§. 126. **T**Roppo lungo farei, se io volessi riportare tutti i segni della gravidanza, che da altri sono stati riportati. Moltissimi di questi sono incerti, comuni a varie malattie, e non conseguenze necessarie del concepimento. Molti sono del tutto falsi, e stabiliti sopra erronee ipotesi. I più reali e veri ancora sono talmente oscuri, e confusi, che niente ci porgono di certezza. Tuttavolta farò quì menzione dei principali.

§. 127. Facendosi pertanto ricerca della gravidanza di una donna, subito dobbiamo dare uno sguardo alla sua fecondità, la quale può essere difettosa per varie cagioni, moltissime delle quali sono occulte, e alcune poche soltanto riconosciute; se si scorgono in qualche donna questi difetti, fanno che la stessa possa restare assoluta, venendo imputata rea di gravidanza; ovvero in diverso caso, sia tolta relativamente ad essa la speranza che abbia figliuoli.

§. 128. La cagione più comune che rende la cosa dubbia è l'età, o troppo tenera, o troppo avanzata.

§. 129. In qual tempo la fanciulla sia capace di concepire, non si può determinare, a cagione della diversità del paese, del temperamento, e di altre simili circostanze: ma ella rare volte diviene grvida avanti che incominci ad avere i mestruai, e che arrivi alla pubertà. Contuttociò alcune volte accade, che da questo flusso troppo ritardato, alcune povere femmine sieno angustiate da mol-

ti dei medesimi sintomi, che sogliono accompagnare la gravidanza: tali sono il basso ventre duro e tumido, ed in simile stato le mammelle, la languidezza, l'appetito mancante o vizioso, e altri consimili, i quali segni, conosciuta la cagione della sterilità, non sono una prova della gravidanza.

§. 130. Per la medesima ragione cessando il flusso mestruale, rarissime volte le donne divengono gravide, o forse mai. Questa cessazione poi frequentissimamente è accompagnata da sintomi d'un vero concepimento (§. preced.) e con vana speranza delude le buone vecchiette, che sospirano aver prole.

§. 131. Neppure le viragini, alle quali manca per tutto il tempo della loro vita il flusso mestruale, sogliono concepire. Gli esempj contrarj a questa regola, sono rarissimi nei nostri paesi. Non concepiscono pure altrimenti quelle, che per una serie non interrotta di gravidanze, e di parti, hanno contratto un ostacolo a questa escrezione.

§. 132. Quelle donne ancora debbono tenersi per sterili, che sono soggette a mestruj troppo abbondanti, e simili all'emorragie dell'utero, e quelle che nei consueti tempi del mestruo non ritengono il feto concepito. A questa classe si debbono parimente annoverare quelle, che sono travagliate da un flusso bianco copioso, e propriamente uterino, e particolarmente prodotto da un parto difficile.

§. 133. Non possono ancora concepire quelle, che sono imperforate, sia poi in esse tutta la vagina chiusa esternamente dall'imene, o sia nel mezzo del tutto riturata per nata coalescenza dopo un parto difficile, e finalmente per la fessura trasversale dell'orifizio uterino lacerata da un parto parimente difficile, e poi riunita, o pure per essere essa rima trasversale coperta da una membrana insolita, e non naturale portata dalla nascita.

§. 134. Spesso ancora sono sterili quelle donne, nelle quali la vagina, o l' utero è contaminato da un ulcere, da un polipo, o da altro gran tumore, ed escrescenza carnosa, e sopra tutto da un carcinoma.

§. 135. A bella posta tralascio di riferire molte cagioni incerte, occulte, e non appartenenti al nostro soggetto, il numero delle quali non è scarso. Si conclude che il primo contrassegno della gravidanza sia la fecondità.

§. 136. E' sommamente difficile a conoscersi, se una donna abbia concepito, avanti che appariscano i segni genuini della gravidanza, e non si può sapere se non per congettura.

I. Il primo probabil segno è un certo particolar piacere, che prova l' uomo, e la donna oltre l' ordinario, il quale nella donna suol' essere maggiore, ed è prodotto da i genitali divenuti più turgidi, e dalla rigidità dell' utero colle parti annesse; anzi alcune donne in tal tempo si svengono. Se l' uomo poi ha molto piacere, significa essere il suo seme molto fecondo. Nulladimeno questo segno può ingannare, a cagione dell' ignoranza dei coniugi, e per la debole sensazione di certe femmine; anzi alle volte le donne provano questa sensazione di piacere senza concepire.

§. 137. II. Non sappiamo se ambidue i sessi insieme spargano il loro seme: malamente asserirono gli antichi, che quello della donna avesse la sua sede nelle lagune mucose.

III. Si riguarda in verità nell' uomo per segno del concepimento l' asciuttezza del pene, il quale denota che il seme sia restato nell' utero, ma questo segno è fallace, poichè le rughe, e la situazione della vagina possono trattenerlo, e perchè succeda la concezione, è solo sufficiente una piccola porzione dell' umore spermatico.

§. 138. IV. Dalle donne più sagaci, soltanto un minuto o due dopo il concepimento, si osservano i seguenti
fc-

fenomeni: un certo dolore quasi colico intorno all' ombellico, un gonfiamento, una tensione convulsiva, un riempimento, un moto, e un calore vagante nel basso ventre. Il medesimo giudizio formar si dee dalla languidezza, assopimento, e fiacchezza delle membra, maggiore del solito, che segue dopo il coito, da una piccola sensazione di freddo, e ribrezzo sparso per tutto il corpo, provato da alcune. Anzi diverse sentono nell' utero un moto, come se fosse gonfiato da aria, e questa con strepito vi si raggirasse, durando loro tal sensazione alquanti minuti: alle volte alcune distinguono lo stesso moto a traverso nell' infima regione del basso ventre, verso l' uno e l' altro fianco. In altre questi rigurgiti d' aria si fanno sentire dopo un quarto d' ora. Pare che abbiano origine da un nuovo stimolo, e inquietudine universale, che è prodotta da una nuova irritazione, e dall' afflusso del sangue.

§. 139. V. Il giorno dopo al concepimento il basso ventre gonfia, cagionando una certa ansietà e tristezza convulsiva, e la donna non può soffrirvi sopra alcuna compressione o pigiatura.

§. 140. VI. L' orifizio chiuso dell' utero non può denotare che sia seguito il concepimento. (§. 52.)

§. 141. Seguito il concepimento nascono quattro sintomi denotanti la gravidanza, cioè si manifestano;

- A. Un nuovo stimolo.
- B. La soppressione de' mestruai.
- C. L' accrescimento dell' utero.
- D. Lo stesso feto.

§. 142. Si trovano frattanto delle donne, che non s' accorgono di novità veruna, se non al mancare del mestruo. Altre poi fino dai primi giorni del concepimento sono talmente da questa nuova mutazione incomodate, che rendonsi realmente malate. Vi possono ancora essere altre cause vevoli a produrre le istesse malattie: e perciò i segni presi da queste affezioni morbose non sono se non
pro.

probabili (si consulti il §. 129.) e si rendono unicamente manifeste, o sicure, allorchè ciò si ricavi da esperienze avute. Alcune poi sono così pratiche, che alle volte da certe piccole mutazioni, rilevano sicuramente il seguito concepimento.

§. 143. I segni comuni sogliono essere la nausea, il vomito, un appetito fregolato e insolito, la trittezza, la collera, la pigrizia, le forze debilitate, la sonnolenza, la malinconia, l'abborrimento verso l'uomo, gli occhi incavati, languidi, lividi, turbati, le palpebre umide, e rilassate con un cerchio intorno livido, e giallognolo, il dolore dei denti, il copioso sputare, le pustole della faccia, il ventre stitico.

§. 144. Cessato il mestruo, e nata la pletora, suole aggiungersi il dolore di capo, la faccia rossa, e turgida, la vertigine, il dolore dei denti, gli scuotimenti delle gambe, e braccia, degli ardori passeggeri, le macchie del viso, le pustole nella faccia, e nel collo; anzi il naso si rende coperto quasi di una vernice gialla, non per altra cagione certamente, se non perchè il sangue si aduna verso il capo.

§. 145. Quelle che avanti la gravidanza sogliono essere isteriche, e mal sane, dopo aver concepito l'ipello stanno meglio di salute. Cosicchè le pallide divengono rosse, e le rosse al contrario dopo il concepimento impalidiscono.

§. 146. Il principal segno del concepimento succeduto, e della gravidanza incominciata, consiste nella cessazione della purga mestruale. Si dee però notare,

- A. Che ne' primi mesi della gravidanza i mestruai in una donna giovane, e pletorica, possono facilmente continuare, e così esser gravida una donna benchè riveda le sue purghe. Questo sangue certamente viene dalla cervice dell' utero, e spiega ancora come alcuni parti creduti acerbi, realmente sieno maturi.

Alle

B. Alle volte ancora i mestrui possono cessare per altri motivi, e cagionare gli altri sintomi della gravidanza (§. 142. e seguenti); perciò quella che non ha i mestrui, non si dee sempre giudicar gravida.

C. Quella che allatta e non ha i mestrui, può concepire, e perciò non si può formar giudizio dai mestrui.

D. Quì si debbono osservare certe morali circostanze, dalle quali possiamo alle volte conoscere se i mestrui cessino pel concepimento, o per altra cagione.

E. La gravidanza si rende più certa, se cessino i mestrui senza che ne sopravvenga qualche malattia, ma anzi accade lo scioglimento di qualche malore, che anteriormente vi fosse (si consulti Ippocrate Aph. 67. L. V.) e questo senz' altra sufficiente, e manifesta cagione.

§. 147. Alla soppressione de' mestrui ne succede l' aumento delle mammelle; e crescendo si riempiono, induriscono, e non di rado dolgono; le vene di esse si rendono più visibili pel colore ceruleo, la papilla diviene più grossa, e gonfia, di colore più oscuro, e di simil colore è l' areola che la circonda, la quale si rende anche più spaziosa di quello che era; e seminata di piccole prominenze e papillette. Premute poi le mammelle, ne scaturisce una linfa lattea.

§. 148. Questa linfa nelle donne gravide è distinta da strie lattee simili a tanti vermicciuoli, simigliante a quella che pure alcuna volta si sprema dalle mammelle di quelle fanciulle, che non hanno le loro purghe. La prima però, che esce da quelle particolarmente, che per la prima volta sono gravide, non ha queste strie. Inoltre non suol' esservene prima del quarto mese: ed in alcune alle volte apparisce più tardi.

§. 149. Benchè sieno certissimi quei segni, che si hanno dall' accrescimento dell' utero, e dalla mutazione dell' orifizio del medesimo, nondimeno quì ancora non si debbono mai trascurare le dovute cautele. Subito do-

po

po il concepimento l' utero s' interna alquanto più dentro la pelvi, ed in modo che il basso ventre si appiani. Laonde la di lui bocca si scuopre più vicina all' orifizio della vagina (§. 56.). Ma questo segno può tuttavolta ingannare,

A. Se l' altezza dell' orifizio non fu riconosciuta avanti la gravidanza.

B. Per varie altre cagioni può l' orifizio calare nella vagina (§. 120.).

§. 150. Dopo il terzo mese poi l' utero sollevasi fuori della pelvi, cresce, e dilata il basso ventre. Poichè l' espansione cagionata dalle malattie del basso ventre molto facilmente si può confondere coll' utero gravido, si dee fare un esame più esatto, acciocchè l' utero gonfio si distingua dagli altri tumori del basso ventre. Questa differenza non si giudica dalla sola veduta, ma si dee dal tatto determinare. Per la qual cosa, affine di togliere ogni incertezza, si dee procurare che la femmina digiuna si sgravi dell' orina, e degli escrementi, e si metta a giacere supina coi lombi bassi, col capo e coi piedi alzati, con i calcagni accomodati presso le natiche, acciocchè la regione del basso ventre resti silentata. Allora il medico ponga la palma della mano sul basso ventre, stenda il dito minimo verso l' osso del pube, il pollice verso l' ombellico. La donna con forte respiro muova il basso ventre, e il professore nell' atto della espirazione comprima leggermente il medesimo. Che se in quel momento sente una resistenza dura, globosa, e che rimanga sopra l' ossa del pube, può star sicuro che l' utero è gravido. Se poi un tumore d' altra natura occupa, e inalza il basso ventre, questo si sente in altro posto, o pure si riscontra che eguale e disteso occupa tutta la regione del medesimo ventre.

§. 151. I seguenti segni ancora distinguono specialmente l' idropisia dalla gravidanza,

Nell

1. Nell'idropisia anasarca il tumore è eguale e disteso per tutta la regione del basso ventre, molle, e compresso col dito, lascia una fossetta, con l'ombelico incavato, e divenuto più profondo a forma di un bicchieretto.
2. Nell'ascite percosso il basso ventre si sente l'ondeggiamento dell'acqua, la quale ancora si ferma in quel lato su cui riposa l'inferma, ovvero gravita, e pende verso l'osso del pube, le quali cose non succedono, se il basso ventre è disteso dall'utero gravido.
3. Nella timpanitide tutto il basso ventre è egualmente gonfio, e duro, e venendo compresso duole.
4. Le mammelle nell'idropiche diminuiscono, si fanno flosce, e non stillano la linfa caratterizzata con strie lattee. Il contrario si osserva nelle donne gravide.
5. Ordinariamente nell'idropisia, soprattutto anasarca, i piedi sono i primi a gonfiare, dipoi le cosce, e finalmente il basso ventre. Nelle gravide al contrario prima gonfia il basso ventre, e finalmente negli ultimi mesi gonfiano i piedi. Se a caso l'acqua, che forma l'idropisia è contenuta in un sacco particolare, o nel peritonèo, può non darsi l'enfiagione dei piedi, ma l'esplorazione descritta al §. *preced.* rende manifesta l'idropisia.
6. I sintomi morbosì nell'idropisia crescono di giorno in giorno, nella gravidanza poi o scemano, o totalmente cessano.
7. L'urina dell'idropica è rossiccia, quella della gravida è di color di cedro.
8. Una sete più gagliarda travaglia l'idropica, non però la gravida.

Quando poi l'idropisia è unita colla gravidanza, difficilmente questa si conosce, se non si esamina l'orifizio dell'utero.

§. 152. L'espansione dell'utero cagiona le mutazioni dell'orifizio qui sopra accennate al §. 58. e seg., le quali nondimeno avanti il quinto mese non danno segni certi della gravidanza.

§. 153. Molti altri sintomi accompagnano questa espansione, che preme i visceri del basso ventre, il diaframma, i nervi, ed i vasi. Questi sono il vomito pel troppo cibo, l' indigestione, la stitichezza di corpo, l' incontinenza, o un continuo stitilicidio dell' orina, il respiro corto singolarmente nel far gita, o salire con prestezza, la difficoltà di camminare, l' ombelico gonfio, ed il suo concavo abolito, le moroidi interne, le varici, l' enfiagione de' piedi, i dolori dei lombi, e de' gl' inguini, gli spasmi notturni de' piedi, i dolori de' reni, quali si soffrono nella nefritide ec.

§. 154. Il feto poi col suo moto chiaramente si manifesta per se stesso, se esiste, e vive. Ma essendo questo ne' primi mesi circondato dall' umore dell' amnio copioso, ed avendo la medesima specifica gravità di questo liquore, ed essendo molto tenero di membra, benchè mosso, non eccita nella madre veruna sensazione, e perciò non si può bastantemente sentire. Ma a poco a poco circondato da minor liquido, divenuto più grave, e più robusto, urtando colle sue membra nelle pareti dell' utero, apporta alla madre incomodo, anzi in progresso di tempo le cagiona dei dolori molto risentiti.

§. 155. Non si sa il tempo nel quale per la prima volta dalla madre si senta il movimento dell' embrione. Questo suol seguire in circa alla metà della gravidanza, come le stesse donne lo considerano; ma da ciò noi non possiamo formare un calcolo. Quanto questi periodi differiscono, tanto le gravide sono soggette a sbagliare, mentre ora non avvertono il primo e vero moto dell' embrione perchè debolissimo, ora perchè riferiscono al moto dell' embrione qualunque altra agitazione, che percepiscono nel ventre. Nulladimeno questo termine medio cade quasi fra la decimanona, e la vigesima seconda settimana, principiando il calcolo dal parto fino a questo primo moto. Nei parti maturi di rado ho of-
fer-

servato movimento prima della vigesima seconda settimana, o più tardi della settimana decimaottava: ne ho notati però nelle settimane, 23. 24. e 25. 17. 16. 14. 13. anzi 12. I moti che sono più tardivi della notata prima specie, per il solito appartengono ai parti acerbi, i più solleciti poi appartengono ai parti serotini; e gli uni, e gli altri sono prodotti da errori commessi dalle gravide.

§. 156. Dalle sopradette cause se ne deducono i seguenti corollarj.

I. Avanti il terzo mese non si dà facilmente un certo segno di gravidanza. Sono soltanto probabili indizj, lo scendere dell' orifizio dell' utero, lo spianamento del ventre, la soppressione dei mestruj, la tumefazione delle mammelle, che sono accidenti prodotti dalla soppressione dei mesi suddetti, e da un nuovo stimolo. *Si consulti i* §. 149. 146. 147. 143. 144.

§. 157. II. Dal terzo al quinto mese si può esaminare il basso ventre molto bene, e con sicurezza (§. 150.). Se allora si ritrova la soppressione non interrotta de' mestruj, la successiva diminuzione de' sintomi morbosi, la turgidezza delle mammelle, che aumenta (§. 147.) lo stillicidio dalle medesime d' una linfa carica di strie lattee (§. 148.), l' orifizio dell' utero ingrossato, più molle, e spugnoso (§. 58. e seg.), ed il movimento dell' embrione (§. 154. e seg.), possiamo essere molto sicuri della gravidanza.

§. 158. La diminuzione successiva de' sintomi morbosi (§. 143. e 144.) unita alla non interrotta cessazione dei mestruj (§. prec.) porge un sospetto grandissimo di gravidanza. Poichè la gravida si alluefa a poco a poco a quel nuovo stimolo, e l' eccedente copia del sangue si consuma dall' embrione che cresce. Se poi cessano i mestruj senza l' esistenza del feto, giornalmente si accresce il male, e tanto è lontano, che gl' incomodi da ciò prodotti diminuiscano successivamente, che più tosto ogni

giorno si aumentino, se la soppressione non si scioglie, o naturalmente, o a forza di medicamenti, o col passaggio in altra malattia (§. 146. *lett. D.*).

§. 159. III. Dopo il quinto mese lo stato dell' orifizio dell' utero è il più certo segno di tutti gli altri (§. 59. *e seg.*). Se i precedenti già descritti (§. 156.) perseverano, ed aumentano, allora non rimane alcun dubbio della gravidanza. Siccome pure allora si riscontra la cervice dell' utero tumida (§. 86. *e seg.*) Tav. VI. Fig. 2.

§. 160. IV. Sul principio, e sulla metà del settimo mese, il più delle volte si può sentire il capo del feto (L. C. Tav. VII.) una, due, tre, anzi quattro settimane avanti il parto, l' orifizio inferiore dell' utero diviene teso, resta applicato all' apertura superiore della pelvi, e il capo vicino a questo orifizio resiste alla pressione che gli vien fatta all' insù (§. 91.) Tav. VIII. Fig. 1.

§. 161. Il Medico così certificato della gravidanza, conosce inoltre il termine della medesima dal gonfiamento del basso ventre. Imperciocchè nel sesto mese l' utero sale fra l' osso del pube, e l' ombelico; nel settimo all' ombelico; nell' ottavo nel mezzo tra l' ombelico, e la fossetta del cuore; nel nono gl' integumenti del basso ventre si distendono fino a questa fossetta. Tutte le volte, però, che il ventre è rilassato, e pendente, la suddetta proporzione non ha luogo, ma bensì allora si dee formarne il giudizio dal grado medesimo di tal mutazione. Il Medico forma il giudizio della gravidanza dalla procidenza, e grossezza del ventre.

§. 162. Il giudizio del Medico intorno alla gravidanza ordinariamente si chiede

1. Dalle spose, che desiderano ardentemente aver prole, e si rallegrano ad ogni leggerissimo segno di gravidanza.
2. Specialmente da quelle alle quali cessano i mestrua, a cagione dell' età, e che nondimeno desiderano figliuoli, o vogliono parere meno vecchie di quello che sono.

Dalle

3. Dalle maritate assalite da malattia del basso ventre, v. g. dall'idropisia. Per questo dee quì avvisarsi, che il Medico sia cauto nel prescrivere i medicamenti. La medesima cautela, anzi anche maggiore, si dee avere se le fanciulle fingono di essere travagliate da simile malattia.
4. Dal Giudice, il quale alle volte non può punire una donna condannata alla morte, per la protesta addotta di gravidanza.
5. Dal Giudice, perchè non sia ingannato da una donna amante di risse, e che accusa qualcuno d'averle dato colpi sì forti, che le sia nell'utero morto il Feto, o d'essere stata costretta ad abortire; la quale ancora avendo forse i mestruj, finge di aver sofferta una emorragia, e altri mali di tal sorte.
6. Dai Genitori, e dai Tutori, che bramano di essere assicurati dell'onestà della ragazza.

§. 163. Di niun momento, anzi ridicoli assolutamente sono i segni addotti da molti seguaci d'IPPOCRATE, per conoscere il sesso del nascosto embrione, i quali nessun Medico saggio di questi tempi gli giudica veri.

CAPITOLO VIII.

DEL PARTO.

§. 164. **C**onosciuta dalle cose dette di sopra la teoria del Parto, facilmente si conoscono i sintomi, che lo precedono, e che lo accompagnano, e da questi si ricavano ottimi contrassegni della vicinanza, e dello stato del parto. Nell'ultimo mese i seguenti segni manifestano il parto vicino.

§. 165. I. Il primo segno lo dà un *mucco bianco che geme dalle parti genitali gonfie, abbondante, e denso.*

Le parti genitali in vero di qualunque femmina sana sono

sono sempre bagnate, a cagione degli umori che escono dalle arterie, esalanti, e dalle lacune mucose esistenti nella cervice dell' utero, intorno all' orifizio del medesimo utero, nella vagina, intorno all' uretra, e nell' uretra stessa: nelle gravide poi è maggiore l' afflusso degli umori, e quindi più abbondante la separazione, ed escrezione; dal che ne avviene che le parti genitali di queste sieno più bagnate, e più gonfie, ma senza durezza, e senza dolore. Singolarmente poi intorno al settimo mese cresce l' enfiagione, e si separa un abundantissimo muco, talmentechè in alcune cade in terra, e rassomiglia il flusso bianco: imperciocchè allora la cervice dell' utero si dilata, e i seni mucosi più aperti spargono maggior copia di umore. Nel nono mese finalmente si separa un muco più abbondante, più denso, e più viscoso: imperciocchè essendo più fortemente compressa la cervice dell' utero, viene impedito il ritorno del sangue per le vene, e la copia del siero esce per i vasi destinati allo scolo di esso, ristagna nella vagina, e si fa denso: si aggiugne lo stimolo del capo del feto, che piglia ed eccita un continuo afflusso di umori, il quale stimolo cresciuto nel tempo de' dolori, allora è che ferma il corso dei medesimi umori, che farebbero senza di ciò molto abbondanti.

§. 166. II. I *dolori che presagiscono il parto* (§. 105.) sogliono distinguerfi, in

1. *Prefagienti.*
2. *Veri.*
3. *e Spurj.*

§. 167. I *dolori prefagienti* non sono quasi diversi dai veri, che per il loro grado: producono una molesta sensazione di tensione, la quale nasce nella regione de' lombi, e si avvanza verso il pube, e l' osso sacro, e risveglia uno stimolo di orinare, e di evacuare. Questi primi dolori sono leggieri, e durano poco tempo, e specialmen-

te si fanno sentire fra giorno, e verso la sera, e non impediscono alla donna gravida di fare le sue faccende, ma dovunque ella sia si può promettere che le diano tregua, e la facoltà di attendere alle sue occupazioni. Quelle che hanno altre volte partorito non curano tali dolori, aspettando i veri e maggiori; le primaiole non avendo giusta idea di questi dolori, e tormentate da essi, stimano che il parto sia già vicino, chiamano la Levatrice, e alle volte si agitano con varj, e inutili sforzi.

§. 168. Benchè queste doglie non sieno vere, nondimeno sono molto moleste, dimodochè la gravida presa da un tal dolore non può mutare nè la situazione, nè il luogo dove si trova, finchè non sia passata essa doglia. Durando queste la donna s' infiamma nel viso, e stringe i denti, soprattutto in tal modo tormentano la regione ipogastrica di essa, che il camminare le riesce molesto, e doloroso. Anzi alla gravida apportano talvolta sì grandi inquietudini, che non ha fermezza, s' inquieta, e si lamenta di un' angustia grande nei precordj.

§. 169. Questi dolori sono cagionati dalle prime contrazioni del fondo dell' utero (§. 21.), quando l' uovo preme la bocca dell' utero, e ne spinge il segmento inferiore nella pelvi: per la qual cosa svegliano intorno ai lombi una sensazione molesta; e perchè colla depressione dell' utero, comprimendo l' intestino retto, e la vescica, stimolano ad urinare, ed evacuare il corpo.

§. 170. L' uso di questi dolori è di dilatare a poco a poco la cervice dell' utero, e di aprirne l' orifizio, e in tal guisa rendere l' utero più atto a mandar fuori il feto.

§. 171. Si possono poi questi dolori distinguere dai veri, per la loro più breve durata, e forza minore, e per lo stato dell' orifizio dell' utero. Imperciocchè quantunque nel tempo di questi dolori il capo del feto, o l' umore dell' amnio racchiuso nelle membrane, sia premuto verso l' orifizio dell' utero, nondimeno se questo orifizio

tro-

trovasi peranche pendulo e rilassato , sebbene essi dolori sieno realmente presagienti il parto , non possono giudicarsi i veri ed ultimi concludenti , se prima non si riscontra , che l'orifizio dell' utero resti appianato , e soltanto teso il segmento inferiore del medesimo .

§. 172. Neppure tutti i dolori forti del ventre , ed a ripresa , nelle gravide si devono prendere per presagienti il parto . Imperciocchè le gravide sogliono essere tormentate da dei dolori periodici del dorso , e dei lombi , simili a quelli del parto , i quali intorno alla fine del terzo mese somigliano quelli , che sono soliti a produrre , o ad accompagnare l' aborto , e negli ultimi mesi della gravidanza il parto immaturo . Si distinguono dai veri dolori (a) per l' impressione dolorosa che producono nella regione soltanto del ventre , senza scendere nella pelvi ; (b) e cessano sgravato che sia l' intestino retto ; la qual cosa fa dimostrativamente vedere , che i medesimi non riconoscevano per cagione , che lo spasmo di tale intestino , e del colon .

§. 173. La gravida stia tranquilla durante questo dolore che presagisce , nè rimuova dall' utero la di lui forza , spingendola verso le parti superiori col pianto , colle grida , e con i sospiri , nè con grande sforzo procuri di promuovere il parto , il quale non si dee sperare fino a tanto che la bocca uterina non si renda appianata . Questi sforzi in vero debilitano le forze della gravida , che si debbono conservare pei veri dolori , e non sono peranco sufficienti ad appianare i labbri pendenti della bocca uterina per ajuto del parto . Con tutto ciò dal momento che la gravida è sorpresa da questi dolori dee procurare , che sieno pronte tutte le cose necessarie al parto , e che sia chiamata la Levatrice , la quale esamini lo stato dell' utero . Imperciocchè questi dolori non hanno un tempo prefisso , e si cangiano in legittimi ; sopraggiungendo i quali , ed essendo il tutto disposto , spesso
il

il parto segue più presto di quel che si credeva , soprattutto nella donne che hanno altre volte partorito.

§. 174. III. *L'orifizio dell'utero.*

Quanto più si avvicina il termine della gravidanza, tanto più molle diventa l'orifizio dell'utero, e si apre. Da principio in vero l'apertura esterna del medesimo si dilata, dipoi l'interna ancora fa l'istesso, in maniera che finalmente le labbra rappresentano una bocca aperta, o pure un archetto. Quanto più ancora avvicina il parto, tanto più si spiana l'orifizio, e la parete del segmento inferiore si assottiglia. Ricaviamo un contraffegno più sicuro del parto, che incomincia dalla bocca spianata dell'utero, di quello che si ricava dal di lei dilatamento. Imperciocchè ad alcune, e specialmente a quelle che partoriscono la prima volta, ed a quelle, le quali hanno l'utero situato molto obliquamente, l'apertura interna non si allarga se non quasi nell'atto stesso del parto. Più presto suole aprirsi tutto l'orifizio in quelle che hanno già altre volte partorito (§. 61.) e generalmente parlando per questa cagione suole essere in esse il parto più facile, e pronto. Di rado nelle primipare si suole osservare quell'apertura anticipata, la quale in altre alle volte si osserva una settimana o due, e fino un mese intiero avanti al parto.

§. 175. IV. *La soppressione, o incontinenza dell'orina.*

Dal calare e gravitare dell'utero, ora sul fondo della vescica, ora dal premere il collo della medesima, ne nasce l'incontinenza, o la soppressione. Laonde le gravide dormendo profondamente soffrono una involontaria perdita di orina; dormendo poi leggermente spesso sono sollecitate a orinare.

§. 176. V. *La gonfiezza del basso ventre che scende.*

Avendo la gonfiezza avanti occupato singolarmente l'ombelico, di modo che non vi restava vuoto sotto le coste spurie, scende nell'ultimo tempo della gravidan-

za, e lascia libere le medesime (§. 91.). La pelvi angusta, la gran mole del feto, la situazione obliqua dell' utero, ed altre cose ancora fanno eccezione a questa regola: altre volte questa mutazione succede immediatamente avanti, o nel tempo stesso del parto. Ordinariamente lo scendere è lento e graduato, rare volte precipitoso. Fin tanto che il ventre si abbassa, la bocca dell' utero diviene più alta, e si sente più indietro voltata (§. 57.) talmente che nell' ultimo tempo della gravidanza quasi si sottrae al riscontro. Abbassandosi il ventre, l' orifizio ancora scende un poco nella vagina, e si avvicina al seno esterno; la gravida comunemente siede e cammina con molta difficoltà, e se non vuole pericolare, o cadere ad ogni passo, è costretta a piegare molto indietro il dorso.

§. 177. Queste cose che ho notate, possono succedere alcune settimane avanti al parto. Ma i seguenti segni si manifestano immediatamente avanti il parto.

§. 178. I. *I dolori veri, o sieno i dolori del parto* (§. 166.).

Quando dai dolori presagienti la cervice dell' utero è dilatata, e l' orifizio spianato, per modo che l' azione del fondo con maggior momento vinca la resistenza della cervice, e per questo la di lui azione sia più veemente, e frequente, l' utero si contrae, e cagiona questi dolori. Sono simili certamente ai presagienti, nè differenti da essi se non nel grado, e in una maniera simile principiano ancor essi nella regione de' lombi, scendono obliquamente verso il pube, e l' osso sacro, e producono un' inclinazione, e uno stimolo di andare del corpo, e di orinare. I primi tormentano per uno spazio di tempo più breve, e tra l' uno e l' altro vi corre un intervallo più lungo; i secondi poi sono più gagliardi, e più frequenti. Affliggono con maggior dolore dei presagienti, e sono di maggior durata. Imperciocchè con maggior momento si contrae l' utero, e si comprime il segmento inferiore. La mano nel tempo de' dolori posta sopra
il

il basso ventre, benissimo rileva la contrazione dell'utero, per mezzo dell'indurimento di esso. Le donne travagliate da questi dolori sogliono prendere in mano qualunque cosa si presenti loro, torcere la bocca, e scuotere le ginocchia ec.

§. 179. II. *L'orifizio dell'utero più aperto e spianato.*

L'effetto dei dolori è, che appianate del tutto le labbra dell'orifizio dell'utero, l'apertura del medesimo divenga più ampia, ed ellittica. Per la stessa cagione la parete del segmento inferiore dell'utero si assottiglia a segno, che non rimane più grossa di una carta. Lo stesso segmento ancora dilatato e compresso dalla forza dei dolori, discende insensibilmente coll'orifizio; in modo però, che non cala nella stessa vagina se non in caso di malattia. A cagione della direzione della vagina, si possono toccare le sole parti laterali, ed anteriori, e non le posteriori intorno all'apertura superiore della pelvi, che le sostiene.

§. 180. III. *Le acque formate.*

Così chiamano l'umore dell'amnio premuto talmente da' dolori, il quale spinge avanti le membrane a guisa di una vescica gonfia. Poichè in qualunque dolore, l'umore dell'amnio con gran forza è spinto dal fondo dell'utero verso l'orifizio, avanti al capo del feto, e spinge le membrane dentro l'apertura dell'orifizio, le quali con forza di cuneo aprono, e portano abbasso l'orifizio. Così certamente le membrane rassomigliano una vescica ripiena di acqua, la quale premuta da una forza gagliarda resiste fortemente, ed impedisce che il capo del feto sia sentito dal dito esploratore. Tosto che l'azione del fondo diminuisce, la contrazione del segmento minore riprende vigore; il liquore dell'amnio ritorna dentro; e il capo si può toccare, ricoperto solo dalle membrane, che per la loro sottiliezza neppure si sentono; di nuovo s'ingrossa lo stesso segmento inferiore, l'apertura

ellittica si contrae, e sale, in grado però minore di quello che era avanti al dolore; e finalmente ritorna la quiete.

§. 181. Mentre tali cose succedono nell' utero nel tempo di ciascun dolore, la partoriente ancor non volendo ritiene il respiro, e coll' efficace contrazione dei muscoli del basso ventre, e del diaframma, aiuta l' azione del fondo dell' utero (§. 182. §. 275. e segg.). Indi ne nasce, che la faccia s' infiammi, il polso divenga più forte, e più frequente, e compressi i visceri del basso ventre sopraggiunga il vomito, che è un contrassegno del parto vicino, e giovevole alla partoriente; al contrario potrebb' essere pregiudiziale, e di cattivo segno, qualora fosse continuato, e senza riposo, rimandando fuori qualunque cosa che si facesse prendere alla partoriente, perchè grandemente la debiliterebbe; e potrebbe presagire ancora la stessa morte, se tantoltre si avanzasse da far portar fuori col vomito schietta bile, e sangue nero, o fetido.

§. 182. L' accennata vicenda di dolori, e di quiete, dura fintanto che l' apertura dell' orifizio dell' utero non giunga ad uguagliare l' apertura superiore della pelvi, e togliendosi l' orlo o margine dell' orifizio, non si faccia un canale continuato tra il fondo dell' utero, e la vagina. Allora niuna cosa fa ostacolo al feto, che è per uscire, se non la vagina. Laonde l' umore dell' amnio, non più rispinto anche nell' intervallo de' dolori, resta avanti al capo. I dolori poi per la veemenza, e per la frequenza continuamente spingono più avanti esso umore dell' amnio col capo, ed allargano i lati della vagina. Finalmente la vagina affatto dilatandosi, la vescica formata dalle acque comincia ad uscire dalla vagina, allarga l' orifizio di essa, manda indietro il perineo, si rompe nel tempo dei dolori veri del parto, e subito comparisce ed esce il capo.

§. 183. Mentre ciò succede, la donna sente nella regione

gione della pelvi un dolore particolare, una pressione, ed uno stimolo di orinare, e di andare del corpo (§. 178.) non essendo insolito avanti che venga fuori il capo, che ella anche vada effettivamente del corpo. Finalmente quando il capo passa il seno, in quelle che partoriscono la prima volta il freno principia a restare abolito, stato violentemente, e con molto dolore fino allora stirato; ed in esse parimente più che in quelle le quali hanno altre volte partorito si allarga l'apertura dell'utero, e della vagina, con più acerbo dolore.

§. 184. Gli ultimi *dolori* si riducono a segno fitti, che appena danno intervallo, cagionano grandissimi spasimi, molestano oltremodo la partoriente, e perchè scuotono tutto il corpo, con ragione si chiamano *sconquassatorj*. Nell'atto di essi la partoriente crede, che le sieno lacerati i lombi, e tutta la regione del basso ventre.

§. 185. Presagiscono questi dolori.

1. *Un mucco tinto di sangue*, a cui si dà il nome di *segno*. Senza dubbio l'orifizio dell'utero grandemente dilatato diltrae talmente alcuni vasi, che gettano il sangue, tanto più abbondante, quanto più si avvicina il parto: o una parte delle membrane staccata dall'utero rompe alcuni dei piccioli vasi di esso, dai quali gemono alcune stille di sangue: non però in tutte le donne comparisce questo mucco sanguigno.
2. *La fronte bagnata di sudore*. Questo alle volte si diffonde sopra tutta la faccia, e per tutte le parti superiori del corpo, per causa dell'agitazione, e delli sforzi del medesimo.
3. *L'impazienza della partoriente*. La frequente mutazione del luogo, l'aspetto inquieto, ed i varj desiderj. Sogliono le partorienti quasi chiedendo ajuto prendere colle mani gli astanti, ed i corpi vicini.
4. *Il lamento mandato fuori con voce più alta*.
5. *Il tremito, in quelle che partoriscono per la prima volta*.

I genitali di queste essendo grandemente sensibili, nel tempo del parto, e specialmente in quel momento, nel quale il capo ita per uscire dalla vagina, sono assalite da crudelissimi tormenti: indi nasce un piccol grado, e continuato di convulsioni, che chiamasi tremito, il quale cessa tosto che la donna habbia partorito. Nelle pletoriche, massimamente essendo obliqua la situazione dell' utero, il detto tremito si converte in convulsioni pericolose. Si uniscono alle volte il dirugginìo de' denti, la sincope, o una leggiera sonnolenza fra mezzo i dolori.

§. 186. Incerto è il tempo in cui si rompono le membrane, e si versa l' umore dell' amnio. Ben di rado l' uovo o sia il sacco vien fuori tutto intiero; ciò succede, quando la pelvi è ampia, il parto è immaturo, non però il primo, e non siavi altro insolito impedimento. Nel parto migliore le membrane non si rompono prima, che allargato non sia tutto l' orifizio, e il capo riempia l' apertura della vagina, e che le medesime non sporghino fuori delle parti pudende forzate; fino a tal momento cote- sto sacco o vescica aiuta il dilatamento della vagina, e del seno esterno. Perduto l' umore dell' amnio le contrazioni dell' utero divengono meno eguali, perchè il corpo del feto inegualmente e meno si presta alla loro azione. Nulladimeno sogliono le medesime rompersi frequentemente dentro la vagina, e dentro la stessa bocca dell' utero; quello che si fa più tardi dai dolori moderati, molto presto si produce dai gagliardi; prettissimo poi ancora quando le membrane sieno molto sottili, e molto tardi quando sieno grosse. Diversamente succede, quando l' utero, e il feto sono mal situati.

§. 187. Benchè l' uovo o sacco dalla forza de' dolori sia depresso nell' asse della pelvi (§. 111.) nondimeno dalla parte posteriore della vagina, e dal perineo si muove verso la parte anteriore della medesima, e verso il seno esterno, calando sopra un piano inclinato, e curvo (§. 9.).
Do-

Dopo che l'umore dell'amnio è uscito, l'occipite è diretto verso il seno con quella parte di se, nella quale la futura sagittale si unisce alla lambdoidea, ed essendo esso acuto, a somiglianza di cuneo, può spingere avanti le adiacenze, dilatare le vie, aprire il seno, e reprimere il perineo. Frattanto il fincipite colla faccia è posto dietro al perineo. Allontanato indietro il perineo, il vertice e il fincipite escono fuori del seno, e l'arco dell'osso del pube (§. 11.) fa talmente l'uso d'ipomoclio, che appoggiandosi a quello la nuca, la faccia esce fuori. La minore altezza ancora degli ossi del pube aiuta lo scendere dell'occipite prominente sotto quest'arco; imperciocchè possiamo considerare l'occipite come la punta di un cono la di cui base sia la faccia.

§. 188. Del rimanente la comparsa involontaria delle orine, che succede nel tempo del parto, avanti che il capo cali nella pelvi, non si dee confondere coll'uscita dell'umore dell'amnio, nè delle acque nominate spurie.

§. 189. L'umore dell'amnio si distingue per la sua consistenza dall'orina. Questa è sottile, limpida, e giallognola, o rossiccia, quello poi è grosso, glutinoso, meno trasparente, biancastro, mucoso, quasi imbevuto di marcia, di un colore e odore particolare, e moltissimo nauseante. Se farà uscita l'orina, la vescica acquosa dell'amnio si tocca alla prima comparsa del dolore, ma se farà uscito l'umore del medesimo, si sentirà solamente il capo.

§. 190. Una, o due settimane avanti il parto, anzi alle volte più presto, geme dalle parti genitali della donna gravida un copioso involontario umore, che non è accompagnato da alcun dolore, e non è indizio di parto immaturo. Allora l'orifizio dell'utero è dilatato soltanto quanto basta a ricevere il dito minimo. Quando poi è imminente il parto, l'umore dell'amnio racchiuso tuttavia nelle membrane si sente. I Periti dell'arte ostetricia

cia chiamano questo flusso, *profluvio dell' acque spurie*.

§. 191. Non si fa l'origine di questo umore. Non si può attribuire all'allantoidèa rotta, nè al trasudamento, nè alla lacerazione delle membrane. Si accosta più al vero il dire, che nasca dalla rottura di qualche vaso linfatico, di qualche idatide nella cervice dell'utero, da una scoppiata idropisia esistente nelle stesse membrane, ed alla rottura d'un uovo infecondo.

§. 192. Pertanto se nell'ultimo mese della gravidanza all'improvviso comparisca venir fuori dalle parti genitali un umore, questo non si giudichi dell'amnio, se prima non si sarà ciò con riscontri verificato. Laonde la gravida non si dee stimolare a fare ancora gravi sforzi: anzi se il tatto ci averà assicurato quell'umore essere acque spurie, le si dee persuadere il riposo, acciocchè non si dia motivo ad un parto immaturo. Poichè non ogni profluvio di acque spurie è senza pericolo, ma alle volte l'utero privo di questo umore perduto in copia, è necessitato a contrarsi.

§. 193. Finora nel parto abbiamo condotto il feto sino all'uscita del capo. Nel parto naturale spontaneamente ne vien dietro il corpo. Il capo che è la parte maggiore del corpo ne ha preparata la strada. Gli omeri in vero sono più larghi, ma l'apertura superiore della pelvi lascia loro libero l'ingresso, nè vi è nell'apertura inferiore cosa, che ne ritardi l'uscita (§. 9.).

§. 194. Ancora l'umore dell'amnio scorrendo immediatamente avanti al feto, nel parto felice rende lubriche le strade, che sono bagnate da umori muccosi separati nella cervice dell'utero, e nella vagina. Una inverniciatura untuosa crassa, e tenera rende, e conserva l'istesso corpicciolo del feto levigato, mobile, e immune da qualunque pericoloso soffregamento.

§. 195. Nè si dee passare sotto silenzio la mutazione del capo, che succede nel parto. Nell'utero è rotondo, e un

e un poco maggiore dell' aperture della pelvi, ma dalla forza de' dolori, e dalla resistenza del contorno della pelvi, vien ridotto in una forma lunga dall' occipite alla fronte; contribuiscono a questo allungamento le suture degli ossetti, e la prominenza formata nell' occipite al principiare della sua discesa.

§. 196. Non si devono tralasciare i varj periodi di discesa dell' uovo, o del capo, o di altra qualunque parte. Il primo è quando dilatato il segmento inferiore, il capo compreso dentro l' apertura superiore della pelvi è cinto dall' apertura dell' utero come da una ghirlanda. Il secondo, quando il capo riempie per modo la capacità della pelvi, che si possa toccare vicino al seno delle parti pudende; allora dicono, che si può porre sopra il capo la corona. Il terzo tiene fisso il capo nel seno delle parti pudende, con fiero dolore della partorienti, come se fosse crudelmente lacerata. Il quarto manda fuori il corpo. Il quinto la placenta.

§. 197. Dopo il feto esce ancora la placenta, staccata dalla continuata contrazione dell' utero. Le fibre dell' utero contratte dalla placenta espellono la medesima, che si stacca nella seguente maniera; scendendo il fondo, e il corpo dell' utero contraendosi verso l' asse longitudinale, spingono quella già mobile verso l' orifizio, e la mandano fuori.

§. 198. Adunque con tali artifizj si compisce il parto semplicissimo, sanissimo, e non accompagnato da alcuno straniero sintoma, o sia il parto intieramente naturale, e facile.

C A P I T O L O IX.

DELLO STATO DELL' UTERO DOPO IL PARTO.

§. 199. **L'** Utero per sua propria natura (§. 95.) nuovamente si contrae, finchè non sia tornato al pristino stato, e quasi come era avanti della gravidanza. La forza elastica, che ha molto sofferto, perdendo qualche poco della sua attività, non è maraviglia, che l'utero non riceva più la stessa robustezza, e strettezza, e non si chiuda in tutto il suo orifizio (§. 124. *num.* 2.).

§. 200. Contratte le fibre motrici dell'utero, i vasi di esso dilatati dal sangue contenuto, in parte sono compressi, in parte di nuovo esercitano la propria forza di contrazione: quindi diminuitane la capacità, spingono per mezzo dei vasi capillari nei tronchi più grandi delle vene la porzione più sottile del sangue contenuto, spargono poi per mezzo dei maggiori orifizj il sangue più grosso nell'utero, e cagionano l'emorragia, la quale, contraendosi sempre più l'utero, cessa da per se dopo una mezz' ora, o un' ora intiera, o al più dopo due.

§. 201. In questo intervallo i vasi dell'utero non si chiudono affatto, ma rimangono aperti per uno spazio di tempo indeterminato; in alcune alle volte per più settimane, in altre senza verun danno, appena uno o due giorni, anzi poche ore tramandano sul principio un leggiero stillicidio di sangue, e indi di fiero grosso quasi di sangue e di latte. Chiamano quello *Lochj rossi*, questo poi *Lochj bianchi*. I vasi a poco a poco chiusi, per aver ripresa la loro elasticità, tramandano solamente un fiero, finchè affatto vengano a chiudersi.

§. 202. Se questa contrazione dell'utero si effettua egualmente in tutta la di lui circonferenza, ed il sangue

gue che esce non si trattiene in esso, il tutto passa senza dolore. Soffre poi molto la partoriente, se le fibre si contraggono inegualmente, e le une dopo l'altre; succeda poi ciò per la debolezza originata dalla gravidanza, dalla situazione obliqua dell'utero, dalla posizione trasversale del feto ec. questa debolezza è diversa secondo la diversità delle fibre, o per la lunghezza del parto, o per l'immaturo spargimento dell'umore dell'amnio, che cagiona una ineguale contrazione intorno alle membra del feto, continovata anche dopo il parto; o per la troppo veloce contrazione dell'utero dopo esso parto, o pel sangue aggrumato che ristagna dentro i vasi, e nella cavità dell'utero, o per una porzioncella di placenta, o di membrana rimastavi; o per l'aria introdottavi, che produce lo spasimo; o per qualunque altra cagione.

§. 203. Questi dolori sono chiamati *dolori dopo il parto*: la sensazione de' quali in alcune è simile al dolore vero, che precede il parto, in altre allo spurio. Per tanto il dolore della prima specie (§. 178.) nato nella regione de' lombi cala verso il pube, e l'osso sacro, e stimola a andar del corpo, e ad orinare, di maniera che non di rado l'orina, e gli escrementi, e singolarmente gli umori contenuti nell'utero, o altri corpi stranieri, in una maniera meno grande, e meno forte, ma in parte somigliante ad un vero parto, sono mandati immediatamente fuori. Quello poi della specie seconda passeggia nella regione del basso ventre sopra il pube, e verso il dorso.

§. 204. Nella medesima maniera questi dolori sogliono tormentare tanto quelle che partoriscono per la prima volta, quanto quelle che hanno già dato alla luce altri parti; in alcune certamente con maggiore, ed in altre con minor veemenza, se forse non si rendono più soffribili in quelle che partoriscono la prima volta, per la maggior robustezza dell'utero. Se non sopraggiungono sintomi stranieri da per se cessano dentro lo spazio di ventiquattro
I 2 ore;

ore ; nel mezzo di questo termine sogliono crescere per la veemenza , e per la frequenza , e dopo tal tempo sogliono diminuire .

§. 205. Benchè i semplici dolori sieno privi di qualunque pericolo , nondimeno alle volte tormentano a segno , che le partorienti giudicano più leggieri i dolori stessi del parto , e non è maraviglia perchè l' intensione dei dolori nel parto è sperimentata meno ineguale .

§. 206. Il sangue , che finora teneva disteso l' utero , dalla contrazione del medesimo è spinto verso l' alto dopo il parto ; portato verso le mammelle , aumenta e distende le medesime , e produce una separazione più abbondante del fiero latte , e tosto di latte effettivo , svegliando nel corpo una febbre efimera , addomandata *febbre del latte* . Queste cose sogliono per lo più succedere il terzo giorno dopo il parto , al qual tempo l' utero si trova quasi del tutto contratto .

§. 207. Quella stessa febbretta produce una buona separazione di latte , come per una specie di crise , il quale avanti questo tempo era fieroso , sottile , e detto *Colostro* .

§. 208. Manifestano , e distinguono una donna puerpera da quella , che ha il flusso mestruo , i seguenti segni .

1. Le parti genitali esterne gonfie , rilassate , e la vagina dilatata .
2. La bocca dell' utero rilassata , cedente , gonfia , e non chiusa bene .
3. Il basso ventre grande , cedente , pendente , e deturpato da grinze , e pieghe .
4. Le mammelle turgide di latte , colla papilla grossa , e col disco o areola larga , e sparfa di minori papillette .
5. Il flusso de' lochj rossi , e bianchi .
6. Un certo odore grave , e proprio a cotesto tempo del puerperio .
7. Nel cadavere l' utero fuol' essere grande , e di grossissima sostanza , o parete .

CAPITOLO X.

DELLA DIVISIONE DEL PARTO.

§. 209. **S**I chiama funzione sana del corpo umano quella che si eseguisce con facilità, con piacevolezza, e con una tal quale stabilità; morbosa poi quella, che vien prodotta con dolore, e con molestia, o grave affaticamento. Questa generale descrizione delle funzioni sane compete certamente a tutti, se si eccettui il parto, con questa differenza che le funzioni chiamate vitali, si eseguiscano senza che se ne abbia sentimento.

§. 210. Diversissima poi è la ragione del parto; imperciocchè ogni parto si fa con sensazione più o meno molesta, con tormento, e affaticamento; laonde per questo titolo differisce dalle altre funzioni, ovvero ogni parto è da reputarsi morboso. La rara facilità di certe donne, che senza molta fatica partoriscono, non le libera da esser considerate come tutte le altre, relativamente al supposto stato: poichè queste non sono libere affatto da ogni e qualunque dolore, ed hanno le parti viziosamente rilassate, e insensibili.

§. 211. Benchè poi qualunque parto sia molesto, e in certo modo morboso, quello nondimeno che ho descritto di sopra Cap. V. e Cap. VIII. è perfettissimo: imperciocchè viene accompagnato da pochissimi dolori, ed a cagione dei minori impedimenti si compisce con somma facilità, ed ultimato che sia non vi è da temere alcun danno per la madre, nè per il feto; perciò questo parto ancora se si paragoni con gli altri, a ragione si chiama *facile*.

§. 212. Quando poi vi sono da superare molti e più gravi impedimenti, talmente che il parto sia congiunto
con

con forti dolori , e si avvanzi molto lentamente , e per questo cagioni nella madre , e nel fanciullo qualche malattia , si giudica *difficile* , e *laborioso* .

§. 213. Che se si presentano al feto , che è per uscire , impedimenti non superabili dalla natura , e il parto non possa seguire secondo le leggi naturali , si chiama *preter-naturale* , e meglio anche si direbbe *artificiale* .

§. 214. Quando che poi , tanto il facile , che il difficile , si possono effettuare per opera della natura , ambi due si chiamano *naturali* . Il primo non ha alcun bisogno dell' ajuto dell' arte , il secondo poi da questa è molto aiutato , ed accelerato .

§. 215. La medesima specie di parto si può chiamare ora difficile , ora preternaturale , secondo che l' impedimento è maggiore , o minore , o per la sua intenzione , o per le sue circostanze : si danno però degli impedimenti , che rendono talora il parto artificiale .

§. 216. Il parto per essere perfettissimo , deve avere i seguenti requisiti .

1. Dee succedere compito il nono mese solare della gravidanza .
2. La pelvi dee avere la figura descritta nel Cap. I.
3. L' utero dee stare nell' asse della pelvi .
4. Il feto dee essere nell' asse dell' utero , col capo pendente in giù , e colla faccia rivolta verso l' osso sacro .
5. Le membra del feto devono avere una giusta proporzione .
6. Col presentarsi del capo non dee portarsi fuori altra parte .
7. La placenta dee venire immediatamente dopo il feto .
8. La madre dee godere di una perfetta sanità .
9. L' impulso de' dolori dee essere efficace .
10. Le parti genitali non devono essere attaccate da male alcuno locale .
11. Il feto dee esser sano , e vigoroso .
12. Il parto in poche ore dee compirsi .

13. La madre , ed il fanciullo non devono esser tormentati da malattia cagionata dal parto .
14. Lo stesso parto non dee essere sconcertato dalla Levatrice .

§. 217. I. Ho detto *il parto dover seguire compito il nono mese della gravidanza* .

La natura , come c'istruisce la più diligente osservazione , ha stabilito il suddetto termine del parto maturo , cioè la fine della trentanovesima settimana , ed alle volte della quarantesima , e difficilmente al di là si prolunga . Niente influiscono in ciò la poca energia del seme , la costituzione inferma e debole del padre , la disposizione atrofica ed etica della madre , e per la quale il feto resti privo del sufficiente alimento ; niente lo stato cachettico della stessa madre , il flusso mestruale , che accade nel tempo della gravidanza , la diarrea , ed altra malattia ; niente una passione più veemente della madre , come farebbe la tristezza ; niente il vitto di cose stravaganti , o il digiuno ; niente la debolezza , o disposizione morbosa del feto ; niente più feti contenuti nell'utero .

§. 218. Imperciocchè tanto è lontano , che queste cagioni trattengano il feto nell'utero , che più tosto ne affrettano l'uscita . Le vedove certamente con queste vane specie si studiano di difendere i loro illeciti amori , e di guadagnare qualche eredità , e di condurre nel loro partito alcuni Medici ancora , o troppo creduli , o avidi di guadagno : ma queste sono cose che non hanno sussistenza , e sono obbrobriose . Non si debbono però riferire a questo genere i feti concepiti nelle tube , o fuori dell'utero , nè i feti induriti , o ossificati , detti ancora pietrificati .

§. 219. Anche avanti il nono mese il feto non si dee giudicare maturo . Nel settimo mese certamente può campare , nondimeno con tutta ragione si distingue dal maturo . Imperciocchè il fanciullo nato avanti il tempo
non

non vagisce come sogliono vagire gli altri, ma manda fuori un suono simile ai sospiri ottusi degli adulti. Subito nato prende sonno, appena piange se non è agitato da qualche dolore, e se non è scosso non si desta, e dedito che sia non appetisce cibo. Molto vagiscono quelli, che sono tormentati dal dolore degl' intestini. E' talmente sensibile al freddo, che le mani, ed i piedi gli diventano presto gelati, se dall' esterno calore non sieno riscaldati. E' ancora debole, e soggetto alle convulsioni, se non sia custodito e nutrito con somma cura, e delicatezza; in un tempo indeterminato dopo il parto acquistate le forze vagisce, cerca il latte, apre vivacemente gli occhi, e guarda all' intorno. Del rimanente accostato alla mammella, se non è impedito da malattia prende il latte, benchè in principio sia in stato di prenderne poco.

§. 220. I seguenti indizj dimostrano il feto essere immaturo.

1. Tutta la cute, specialmente nell' estremità degli arti, e nella faccia rosseggia, o è di color porporino, anzi alcune volte livida. Il sangue si vede a traverso della tenera epidermide. Le palme delle mani, e le piante de' piedi hanno un colore parimente porporino, o livido.
2. Una morvida e alta lanugine cuopre il corpicciuolo, e specialmente le parti laterali della faccia, e il dorso.
3. Il corpicciuolo il più delle volte è macilente, e poco muscoloso; gli arti gracili, e sottili; la cute flaccida, grinzosa, e asciutta, la quale è priva di pinguedine, e fa discernere quasi allo scoperto i muscoli.
4. La fontanella batte fortemente, e le ossa del cranio sono molto mobili.
5. La faccia deforme, e quasi di vecchio, con visibili rughe, e con la bocca grande, e larga. L' aspetto, e l' odore del feto è ingrato. Le labbra, e gli orecchi sono coperti di una tenerissima epidermide di un color di

di rosa, o rosso. Gli orecchi molto sottili, simili quasi a membrane, con le orecchiette piccole e ciondolanti. Dal colmo del mento, e del naso si alzano dei tubercoli sebacei come monticelli biancastri. La lingua è molto rossa.

6. Gli occhi chiusi, con le palpebre unite, le quali molto poco si aprono allorchè al fanciullo è levato il lume d'avanti alla faccia. Gli embrioni immaturi non sogliono guardare attorno con tanta vivacità, con quanto guardano gli altri fanciulli.

7. I capelli biancheggianti, o giallicci, e lucenti, e ne ho veduti alcuni averne molti, e folti, e della lunghezza di un pollice; l'unghie ancora delle mani, e de' piedi corte, tenere, e molli, facilmente pieghevoli come un foglio di carta sottile, e che non sporgono fuori delle dita, sebbene alcune volte siano lunghe nelle mani. I cigli e sopraccigli delicatissimi, e liscissimi. Cosa si deve sentire del volgar segno del feto immaturo ricavato dalla mancanza dei capelli, e delle unghie, a bastanza resta dimostrato.

8. Lo scroto suol'esser rosso, e gonfio, e senza i testicoli, i quali alle volte si trovano negl'inguini sopra gli ossi del pube, e qualche volta uno solo nello scroto. Le femmine hanno ancora le labbra delle parti pudende molto gonfie. Le papille delle mammelle rosse, e piccolissime come un capo di spillo, e senza areola visibile.

9. Il peso del feto immaturo non arriva a sei libbre, spesso è minore delle cinque libbre, altre volte è fra le cinque, e le sei. Essendo il peso de' feti maturi rare volte minore di sei libbre, e sempre maggiore di cinque, il peso più leggero delle cinque libbre indica di certo, che il feto è immaturo; il più leggero poi delle sei indica solo probabilmente, che il feto sia immaturo, e dee ciò ricavarfi dall'altre circostanze.

§. 221. Quanto più il feto si accosta al termine stabilito

lito , tanto meglio può soffrire l'aria , e vivere; nè si dee quì ascoltare il buono IPPOCRATE, il quale afferma che il fanciullo di otto mesi non può campare .

§. 222. Il parto immaturo alle volte si sbriga più lentamente del maturo , se la cervice dell' utero grossa , nè per anco dilatata , nè assottigliata sufficientemente , oppone al fondo dell' utero un più grande ostacolo , soprattutto venendo indebolita l' azione , o forza de' dolori . La strada più stretta , e sufficiente unicamente per un feto di minor volume , rende il dolor del parto più corto ⁽¹⁾. Quelle donne che hanno la pelvi stretta , danno alla luce con più facilità il feto acerbo , che il maturo .

§. 223. Il parto di gran lunga oltre il debito tempo ritardato , se pure alcuna volta succede , senza dubbio è più difficultoso del maturo ; imperciocchè il feto essendo più grande , e lo spazio della fontanella nel capo diminuito , rendono esso capo più grosso , e meno compressibile , e perciò meno atto , o con difficoltà maggiore a passare per la pelvi . Del rimanente i parti molto tardivi sono rarissimi . Ne ho osservati però di quelli di dieci mesi , i quali non sono stati più laboriosi di quelli di nove mesi .

§. 224. Dalle cose sopraddette si può intendere richiederfi per il parto facile , e per sua natura perfetto , ancora un termine prefisso .

§. 225. II. Che *la pelvi abbia la figura descritta nel capitolo primo* , è uno tra i principali requisiti .

L'angustia troppo grande della pelvi impedisce il passaggio al feto ; la troppa ampiezza dispone al prolusso dell' utero . Questa specie di malattia porta seco più incomodo , ed è più pericolosa , che non è il suddetto stato di angustia .

§. 226.

(1) Se il feto nelle supposte circostanze di strada angusta non fosse d' insolita piccolezza , o acerbo , succederebbe tutto il contrario , vale a dire infinitamente più si allungherebbero i dolori .

§. 226. III. *L'utero dee coincidere coll' asse della pelvi.*

In questa guisa certamente niuna nociva resistenza si oppone dagli ossi della pelvi al feto, che è per uscire. Resistono bensì grandemente se l'utero si allontana dall'asse della pelvi, e per questa causa il cranio del feto vien diretto non verso l'apertura per la quale naturalmente dovrebbe uscire, ma verso qualche osso.

§. 227. IV. *Il feto dee stare nell' asse dell' utero col capo in giù pendente, e colla faccia rivolta all' osso sacro.*

Imperciocchè se il feto si discosta da quest' asse, il capo nel suo passaggio è trattenuto dalla resistenza delle ossa, non riceve tutta la forza de' dolori, o presentasi in vece di esso un' altra parte, rende vana qualunque opera della natura, e si rende bisognoso dell' ajuto del Professore.

§. 228. V. *Le membra del feto abbiano una giusta proporzione.*

Le membra, che eccedono la giusta proporzione, non possono venir fuori. Perciò il peggiore impedimento al parto si è il capo più grande del giusto, l' idrocefalo, il basso ventre gonfio, il tumore cutaneo straordinario, e due feti insieme uniti.

§. 229. VI. *Presentandosi il capo, non vi si dee unire altra parte del corpo.*

Non solo la combinazione di un' altra parte rende lo spazio più angusto, ma ancora talmente rimuove il capo dal suo asse, che per tal cagione il parto diventa sempre difficile, e spesso preternaturale. Il cordone in vero quando esce col capo non ritarda l' uscita di esso, ma se vien compreso toglie la vita al feto.

§. 230. VII. *La placenta seguiti immediatamente il feto.*

Per lo più la placenta vien dietro da per se nel parto buono e facile (§. 197.); nulladimeno acciocchè il parto riesca del tutto felice, necessariamente si richiede

questa condizione : sebbene alcune volte nel parto anche felicissimo ella manchi.

§. 231. VIII. *La madre goda di una perfetta sanità.*

Giacchè lo stesso parto è in qualche modo una specie di malattia (§. 211.) congiunto con altra malattia forma un' infermità complicata, e pericolosa. Ma per conoscere qual giovamento, o danno, apportì al parto lo stato sano, o infermo della madre, si cerca

§. 232. Num. 1. *Che cosa conferisca al parto l'età della madre.*

Comunemente si stima che l'età della madre in questo affare sia della massima importanza, cosicchè molti si persuadono, che le donne o di troppa tenera età, o di età troppo avanzata difficilmente possano partorire. In verità io accorderei, che l'età di mezzo fosse la più adattata a soffrire gl'incomodi del parto, e della gravidanza, ed i sintomi del puerperio; ma pure l'osservazione ci fa vedere, che questa età non è quella, la quale rende i parti più facili. Le giovani certamente per la maggior sensibilità delle fibre, talora sono agitate da più dolori: quelle ancora che in età più avanzata partoriscono per la prima volta, patiscono più, e partoriscono con maggior lentezza, a cagione delle fibre più difficili a distendersi, specialmente per la resistenza del perineo; frattanto però se tutto il resto va bene, il parto riesce felicissimo, e questa resistenza nata o dalla sensibilità, o dalla rigidità delle fibre, è superata dalla forza de' dolori.

§. 233. Num. 2. *Se la femmina grassa partorisca più facilmente.*

Il buono IPPOCRATE certamente dichiarò, contro l'esperienza, essere sterili le femmine molto pingui: altri ancora pensarono, che trovandosi l'orifizio dell'utero circondato da pinguedine, potesse essere un grave ostacolo al parto. Ma l'esperienza insegna, che l'orifizio dell'utero non è da veruna pinguedine circondato, e concess

so che ella vi si trovi, pure per essere cedentissima, appena produrrebbe alcuno impedimento, come non produce alcuna resistenza al feto quella, che trovasi intorno alla vagina, e alle parti genitali esterne. Le troppo grasse soffrono solo l'incomodo di avere minor forza ne' muscoli del basso ventre, e del diaframma, e di poter ritenere il fiato solamente per un brevissimo spazio di tempo, e perciò non possono produrre che brevi e deboli sforzi: nulladimeno la minore azione de' dolori è compensata dalla minor resistenza della cervice dell'utero, cagionata dal rilassamento delle fibre.

S. 234. Num. 3. *Se la troppo macilente provi maggior difficoltà nel partorire.*

E' ridicola la ragione presa dall'osso del coccige, quasi che difficilmente non possa cedere per i ligamenti inariditi, o quasi seccati: poichè i ligamenti non si seccano in un corpo sano, benchè macilente, qualora sia in una età atta a partorire. Del rimanente quei ligamenti che in un corpo più robusto fortemente resistono, indicano esservi ancora una maggiore e proporzionata forza delle fibre dell'utero per vincere quest'ostacolo.

S. 235. Num. 4. *Se la donna piccola partorisca più difficilmente.*

In questo caso il feto corrispondendo alla statura della madre, il di lui cranio suole avere la giusta proporzione alla pelvi della medesima: non presentandosi adunque al feto alcuno speciale ostacolo, non pare che vi sia alcuna cagione sufficiente per produrre un parto difficile.

S. 236. Num. 5. *Se la gobba, e la zoppa partoriscono più difficilmente.*

Se la gobba, e la zoppa hanno la pelvi ben conformata dalla natura, per cotesti vizj il parto non è impedito. Può certamente succedere, che nella gobba venga più lentamente per il vizio del petto, perchè non può
rite-

ritenere lungamente il fiato, e fare sforzi molto gagliardi. Se poi l'esser gobba, o zoppa, ha avuto origine dalla rachitide, per lo più vi si aggiunge una notevole strettezza, e cattiva conformazione della pelvi (§. 12.). Allora succede, che tanto le gobbe, che le zoppe partoriscono più difficilmente.

§. 237. Num. 6. *Se la debolezza della partoriente renda il parto difficile.*

L'esperienza dimostra che la debolezza della madre non ritarda il parto se non vi sieno altri impedimenti. Imperciocchè per partorire, l'azione del fondo dell'utero dee superare la resistenza della cervice del medesimo. La partoriente robusta in vero fa gagliardi sforzi, ma anche la cervice oppone una forte resistenza: la debole poi manda fuori il feto con deboli sforzi, ma è debole ancora l'ostacolo della cervice. Adunque nell'uno, e nell'altro caso, all'azione è proporzionata la resistenza, e per questo l'effetto riesce uguale. Si eccettui il caso, in cui benchè tutte le altre circostanze, sieno favorevoli, le forze della donna sono talmente infievolite, che cessino gli stessi dolori, e si debba ricorrere al sussidio dell'arte per estrarre il feto.

§. 238. Num. 7. *Se vi sono malattie che possano contribuire al parto.*

A Vi sono assolutamente alcune malattie, che rendono il parto difficilissimo, anzi preternaturale, cioè le convulsioni, e l'emorragia dell'utero, delle quali a lungo si parlerà.

B Altre, come sono le affezioni spasmodiche e dolorose, specialmente del basso ventre: per esempio il vomito morboso (§. 181.) la colica, la nefritide, la tosse gagliarda, la dissenteria, e massimamente il tenesmo, accrescono la naturale difficoltà del parto. Imperciocchè irritata, e contratta per consenso la bocca dell'utero, ne nascono de' dolori spurj contrarj ai veri. Sempre di-

diminuifcono ancora la forza de' veri dolori, e l'azione della refpirazione.

C Ancora le fteffe malattie del petto fono alquanto inafprite dal parto, e alquanto diminuendo l'energia degli sforzi, e non permettendo fennonchè malamente fia ritenuto il fiato, ritardano lo fteffo parto.

D L'ernie, fpecialmente ombilicali, impediscono il ritenere il fiato, e la contrazione de' mufcoli del petto, le medefime fi aumentano a fegno, che non di rado fi fanno incarcerate. Si debbono ftimare peflime quelle, che gonfiano le labbra del feno. Dall'ernia incarcerata, per la prefione fatta in quelle vicinanze dal feto, con molta facilità fuol venirne la cancrena, fe avanti i dolori, gl'inteftini non fieno ftati rimelfi.

E L'enfiagione, e il dolore de' piedi, e le varici, debilitano le forze, e la contrazione de' mufcoli.

F L'altre diverfe malattie non accrefcono di natura loro il travaglio del parto: quefte poi inafprite, e convertendofi in un carattere più maligno rendono ancora il puerperio molto pericolofò: poichè, quando vi è un'altra malattia, nel tempo de' dolori fegue un maggior'orgafmo del fangue, ed un maggiore indebolimento di forze.

G Altre malattie non fi rifanano fe non dopo il parto.

H Quelle poi che nafcono dalla gravidanza compito il parto, ceffano da per loro.

S. 239. Num. 8. *Se le donne indocili, o pufillanimi cooperino a ritardare il parto.*

Perchè le donne di quefto carattere col ritenere il fiato non ajutano la forza della contrazione dell'utero, ma con i loro fofpiri, e grida diminuifcono la forza de' dolori veri: e perciò languidamente, e fvogliatamente vengono a produrre i neceffarj sforzi. Inoltre ricufano di effer pofti in una conveniente fituazione, e per quefta ragione maggiormente ritardano l'ufcita del feto
in

in vece di favorirla. Ancora un improvviso, e grande spavento alcuna volta può sospendere l'azione dei dolori.

S. 240. IX. *Soprattutto l'impulso de' dolori sia efficace.*

Questo in verità difficilmente è per mancare, qualora si trovino i dovuti requisiti. Che se per le cagioni addotte di sopra (S. 233. 236. 237. 239.) o per altre ancora oltre le suddette, alle volte apparisca minore la forza de' dolori, questa si dee ajutare coll' arte, o fisica, o morale. Se l'utero è situato obliquamente, la forza de' dolori, che manca, si può in alcuni casi risvegliare per mezzo dell' arte.

S. 241. Non sono certamente lodevoli i dolori di una forza subita, e grande, e che producono un precipitoso parto. Da ciò ne sogliono nascere i seguenti mali.

1. L'umore dell'amnio, rotte le membrane, si versa prima del tempo.
2. La bocca dell'utero si apre violentemente con gran dolore, si abbassa, ed anche si lacera.
3. Vien lacerato ancora il perineo.
4. Si rompe il cordone ombellicale.
5. La placenta staccandosi tutta ad un tratto, e subitamente cadendo, lacera l'utero per modo che si perda in larga copia il sangue.
6. La medesima quando è fortemente attaccata, tira seco il fondo dell'utero fuori delle parti genitali, e vi produce l'infiammazione.

S. 242. X. *Le parti della generazione non debbono essere affette da malattia locale.*

Quantunque sieno molte le malattie delle parti della generazione, che possono rendere difficile il parto, nondimeno tutte, e ciascuna in particolare, non sono tanto dannose quanto sembrano in teoria a molti; nè pure ogni specie d'infiammazione è causa che il parto si renda difficile.

S. 243. I generi principali di tali malattie sono.

Un

- A Un certo tumore infiammatorio, scirroso, ulceroso, e canceroso intorno all' orifizio dell' utero, il quale impedisce il dilatamento di esso, e lo rende moltissimo dolente.
- B Il tumore della vescica, o dell' intestino retto comprimente l' orifizio dell' utero, e la vagina. A questo appartiene ancora la vescica troppo tumefatta dall' orina; l' intestino retto ripieno di duri escrementi; il calcolo pure, che intasa l' uretra, o il collo della vescica.
- C L' orifizio dell' utero lacerato da un parto antecedente molto difficile, o per altra cagione, e indi cicatrizzato, e reso quasi del tutto chiuso: tali cicatrici certamente, acciocchè l' orifizio venga ad aprirsi, è necessità che tornino a lacerarsi con fieri dolori.
- D La vagina, con le sue pareti insieme attaccate, o nella sua imboccatura, o nel mezzo, sia naturalmente, sia per causa di un parto antecedente molto difficile. Qui ancora appartengono le varie conformazioni preternaturali.
- E I tumori della vagina, quali sono i grossi funghi, l' escrescenze carnose, le infiammazioni, le ulceri ec. qualche volta rendono angusta la vagina in modo, che appena vi penetri lo specillo.
- F Il prolusso dell' utero, ovvero della vagina.
- G L' ernia dell' utero.
- H L' infiammazione del medesimo, l' ascesso ec. per le quali circostanze ne avviene che meno convenientemente, e per l' ineguale tensione, l' utero si contragga con dolori violenti, ed il puerperio si renda pericolosissimo. La forza esterna; il feto posto a traverso, o altra sua cattiva situazione, e gli sforzi contro le pareti dell' utero fatti da esso nel tempo de' dolori; il feto putrefatto; una malattia infiammatoria della gravida; le incongrue compressioni, o pigiature, e le offese prodotte da corpi, e ordinghi, ed altre cose cagionano questo male.

- I. L' infiammazione delle medesime parti della generazione esterne, l' ecchimosi, e l' infiammazione dell' ano, che nasce dalla lunghezza del parto, e alle volte dalle mani di una inesperta levatrice, le quali troppo affaticano queste parti.
- K. Le moroidi interne rese molto dolorose dallo scendere del feto.
- L. Le parti della generazione ancora escoriate pel continuo passo dell' orina, e che molto dolgono nel parto.
- M. I tumori edematosi delle labbra pudende, e questi nati dalla gravidanza, ovvero dall' idropisia, rendono difficile, e dolorosa l' esplorazione, e il parto parimente doloroso, e lento.

§. 244. Benchè queste e simili malattie sieno solite di ritardare il parto, e talora renderlo preternaturale, e possano porre la madre in pericolo, a cagione della cancrena, che può sopravvenire, e sieno accompagnate da violenti dolori; nondimeno se il feto, e l' utero sono ben situati, non sempre sono d' impedimento al parto, il quale dalla forza stessa de' dolori, o da un piccolo soccorso dell' arte, potrà avere un esito pronto e felice.

§. 245. Vano pure è il timore d' un parto difficile, qual sogliono sempre concepire, e fingersi le primajole, per non avere ancora le parti genitali convenientemente dilatate. Il primo parto in verità suol essere in tali donne più lento, più laborioso, e più doloroso degli altri; tuttavia vi sono molte, le quali nel primo parto facilmente si sgravano; nè sempre sono esenti da un parto difficile quelle, che più volte già partorirono, anzi neppure quelle, nelle quali, essendosi rotto il perineo nei parti antecedenti, si è fatto un passaggio molto ampio; e al contrario non soffrono sempre una difficoltà grande nel partorire quelle, nelle quali è stato riunito il perineo per mezzo di cucitura. Ogni volta che le parti molli non possono dilatarsi, sono rotte dalla forza de' do.

dolori, e dagli sforzi del capo, se non vi si oppone un conveniente ajuto.

§. 246. XI. *E' necessario che il feto sia sano, e vegeto.*

In quella medesima guisa, che per un parto felicissimo si richiede un'ottima vivacità del feto, nella stessa guisa felice non può dirsi quello, che si oppone, o non corrisponde alle nostre speranze. Se la vivacità del feto contribuisca alla sua uscita dall'utero, è ancora cosa indecisa. In verità lo stimolo prodotto dalla compressione dell'utero sopra il feto, e che l'obbliga a reagire, mostrerebbe che vi dovesse contribuire. Ma dimostrano il contrario i parti de' feti morti, e gli sgravj delle mole, e delle placente osservati tante volte facilissimi. Gli antichi ancora, conforme alla loro ipotesi, riposero l'unica speranza nella vita del feto, ma l'esperienza c'insegna diversamente. Il feto poi putrido, o disfatto per la lunga permanenza nell'umore dell'amnio, o più morvido del solito, compresso dalle contrazioni dell'utero meno preme ancora l'orifizio, meno lo distende, riceve minor forza dai dolori, e rende il parto più lento. La putredine ancora infettando la madre, porge occasione a pericolosi accidenti nel di lei puerperio.

§. 247. XII. *Il parto si compisca in poche ore.*

Se non manca veruno degli accennati requisiti, per lo più poche ore si contano dai primi dolori veri al termine del parto. Il parto che propriamente si dice facile, tanto in quelle che partoriscono per la prima volta, quanto nelle più avanzate in età, raro è che non resti ultimato dentro le sei ore. Ogni volta che il parto si prolunga più oltre, con ragione si può entrare in sospetto trovarsi qualche cosa di straordinario, che cagioni questa tardanza, o impedimento all'esclusione del feto.

§. 248. XIII. *La madre ed il fanciullo, compiuto il parto, non portino seco loro malattia alcuna originata dallo stesso parto.*

Se il parto fu felice, questa legge ne succede di sua natura, e parimente se nessuna malattia sopraggiunge alla madre o al feto, è grande indizio che il parto è succeduto felicemente.

§. 249. XIV. *Non si turbi il parto dalla levatrice.*

Sogliono le levatrici più del dovere viziare la buona natura del parto, coll'effortare a fare degli sforzi avanti il tempo, col tastare inutilmente, col distrarre, e col lacerare le parti, coll'effusione dell'umore dell'amnio per averne rotte le membrane, colle compressioni del basso ventre, con varj medicamenti, con cattive situazioni, col violento stacco della seconda, e con la subitanea tiratura delle membra del feto, che si presentano ec.

§. 250. Gli antichi per determinare il parto perfettissimo, non richiedevano tante cose. Chiamavano parto perfetto, e naturale, se il fanciullo si presentava col capo: preternaturale poi se compariva con altra parte del corpo: pessimo se il fanciullo si presentava coi piedi. Ma questa osservazione non è sempre costante. Imperciocchè non basta per un parto perfettissimo, che il capo del fanciullo esca il primo; ma è necessario ancora, che non manchino le altre condizioni state esposte; perchè spesso accade, che quantunque il capo del fanciullo sia il primo a comparire, non ostante il parto riesca molto difficile, anzi preternaturale; al contrario poi si debba alle volte giudicar naturale, anzi facile quantunque ogni altra parte del fanciullo fuori del capo si presenti la prima. Per esempio nel parto immaturo ordinariamente è meglio che si presentino prima le natiche, che il capo: imperciocchè quando il corpicciuolo del feto è minore, le natiche con maggior forza premono il segmento inferiore dell'utero, di quello che lo preme il capo. Questa osservazione è comprovata da frequenti esperienze. Alle volte ancora, benchè più di rado, uscendo il feto colle ginocchia, o co' piedi, si può
com-

comprimere più facilmente, di quello che uno s'immagina.

§. 251. Tanto ancora è lontano, che il parto agrippino debbasi sempre giudicare difficilissimo, e tormentoso, che piuttosto nella classe di quegli, che si effettuano con l'ajuto dell'arte, si deve annoverare fra gli ottimi; e tutti quelli che non possono effettuarsi senza il soccorso della mano, si devono ridurre, o mutare in questo.

§. 252. Non per questo tuttavolta egli è il più naturale, ed il più desiderabile, come il Sig. della MOTTE asserisce. Imperciocchè

A Più di rado l'orifizio dell'utero sufficientemente si apre dai dolori, mancando il peso per comprimere il segmento inferiore, se l'impulso dell'acqua non supplisce.

B Se il parto per i piedi non resta prontamente terminato, il feto è sottoposto a morire; imperciocchè il cordone ombelicale è premuto tra il capo il petto e la pelvi, quando il feto è uscito fino all'ombelico, e per tal compressione resta interrotto il circolo del sangue.

C Il capo si suole estrarre difficilmente. Quando si presenta il primo, compresso dai dolori divien bislungo, ed ha minor volume nei lati. Quando poi nasce l'ultimo, il fondo dell'utero premendo la sommità del medesimo, lo rende più largo.

C A P I T O L O XI.

DEL RISCOントRO.

§ 253. **L**A pratica principale dell'Arte ostetricia si aggira intorno al riscontro, di cui certamente il frequente esercizio non si può abbastanza lodare. Adunque è da maravigliarsi che la maggior parte degli Autori

ri, eccettuato il DEVENTERO, e i suoi seguaci, abbiano quasi omessa questa parte.

§. 254. Questa operazione, con la quale si va indagando la condizione dell'utero, e del feto, si chiama *riscontro*, latinamente *exploratio*, il quale certamente, giacchè esamina le parti interne del corpo, non si può fare se non per mezzo del tatto, e perciò chiamasi anche *tatto*.

§. 255. Pertanto con questo riscontro si determina se l'orifizio uterino sia di gravida, o nò: si determina la verginità, la violazione, la gravidanza, e il parto già seguito: si scuopre il termine della gravidanza: si esamina se la situazione dell'utero sia retta, o obliqua: si scuoprono le malattie locali dello stesso utero, quelle dell'orifizio, dell'interno della vagina, e delle parti della generazione esterne. Si esamina ancora la figura della pelvi, e dell'orifizio dell'utero, siccome la vicinanza del parto, la differenza de' dolori, se sono veri, o presagienti, o spurj: si determina la condizione delle membrane, se sieno intere o rotte, la parte del feto che si presenta, e la situazione dell'orifizio dell'utero, e perciò se il parto sia per esser facile, o difficile, o preternaturale. Si rilevano finalmente alcune cause della sterilità, le differenze delle perdite di sangue dall'utero, e si conosce se sia per seguire l'aborto, ed altre cose simili.

§. 256. Tutte queste cose poi per mezzo d'altri segni, o non si conoscono punto, o meno distintamente, perciò si fa manifesto l'uso grandissimo del riscontro; nè il prudente Professore, o l'accorta levatrice tenta mai cosa alcuna prima, che col previo riscontro habbia scoperto la condizione o lo stato dell'utero. Quindi se la gravida, o la partorienti fosse ritenuta da un intempestivo rossore, e recusasse il debito riscontro, gioverebbe piuttosto abbandonarla alla propria sorte, che tentare sopra di essa incerti ajuti.

§. 257. Questo riscontro si fa nella seguente maniera.

Si

- 1 Si riscaldi col fiato il dito indice, e si unga con grasso, olio, o butirro; alle volte vi si può unire il dito medio ancora, acciò in tal maniera l'indice si possa portare più in alto.
- 2 L'operatore applichi la mano che torna più comoda alle parti della generazione, coll'indice presentato al perineo, e diriga il pollice disteso verso l'osso del pube, e l'altre dita le ripieghi sulla palma della mano contrariamente.
- 3 Infinui l'indice nella vagina, prima al contorno del perineo, dipoi verso la parte posteriore della vagina dove sta unita coll'intestino retto, e si avanzi fino a tanto che il frapposto ostacolo non impedisca l'andare più avanti. Dolcemente però, e cautamente si dee procedere, acciocchè non si faccia alcuna violenza alle parti; e non si prenda la piega maggiore della vagina, per quella parte della medesima, che si attacca colla cervice dell'utero.
- 4 Che se la vagina è più lunga, come spesso accade, si prema in sù lentamente il perineo, finchè il dito non abbia toccata la sommità della stessa vagina.
- 5 Il dito arrivato fino alla sommità della vagina si giri per ogni banda, e si esami non tanto lo stato del segmento inferiore dell'utero, quanto ancora l'orifizio di esso pendente e fornito di una fessura trasversale. Si osservi soprattutto di non prendere il cerchio prominente, o la tuberosità della vagina, per l'orifizio dell'utero.

§. 258. Siccome la situazione della femmina può esser differente, così ancora differente esser dee la maniera del riscontro.

§. 259. Le femmine di condizione si riscontrano per lo più giacenti sul letto; laonde acciocchè il dito si possa mettere entro la vagina, è necessario,

- 1 Che la donna sollevi il ginocchio vicino all'operatore
in

in modo, che sotto di esso possa il medesimo portare la sua mano al perineo.

- 2 Con l'altra mano posta sotto ai lombi possa sollevare i medesimi.
- 3 La donna si appoggia obliquamente sul fianco opposto all'operatore, se pure non recusa di far ciò.
- 4 Allorchè poi con questo metodo non si possa toccare l'orifizio dell'utero, la femmina dee mettersi inginocchioni.

§. 260. Stando la donna inginocchioni sul suo letto, o ancora in piedi, col petto piegato per l'avanti, e colle natiche alzate in dietro, molto bene si tocca l'orifizio dell'utero; benchè sia altissimo, purchè il dito s'introduca nella vagina dalla parte posteriore del corpo. Imperciocchè in questa maniera si presenta comodamente al dito l'orifizio dell'utero. Questo metodo poi di riscontrare non può aver luogo, se alla donna gravida non è permesso di piegare il corpo verso la parte anteriore a cagione del basso ventre troppo pendente.

§. 261. Alcune donne non permettono di essere riscontrate, se non sedendo sopra una sedia. Acciocchè poi si possa far questo, la donna si ponga a sedere sull'orlo della sedia, talmente che sia libero l'ingresso nella vagina, e per lo stesso fine pieghi ancora il dorso. La maniera poi di riscontrarla è la medesima di quella, che è stata descritta al §. 259.

§. 262. Quelle poi che sono di più bassa condizione, si sogliono riscontrare stando in piedi. Per la qual cosa:

- A L'operatore siede un poco più basso, o stà inginocchioni.
- B La donna da riscontrarsi stà in piedi in faccia dello stesso, colle gambe allargate quanto può.
- C L'operatore pone una mano al perineo.
- D Piega l'altra intorno ai lombi della donna, e li preme o forza per l'avanti.

- E La donna o da se stessa sostiene il dorso piegato in dietro, o l'appoggia a qualcuno che vi si trovi in ajuto.
- F Del rimanente il riscontro si fa nel modo descritto al §. 257.

CAPITOLO XII.

DI QUELLE COSE, CHE SI DEBBONO PRATICARE NEL PARTO.

§. 263. **I**L parto naturale in verità spontaneamente e facilmente, mediante le sole forze di natura, e senza ajuto veruno dell'arte, si effettua; la qual cosa più che a sufficienza vien dimostrata dall'esempio delle meretrici, dalle donne indiane, dalle contadine, e da quelle che seguono le armate. Non si dee però giudicare superflua l'opera della levatrice, imperocchè in ogni parto si dee aver riguardo alla pulizia, si dee procurare una comoda situazione alla partoriente, si dee legare il tralcio, e raccogliere il bambino. Di rado ancora succede il parto tanto facile, che non abbia bisogno di essere ajutato dalla mano addestrata della levatrice. Non si è neppure mai sicuri quali stravaganti accidenti sieno per sopraggiungere.

§. 264. Quando si fanno sentire i primi dolori veri del parto, la partoriente provvegga a se stessa, come nel cimento e tempo di una vera malattia. Perciò da simil momento

- A Si allenti ogni legatura dei vestiti,
- B Si astenga dai cibi duri, tanto a pranzo, che a cena: imperciocchè malamente si fa la digestione, quando i muscoli, e specialmente quelli del basso ventre sono affaticati, e il sangue agitato: facilmente in tal caso vien provocato il vomito, e si genera, o si alimenta il fomite di una vera febbre.

- C La partoriente inoltre beva a suo piacimento , ma bevande acquose , e queste sieno brodi puri , o infusioni teiformi , come ancora acqua bollita semplicemente senza veruna addizione , o cotta con erbe pettorali , ovvero acqua cruda semplice , o non cotta ancora . Non nego però doverfi concedere qualche cosa alla consuetudine personale , o del paese , ed al genere particolare di vita .
- D Alle deboli si può anche somministrare qualche medicamento ristorativo , e che sia loro gustoso .

§. 265. La partoriente si dee ancora purgare con qualche clistere , acciocchè purgata dagli escrementi se ne ottenga la pulizia . Imperciocchè il capo del feto spinto dai dolori dentro la pelvi comprime l' intestino retto , e spinge avanti a se gli escrementi , i quali escendo continuamente nel tempo del parto , imbrattano la mano della levatrice , o il letto .

§. 266. Nelle gravide ancora l' appetito frequentemente suol' essere depravato ; cosicchè spesso appetiscono varj cibi difficili a digerirsi , e dai quali si generano de' fortiori , crudezze , e flati . Anzi il ventricolo , e gl' intestini sono fortemente compressi dall' utero dilatato . Tosto che poi il capo è entrato nella pelvi , questi flati , e crudezze non si possono più espellere . Per la qual cosa al comparire dei dolori del parto , ed essendo compresso il basso ventre , e il sangue messo in moto , la zavorra intestinale resta commossa , le intestina sono irritate , e si contraggono straordinariamente , la partoriente è miseramente tormentata dai dolori del basso ventre , ed è impedita la libera contrazione dei muscoli di esso , e del diaframma . Questi mali sono allontanati da un clistere emolliente e carminativo , dato preventivamente .

§. 267. Molte donne gravide sono travagliate da stitichezza , ed in esse gli escrementi si prosciugano , e si condensano a segno , che rassembrano pietre , che ri-

tar.

tardano il capo del fanciullo; e finalmente dall' impulso de' dolori venendo spinti più avanti, sono mandati fuori non senza gravi dolori, e offesa dell' ano. Un clistere pertanto emolliente dato a tempo avanti il parto; anzi ripetuto, allontanando il mentovato impedimento può rendere il parto più spedito, e più tollerabile.

§. 268. I clisterj certamente dati per tempo, hanno la menzionata utilità; dati poi più tardi, quando cioè il capo riempiendo la pelvi comprime l' intestino retto, non sono di vantaggio veruno. Falsamente si dice, che risvegliano i dolori veri, i quali nascono dalla sola azione accresciuta del fondo dell' utero. Male a proposito adunque, quando mancano questi dolori, si danno i clisterj molto acri, e stimolanti, i quali niente altro fanno, che defatigare, ed offendere la partoriente.

§. 269. E' necessario ancora che la partoriente avanti il parto si sgravi dell' orine, acciocchè il capo, allorchè dentro la pelvi preme il collo della vescica, non impedisca lo sgravio di esse. Che se la partoriente fosse già travagliata da ritenzione di orina, coll' ajuto della sciringa, o con leggiera pressione fatta sul pube si dee procurare l' espulsione della medesima. La pienezza della vescica ritarda anch' essa il parto.

§. 270. Le pletoriche hanno il polso pieno, e alto, e sono rosse in faccia: a queste è necessario che avanti il parto si levino alcune once di sangue, benchè godano perfetta salute, e il parto sia per riuscire facilissimo. Imperciocchè così gli sforzi, e le fatiche del partorire si rendono più vigorose, e meno afflittive, ed anche allontanano certe peggiori conseguenze non insolite nel puerperio.

§. 271. Soprattutto non trascurino questa emissione di sangue quelle, che hanno il respiro difficile, e ne-

precedenti puerperj hanno sofferto degli incomodi per aver trascurata tale precauzione.

§. 272. Non è raro che quelle, le quali partoriscono per la prima volta, e sono di fibre facilmente irritabili, e piene di sangue, sieno assalite da convulsioni, anche in un parto d'altronde ottimo, le quali sicuramente si allontanano, e si sciolgono, mediante la missione del sangue. I segni delle convulsioni da temersi sono: i dolori, che eccedentemente tormentano la donna, il polso celere, la faccia enfiata, e rossa, l'albuginea degli occhi infiammata, la forte collisione dei denti, i sussulti de' tendini nelle mani, l'aspetto truce, il rumore nelle orecchie ec.

§. 273. Fatte tali cose, la levatrice pensi a preparare una sufficiente quantità di panni lini asciutti, e riscaldati, e le cose necessarie per legare e tagliare il tralcio, a temperare il calore della camera, a rimuovere gli astanti inutili, e non graditi dalla partoriente, e pensi alla comoda situazione della medesima. Non sarà neppure mal fatto se troverassi approntato qualche liquore confortativo, e gli strumenti i più necessarij, per altro celati o coperti, acciocchè il Professore subito se ne possa servire nei casi scabrosi.

§. 274. Sul principio la partoriente non si costringa a veruna determinata situazione, ma a quella di suo piacimento, passeggi, stia a giacere, o segga, finchè l'orifizio dell' utero non sia aperto più della metà del diametro della pelvi. Se troppo presto si fa giacere sul letto, o stare sulla sedia, diviene impaziente, e si stanca. Anzi frequentissimamente si osserva, che in molte partorienti i dolori sono più efficaci se esse stanno in piedi, di quello sieno se giacciono, o seggono. Succederebb' egli mai ciò a cagione del peso più grave del feto, che preme il segmento inferiore dell' utero? Le asmatiche ancora, le gobbe, le curve, e tutte quelle, che hanno il respiro difficile, se.

sedendo, o giacendo, non fanno sforzi tanto efficaci, quanto stando in piedi. Le circostanze determineranno il tempo. Frattanto frequentemente si dee riscontrare l'orifizio dell'utero, e prima che il feto entri nella cavità della pelvi, la partoriente si dee porre in una situazione comoda; acciocchè assalendola più fortemente i dolori, il feto non sia all'improvviso cacciato fuori con grande incomodo della madre, e con pericolo del feto medesimo.

§. 275. Quella situazione poi si dee credere la più conveniente al parto, nella quale la partoriente può fare i maggiori sforzi; e perchè si possa questa determinare, è necessario che resti spiegata tale azione.

§. 276. Questa è di tre sorte.

I. Si contraggono i muscoli del basso ventre.

II. Si contrae il diaframma.

III. Si ritiene il fiato, dopo averlo grandemente tirato a sé.

§. 277. Acciocchè viemeglio i muscoli del basso ventre, e il diaframma si possano contrarre con gran vigore, e deprimere le viscere del basso ventre, si debbono conservare ferme ed immobili le ossa alle quali sono attaccati tali muscoli. Queste ossa sono.

A La pelvi.

B Le vertebre de' lombi.

C Il torace.

§. 278. Per tenere ferma la pelvi, si debbono appoggiare l'estremità inferiori ad un corpo resistente: onde al sopravvenire de' dolori, la partoriente se si trova ritta possa pigiare fortemente i piedi in terra. In questa maniera contraendosi i muscoli di essi, e delle cosce, questi rimangono a contrasto colla pelvi, e colle ginocchia. Inoltre l'azione de' muscoli viene ajutata, se le ginocchia, che sono mobili, si tengono dalla levatrice in modo, che resa ferma l'articolazione, i muscoli delle cosce, e delle gambe vi abbiano tutta la loro stabilità, ed azione. Così
fer-

fermati i piedi, le cosce, i lombi, e la pelvi, i muscoli del basso ventre rimangono fissi alla pelvi, e ai lombi, ove hanno la loro origine.

§. 279. Si rende immobile il torace, parte dai muscoli del basso ventre resi fermi, parte dall'essere parimente resa ferma l'alta regione dello stesso, la quale sta unita all'estremità superiori. Pertanto la partoriente prenda, e tenga fortemente colle mani qualche cosa, e così con i muscoli contratti l'estremità superiori divengono incorrentite, e s'incorrentiscono ancora i muscoli pettorali, il latissimo del dorso, i muscoli delle scapule, e delle clavicole, ed in tal maniera viene a rendersi fissa, ed immobile la parte superiore del torace.

§. 280. Finalmente si debbono fissare ancora le vertebre, i muscoli delle quali parte sono uniti ad esse, parte al torace, parte alla pelvi. Onde fermata la pelvi, e il torace, e contratti in parte i proprj loro muscoli, si fissano le vertebre. Acciocchè poi non si pieghino indietro, e non si produchino fieri dolori nella partorientente, i lombi si appoggino ad un corpo immobile.

Dalle cose dette è chiaro, che la maggior parte dei muscoli del corpo per lo più si contraggono per i dolori, e per gli sforzi della partorientente.

§. 281. Acciocchè meglio adunque si facciano gli sforzi necessarj dalla donna, quando trovasi in piedi,

- A La partorientente stia ferma, puntando i piedi sul pavimento.
- B Colle mani prenda qualche corpo resistente.
- C Coi lombi stia appoggiata parimente a qualche cosa che le resista.
- D Le ginocchia della medesima prese fortemente dalla levatrice sieno premute, e impedita a venire in avanti.

§. 282. Posta in questa situazione la partorientente può benissimo sforzarsi, osservando le cautele descritte; non può però stare sempre nella medesima situazione, a ca-
gio-

gione di molti incomodi, perchè la levatrice opera scomodamente, e perchè è facile la caduta del feto in terra con pericolo di esso, e della madre; perciò può stare sulla sedia, o sul letto. Alcune condizioni determinano se debbasi preferire il letto alla sedia, o questa a quello.

§. 283. Le condizioni poi sono queste.

- A E' necessario per potersi gagliardamente sforzare, che i piedi, le mani, e i lombi si appoggino fortemente a qualche corpo resistente.
- B Che dalla situazione non si produca impedimento alcuno al feto, che deve uscire.
- C Che nell'intervallo dei dolori la partoriente stia quieta, e ferma a suo agio, acciò riprenda forza.
- D Che le parti genitali sieno del tutto coperte.
- E Che si provvegga alla pulizia.
- F Che la situazione, se le circostanze lo permettono, si possa facilmente mutare in quella, che sia per richiedere il parto artificiale.
- G Che seguito il parto la partoriente possa ancora un poco stare in quiete, e agiata, prima di essere portata nel letto del puerperio.
- H Che la levatrice possa fare comodamente il suo ufizio.

§. 284. Pertanto il letto che si determina per il parto, dee prepararsi nella seguente maniera.

- 1 La sponda abbia la consueta lunghezza, la larghezza poi non sia più grande di quella che richiede il comodo di una sola persona: affinchè gli assistenti possano meglio da ambedue le parti eseguire quanto è necessario.
- 2 La sponda sia nel mezzo congegnata con ferri in modo, che si possa piegare: e i suoi piedi talmente si fermino con de' chiodi fatti a vite, che il letto si possa disfare, e il tutto si possa con somma facilità trasferire da un luogo all'altro.
- 3 Tanto da capo, quanto da piè del letto, si debbono fer-

fermare alcune mediocri e rilevate afficelle, in modo però che l' asse posta dai piedi sia scavata nella sua parte superiore, quella poi che torna da capo sia intiera.

4 Vi si metta sopra una materassa ripiena di lana, o di crini.

5 A piè del letto sopra questa materassa, sia collocato un guanciaie pieno di paglia, che sia duro e resistente.

6 Sopra questo si ponga un altro guanciaie ripieno di lana, o di crino.

7 Questo sia coperto di una pelle, o di un panno incerato.

8 Questa pelle sia ricoperta da un lenzuolo grande messo a quattro doppj; il tutto poi si cuopra con un lenzuolo.

9 Si ponga dalla parte superiore del guanciaie num. 5. un' asse scavata nella parte inferiore, acciocchè i guanciali num. 4. e 6. si possano tirare in su, o in giù secondo il bisogno.

10 Alle parti laterali del letto vi si pongano due braccioli movibili i quali si possano secondo il bisogno avanzare, o ritirare indietro,

11 Vi si aggiungano ancora dei guanciali più piccoli, da servire per sostegno del capo, la coperta, ed il lenzuolo di sopra, acciocchè niente manchi alla comodità.

§. 285. Il letto formato e accomodato in tal maniera

I. E' comodissimo per fare gli sforzi i più grandi. Imperciocchè

A I piedi della partoriente possono puntare da ambedue le parti dell' asse scavata (§. prec. num. 3.) le ginocchia poi sollevate possono essere tenute da qualcheduno degli astanti ferme (§. 278.) o sìvvero la partoriente, lo che è più comodo, pone i piedi in grembo alla levatrice, la quale le siede in faccia, e tiene ferme le di lei ginocchia.

B I braccioli del letto (§. prec. num. 10.) abbrancati
for-

fortemente colle mani sono di grandissimo ajuto per tener fermo il torace (§. 279.).

C I lombi si appoggino al guanciale più duro (§. prec. num. 5.) e quando questo non basti, allora con uno sciugatojo posto sotto ai lombi e sostenuto da due persone, questi verranno a trovare la dovuta resistenza, e si renderanno immobili (§. 280.).

§. 286. II. *Questo non cagiona alcuno impedimento al feto, che è per uscire.*

A Imperciocchè la situazione non impedisce l'ingresso nell'apertura superiore della pelvi, o la partoriente stia a giacere, o segga. L'utero sostenuto dalle vertebre, e dai frapposti intestini, depresso è dai dolori nella pelvi.

B Da alcuni in vero si crede, che il giacere impedisca l'uscita dall'apertura inferiore della pelvi, e perciò da molti si preferisce la sedia al letto. Imperciocchè essi dicono che la partoriente giacente in letto, riposa sull'osso del coccige, per la qual cosa questo non possa cedere ma faccia impedimento al feto, che deve uscire.

§. 287. Se ciò fosse vero, si dovrebbe assolutamente preferire la sedia al letto; ma l'addotta ragione non ha forza alcuna, come c' insegna l'esperienza. Imperciocchè,

1 Questa c' insegna che la partoriente giacendo in letto, non vien fatta remora alcuna al feto, che deve venir fuori.

2 Avanti che il feto scenda nell'apertura inferiore della pelvi, non è necessario prendersi pensiero di essa apertura, ma si dee pensare più tosto alla comoda situazione, ed a promuovere i dolori. Anzi una piccola resistenza al perineo assicura dal parto precipitoso, dalla rottura del perineo (§. 241.) e dal facile prolusso dell'intestino retto, che può cagionarsi dal capo spinto verso l'asse della pelvi.

3 Sul fine del parto, quando è per uscire il fanciullo, N facil-

facilmente gli si può procurare uno spazio di un pollice di vantaggio, oltre del quale non cede l'osso del coccige (§. 30. lett. B) cioè con comprimere il guanciale (§. 284. num. 6.) nel luogo corrispondente al coccige, col sollevare il lenzuolo che si è messo a quattro doppi (lett. C num. 8.) e con voltare il corpo della partoriente verso la sponda del letto.

§. 288. III. *Nell'intervallo dei dolori, la partoriente stia nel letticciuolo ferma e quieta*: anzi se i dolori dessero grandi intervalli può anche dormire. Imperciocchè essendo la traversa posta a piè del letto scavata (§. 284. num. 3.) può posare con i piedi in grembo della levatrice.

IV. Per mezzo delle coperte, che sono nel letto, *si cuoprono le parti genitali*, s'impedisce il libero accesso all'aria, e si risparmia la vergogna alla partoriente.

V. *Si può conservare la pulizia* con un corredo pronto di panni; e con una catinella, o un grande orinale, tenuto a canto al letto, si può ricevere l'umore che versa dall'amnio.

VI. *La situazione che richiede il parto preternaturale meglio si può ottenere nel letticciuolo, che nella sedia*, e di ciò se ne parlerà a lungo più sotto.

VII. Levato il dorsale (§. 284. num. 9.) *la partoriente terminato il parto* può servirsi di questo letticciuolo, nel quale *riposa*, per tanto tempo, finchè abbia ripreso le forze a poco a poco, e il flusso copioso del sangue sia cessato. Il letticciuolo poi per mezzo delle rotelle si trasporta accanto al letto destinato, e preparato per il puerperio, ed essa allora si pone sopra questo.

VIII. *La levatrice può fare il suo ufizio con maggior libertà*, e comodamente, e stare in piedi, o a sedere, avanti la partoriente, lontana dallo sporcarsi, particolarmente se tenga davanti un grembiule.

§. 289. *Si dee usare questo letto descritto ogni volta che*

che vi sia la comodità di poterlo usare , e quando la donna nel parto naturale , per qualche pregiudizio , non voglia preferire ad esso la sedia . Mancando poi questo , e la sedia , ci dobbiamo adattare al letto , e alle circostanze , e formare un letticciuolo estemporaneo .

§. 290. VAN HOORN descrive un letto della seguente specie .

1 Sceglie quattro sedie di eguale altezza , e le pone una in faccia all'altra accanto al muro , o altro simile appoggio .

2 Sopra di queste pone un guancialone duro , e ben pieno : che se farà morbido , lo ripiega per d'avanti .

3 Cuopre questo con un lenzuolo fino in terra , e lo ferma con delle cuciture .

4 Pone sotto al capo alcuni guanciali , che si debbono appoggiare alla parete .

5 Pone poi sotto ai lombi uno sciugatojo , da alzarli dai circostanti nel tempo dei dolori .

§. 291. Acciocchè questa macchina sia di ajuto alla partorientente , è necessario che nel tempo dei dolori si trovino presenti varie persone , alcune delle quali tengano le mani , e altre i piedi della partorientente . In questa però si trova d'incomodo il volervi più persone assistenti , le quali non poco ancora restano incomodate , e impedita nell'operare dalle spalliere di esse sedie . Pertanto si prendano , se pure sieno in pronto , altrettante seggiole senza spalliera .

§. 292. Dal medesimo si descrive ancora un'altra macchina quasi simile all'antecedente , se non che invece di quattro seggiole si serve di tre , la più grande delle quali sia fornita di braccioli , e spalliera , appoggiata al muro , l'altre due poi legate con una fune e unite in modo , che fra di esse resti uno spazio convenevole all'operazione da farsi nel parto preternaturale : ha questa il vantaggio , che la partorientente può far forza su i braccioli della seggiola .

S. 293. Altri ancora si servono di letti da non dispregiarli del tutto, i quali volendoli usare, si costruiscono nella seguente maniera.

A Sotto la materassa del letto si ponga un guanciaie duro, o un' asse, acciocchè ai lombi faccia appoggio un corpo resistente.

B La stessa parte superiore della materassa si ripieghi in maniera, che il capo della donna giacente sia più alto.

C La parte superiore del letto si accosti al muro, e tra l'asse superiore del letto e la materassa, si ponga una *reggi-spalle*, detto dai Francesi *tabouret*, ovvero una seggiola ordinaria posta a rovescio. In questa guisa la materassa già ripiegata si assicura, ed il dorso vien sostenuto.

D La materassa si cuopra con un lenzuolo piegato a quattro doppj, e poi con un altro che arrivi fino a terra.

E Finalmente un altro lenzuolo, e una coperta cuoprano bene il tutto; e vi sieno ancora pronti alcuni guanciali da porsi sotto al capo in caso di bisogno.

F Si ponga sotto ai lombi uno sciugatojo, da alzarsi nel tempo dei dolori.

G Alla parte inferiore del letto si fermino due altri sciugatoj, i quali la partoriente prenda colle mani.

S. 294. Questa situazione ha il medesimo incomodo del letto estemporaneo, cioè a dire che i piedi non si possono tener fermi se non dai circostanti. Nondimeno è migliore, poichè la partoriente può prendere gli sciugatoj, e finito il parto riposare nel letto, e i circostanti, come ancora la levatrice, possono comodamente fare il loro ufizio.

S. 295. I letti poi più larghi, come si usano frequentemente in Francia, hanno molti e gravissimi incomodi. Imperciocchè

A La partoriente non può appoggiarsi agli astanti, e perciò fa sforzi meno vigorosi.

Con

B Con difficoltà ancora si può la medesima soccorrere, a cagione della grandezza del letto: e specialmente non si può alzare lo sciugatojo posto sotto ai lombi.

C Acciocchè i lombi sieno forretti da qualche ostacolo, è necessario porre sotto la parte superiore della materassa un guanciaie ben ripieno e duro, il quale finito il parto non si può levare senza incomodo.

D I lenzuoli ancora per ragione del parto insudiciati difficilmente si possono mutare, ed è molto incomoda cosa il dover lasciare stare i già imbrattati.

§. 296. Agl' Inglese perlopiù piace la situazione laterale, o nel letto comune, o in uno chiamato *couch*, fabbricato ad arte per quest' uso (§. 284.) o in uno quasi simile a quello descritto al §. 293. e corredato di una pelle, o panno incerato, e con un gran lenzuolo piegato a quattro doppi. Il letto è largo tre piedi, e la donna per l' ordinario posa sopra il lato sinistro, o ancora sul destro, talmente che il capo e il torace sieno piegati verso il basso ventre, e verso il medesimo sieno sollevate le ginocchia, e le natiche sieno dirette alla sponda del letto, con una situazione del corpo obliqua. Con un guanciaie, o altro corpo, posto fra le ginocchia, si tengono allargate le cosce, e la donna si tiene coperta come nell' altre situazioni, e la levatrice ancora situata come nell' altra maniera.

§. 297. Per vero dire tutte queste precauzioni prese impediscono che l' osso del coccige sia premuto per l' avanti, che la donna senta i discorsi degli assistenti, e non soffra freddo. Nondimeno preferirei la situazione descritta nel letto artificiale, perchè oltre questi stessi vantaggi la donna si stanca meno, ed avendo il dorso, i piedi, e le braccia appoggiate, fa sforzi più gagliardi, e da questi ancora è meno disastata.

§. 298. Nella Germania in vero le donne per lo più sogliono partorire sedendo sopra una sedia, fatta però il più

più delle volte così male, che cagiona loro grandissimo incomodo .

§. 299. La migliore struttura di tutte le seggiole è quella, che ci descrive il DEVENTERO V. *Fig. 1.* Tav. XIII. purchè non vi manchino i seguenti requisiti.

- A Sia fatta di legno.
- B Sia stabile, e facile a moverfi.
- C La parte principale di essa sia un guanciaie, o cuscino forato, sopra il quale la donna sieda, mobile in sù, e in giù.
- D Deve essere ancora mobile la parte superiore del di dietro, ma immobile la parte inferiore, sopra la quale si sostiene tutta la sedia.
- E Sieno parimente mobili i lati.
- F Si cuopra il tutto con guanciali.
- G Per sostegno si pongano due spallette coperte di guanciali, su i quali appoggiando la donna il capo riposi.
- H Nella parte inferiore de' lati si fermi un ferro per ciascun lato, che si possa muovere avanti e indietro, e talmente lavorato, che i piedi possano far forza e puntare sul medesimo.
- I In una maniera simile si mettano nella parte di sopra due braccioli mobili.

§. 300. L'altre specie tutte di seggiole sono meno comode. Di alcune di queste fanno menzione IPPOCRATE, e MOSCHIONE.

- 1 Fra quelle di cui ne abbiamo la descrizione, la più antica è quella di EUCHARIO RHODIONE, la quale consiste in uno sgabello che posa su quattro piedi, la di cui spalliera è immobile; l'asse sopra la quale siede la partorienti è forata, ma è mancante de' sostegni per appoggiarvi comodamente le mani, e i piedi.

- 2 Quella di RUEFFIO non è migliore di questa, se non che a basso è circondata da un panno, per impedire il libero accesso dell'aria, e per provvedere alla verecondia.

Nell'

3 Nell' altre manca del tutto la spalliera , e in luogo di essa il servente colle mani tiene fermi gli omeri della partoriente , e col ginocchio talmente preme i lombi , che la partoriente ha un ostacolo sopra cui potersi appoggiare . Le parti laterali, e la posteriore , inferiormente sono fermate con alcune assicelle ; per il medesimo precedente scopo, vi sono ancora dei bastoni da prendersi dalla partoriente colle mani .

4 Più utile è la sedia WELLESCHIANA, la di cui spalliera è mobile, ed è fornita di sostegni per riposarvi il capo .

5 VOELTERS , e WIDENMANNIN vi aggiunsero un sostegno per i piedi .

6 La sedia SIEGMUNDANA ha molti vantaggi per facilitare gli sforzi della partoriente , e può subito mutarsi in un letto per riposo della medesima, ma è meno comoda per la levatrice .

§. 301. Frattanto tutte queste specie di sedie hanno più incomodi che il letto, perchè

A In esse la partoriente non può stare comodamente, quieta nell' intervallo dei dolori, nè unire le gambe come nel piccol letto .

B I muscoli del basso ventre sono maggiormente premuti dall' utero dilatato , e per questo si contraggono con minor forza .

C Niente sostiene il perineo, e l' ano, con pericolo di rilassamento , di rottura, e di moroidi cieche (§. 287.) .

D L' accesso libero dell' aria che si prova nella sedia, resta di nocumento .

E Nel parto preternaturale , e nell' estrazione della seconda, l' operatore agisce meno comodamente nella sedia , che anzi in alcuni casi non può assolutamente operare . Neppure la donna travagliata dalle convulsioni, o da emorragia, può stare comodamente sulla sedia . Come ancora non è utile la sedia nel caso di rilassamento dell' utero , o della vagina .

Si

F Si aggiugne , che terminato il parto , la puerpera dalla sedia si dee subito trasportare nel letto .

G Se poi mancasse la spalliera , o questa fosse immobile , se mancassero pure i sostegni de' piedi , delle mani , e del capo , se la sedia fosse troppo bassa , e non a sufficienza scavata , gl' incomodi farebbero tanto più grandi .

§. 302. Da tutto ciò si comprende , che il più comodo è il letto artificiale . Le altre situazioni non si debbono porre in uso se non di rado , e in caso di necessità urgente : e acciocchè , sedendo la donna nella sedia , non nascano gl' incomodi (§. prec. lett. C) ad ogni dolore la levatrice dee con un lenzuolo a quattro doppi , premere il perineo insieme colle parti vicine alla pelvi , e così diminuire lo sforzo fatto in quelle .

§. 303. Le sedie da riposo sono preferibili alle sedie ordinarie ; esse hanno veramente una spalliera mobile , e le mani vi possono trovare un pronto appoggio : non di meno hanno questo incomodo , che la partoriente non vi trova da appoggiare i piedi , e resta con le reni troppo basse , e male adagiata , o assicurata , quando non sia tutto ripieno e ricalzato per mezzo di guanciali il vuoto che resta tra essa spalliera , e il di lei dorso .

§. 304. Nè pure si approva quella situazione , nella quale la partoriente siede sulle ginocchia di un' altra persona . Imperciocchè mancano le resistenze , la levatrice meno comodamente opera , nell' atto che raccoglie il parto s' imbratta , e in un parto che indugi , tanto essa che chi assiste viene a stancarsi , e il petto ancora della partoriente rimane compresso . Quando poi la partoriente è debole , questa situazione si dee preferire alla sedia .

§. 305. La partoriente finchè il feto non sia venuto fuori non stia in piedi (§. 282.) o inginocchiata , se non quando l' utero sia voltato verso l' osso sacro .

§. 306.

§. 306. Del rimanente la levatrice dee aver cura che la partoriente sia accomodata nella debita maniera, deve sedere avanti le ginocchia di essa, e di tanto in tanto riscontrare lo stato dell' orifizio dell' utero, e l' avanzamento del parto.

§. 307. Questo riscontro è necessario; primieramente avanti che sopraggiunga il dolore del parto, acciocchè essendo rilassate le membrane, conosca la situazione del feto, e la parte che di esso si presenta, e la situazione dell' orifizio; in secondo luogo nell' atto stesso del dolore, acciocchè determinando di che qualità sia, o stimoli, o dissuada la partoriente a fare degli sforzi: finalmente dopo il dolore, affinchè conosca quanto la doglia abbia fatto avanzare il parto. Si guardi però che riscontrando le membrane, con fare sopra di esse qualche violenza, non venga a romperle, o con le dita poco pratiche di non lacerare, o almeno offendere l' utero stesso intorno al suo orifizio.

§. 308. Tosto che insorgono le doglie vere, il parto viene infinitamente avanzato dagli sforzi voluntarij. Laonde al primo accesso del dolore la partoriente dopo una forte inspirazione trattenga il fiato, ed acciocchè possa far meglio questo, e la laringe non si spinga troppo in fuori, abbassi il mento fortemente sulla gola, contragga il basso ventre, e il diaframma il più che può, con uno sforzo affatto simile a quello con cui si mandano fuori gli escrementi più duri. Per tanto tempo continovi a far questo, finchè non cessa la contrazione dell' utero. Si guardi però di non far questi tali sforzi nel tempo dei dolori spurj.

§. 309. Con questo ajuto de' dolori si promove il parto, e l' umore dell' amnio racchiuso nelle membrane si spinge avanti, e finalmente l' istesse membrane si rompono, le quali a motivo di accelerare il parto, spesso, e con infelice successo (§. 186.) sono lacerate appostata-

mente colle dita dagl'ignoranti . Quando poi il capo , o tutto il sacco sia molto avanzato in fuori , allora è che si deve fare escire l'umore , acciocchè tolto questo ostacolo l'utero si contragga con maggior forza , e il fanciullo possa respirare . Per il parto preternaturale poi militano altre ragioni .

§. 310. Nel parto facile , l'operatore niente faccia per fare avanzare il feto , prima che il capo del medesimo non sia calato a segno , che l'occipite rimanga dietro al seno , e uno , o due dolori siano sufficienti per spingerlo intieramente fuori . Tutto ciò che si fa per dilatare la bocca dell'utero è superfluo , anzi talvolta nocivo . Allora si richiede una doppia opera per parte dell'operatore ; la quale consiste in difendere , e conservare le parti genitali esterne , e in ajutare l'uscita del feto .

§. 311. Giacchè il feto segue l'asse della pelvi , tende verso l'ano . Mentre poi scende per la vagina , reprime successivamente la di lei parete posteriore , l'intestino retto , l'ano , e il perineo verso l'osso sacro (§. 187.) il qual rispingimento , siccome il dilatamento dell'orifizio della vagina , dall'operatore si aiuta nelle seguenti maniere .

- A** Può ungere spesso la vagina , e i suoi labbri con qualche cosa untuosa , come con burro , o con olio di mandorle dolci , secondochè ordinariamente si costuma , e forse ancora per rilassare un poco più le fibre .
- B** All'uno , ed all'altro lato dell'orifizio della vagina vicino al perineo porrà il dito indice , e medio di ambedue le mani .
- C** Alla comparsa di ciascun dolore con queste dita comprimerà il perineo verso l'osso sacro , e lo condurrà sotto il capo ; in questa maniera si aprirà talmente l'adito al capo , che senza impedimento , e senza danno del perineo escirà fuori .

§. 312. Di poi .

A. To-

- A Tosto che il capo è uscito tanto che si possa prendere, si porrà l'una, e l'altra mano intorno ad esso capo, in maniera che i pollici si corrispondano, o si tocchino. Allora il feto alla prima doglia che sopraggiunge, con diligenza insieme e destrezza si tirerà fuori.
- B Quando tutto il capo sarà fuori delle parti pudende, le due dita minime prenderanno il mento, acciocchè si possa tirare con maggior forza. Il feto non si tirerà direttamente, ma con smuoverlo da una parte all'altra, poichè in questa maniera meglio escono gli omeri.
- C Al comparire degli omeri, il dito indice si metterà sotto l'ascella, e così si ajuterà la loro sortita. Nell'estrarre il feto si abbia in mira ancora l'asse della pelvi, imperciocchè a cagione della resistenza della parete posteriore della vagina, e del perineo, il capo e gli omeri sono diretti verso il pube (§. 187.) e possono rimanere incagliati all'arco degli ossi del medesimo pube; la qual cosa si scansa se il capo si deprime un poco verso il perineo.

§. 313. Escluso il feto, ne viene subito la placenta; onde senza indugio si deve legare il tralcio. Prima però di far questo, si ponga un dito in bocca di esso feto e gli si tolga quella mucosità che vi si trova, acciò possa liberamente respirare. Lo stesso fanciullo si tenga in situazione, che colla faccia riguardi l'operatore, e resti esente dal sangue che sgorga dalle parti genitali. Se sia vivo e vegeto, ne dà segno con vigoroso pianto; il debole poi, il quale ha molto sofferto nel parto, o è stato compreso nel collo dal tralcio, stà quieto, e poco differisce da un morto.

§. 314. Il cordone ombelicale si lega nella seguente maniera.

- I Perchè il feto non soffra nocimento dal flusso del sangue, si fa la legatura del cordone distante almeno quattro dita trasverse dall'ombelico, talchè nello spazio di mezzo se ne possa fare un'altra, se a caso non bastasse la prima.

- 2 Primieramente si ferma dalla parte di sopra con un nodo chirurgico, dalla parte di sotto poi con un nodo comune; finalmente il nodo comune solo può servire per questa legatura.
- 3 Per tal legatura si prende un filo resistente, e difficile a rompersi, non però troppo grosso, onde un cordoncino composto di tre fila sottili ed incerato è ottimo.
- 4 Il filo sia lungo un piede in circa, ed abbia ad ambe l'estremità un nodo.
- 5 La legatura non si stringa troppo, acciocchè il tralcio non si rompa, nè sia troppo lenta, acciocchè il sangue non esca.
- 6 La legatura del tralcio quando è grosso si stringa più forte, acciocchè seccato il tralcio essa non caschi.
- 7 Ad un tralcio sanguigno, quale ordinariamente fuol'essere quello del parto immaturo, si formi il cordoncino di fila più morbide, un poco più largo, e leggermente incerato, e la legatura si stringa meno, acciocchè non si rompa il tralcio.
- 8 Per evitare ogni pericolo, al di sopra della prima legatura se ne faccia un'altra più lenta da stringersi subito, in caso che la prima reciso il tralcio cada.

§ 315. Certamente.

- 1 Il tralcio legato si tagli vicino alla legatura (S. prec. num. 1.) con forbice a punta ottusa, acciocchè le membra del fanciullo, che può muoversi, non restino offese.
- 2 Di poi per conoscere se la legatura sia stretta sufficientemente, l'estremità del tralcio si pulisca con un panno lino, e pulita si fregghi con un altro panno bianco; se questo è bagnato di sangue, è segno che la legatura è poco stretta; se poi rimane asciutto, indica essere il tralcio ben legato.
- 3 Tosto che il tralcio è legato e tagliato, il fanciullo si riceva da un'astante in un panno lino morbido, e caldo, si esamini la legatura del cordone (num. prec.), lo stesso

stesso fanciullo si pulisca, e da pertutto si osservi con maggiore esattezza il di lui corpicciuolo, per conoscere se sia perfetto in tutte le sue parti, e se debba farsi qualche operazione.

4 Inoltre il fanciullo si fasci, e gli si cuopra la fontanella. Il tralcio poi non resti sul nudo corpo; ma tra esso e il corpo si ponga qualche cosa di morbido, per impedire che il freddo tralcio e indurito, nel seccarsi, meno offenda il corpicciuolo del fanciullo; ed affinchè la tenera fontanella non resti allo scoperto, si lascino sopra di essa le immondezze, che la cuoprono.

5 Il frenulo poi della lingua, quando sia necessario, si tagli; lo che con gran cautela si fa colle forbici, o con un certo particolare istrumento. I segni che mostrano la necessità di tagliare il frenulo troppo largo, sono il non poter succhiare il latte, e il non distendere la lingua fino alle labbra.

6 Quando il tralcio troppo grosso, o sanguigno, fa temere di emorragia, ogni due ore si sfasci il fanciullo, e si osservi se la legatura sia ancora stretta, oppure se esca il sangue. Nel qual caso si stringa il secondo filo, acciocchè non ne nasca una pericolosa emorragia, la quale potrebbe succedere se questa cautela fosse trascurata.

7 Se a caso il tralcio fu strappato, o reciso accolto allo stesso ombelico, non si legghi col filo la cute del basso ventre, se non si vole fieramente tormentare il fanciullo; ma bensì vi si accomodino, e fascino addosso delle fila, e queste non bastando, si adoprinò degli altringenti.

§. 3:6. Gli Autori trattando del tempo in cui si deve legare il tralcio, ed estrarre la placenta, si dividono in tre sentimenti.

A Alcuni vogliono che si estrarra la placenta prima di legare il tralcio.

Altri

B Altri sono di parere , che si legghi prima il tralcio , e poi si estrarra la placenta .

C Altri poi pretendono che un' assistente legghi il cordone nel tempo stesso , che l' operatore estrarra la placenta .

§. 317. Il secondo metodo è ottimo .

A Imperciocchè il fanciullo attaccato ancora al tralcio , e stando in grembo della levatrice , o nelle braccia d' un' assistente , impedisce che si operi liberamente , riceve con facilità danno dalle braccia di chi lo tiene , e per un picciolissimo moto può cadere in terra .

B Inoltre se a caso si dovrà estrarre una placenta molto aderente , il fanciullo esposto all' aria libera per troppo tempo , soffrirà molto danno .

C Tanto poco ancora è il tempo , che si spende nel legare e tagliare il tralcio , che la contrazione dell' orifizio dell' utero non può ritardare l' estrazione della placenta . La troppo precipitosa contrazione dell' orifizio , la quale subito toglie ogni passaggio alla mano , come fu quella che osservò MAURICEAU nell' osservazione 305. si deve numerare tra i casi più rari , che non mutano l' ordinaria consuetudine ; anzi l' indugio è favorevole al distaccamento della placenta .

D Il sentimento di quelli , i quali vogliono che l' assistente legghi il tralcio nel tempo medesimo , che l' operatore estrarra la placenta , ha certamente qualche apparenza di vero , ma in questa operazione s' impediscono scambievolmente .

§. 318. Nel parto facile la placenta per lo più viene spontaneamente , o dopo esser tirato leggermente il tralcio . Prima però che l' operatore lo tiri , deve attentamente esaminare se nell' utero vi sia rimasto un altro feto , acciocchè non estrarra la placenta attaccata forse a quella dell' altro feto , e cagioni un' emorragia mortale al feto ed alla madre .

§. 319. Laonde passato in altre mani dall'operatore il feto, esso ponga sopra il basso ventre della partorientente la mano destra, e lo visiti e tatti con essa da pertutto. Che se in alcun luogo trova qualche gonfiezza non consueta e dura, sospetti di un altro feto; se poi la regione del basso ventre è eguale, e vi è una tumefazione più cedente e pochissimo resistente, allora questo non dimostra esservi un altro feto, ma bensì denota esser quella la parte a cui è aderente la placenta. In caso d'idropisia si faccia il necessario esame.

§. 320. Non si opera con tutta la cautela, se trascurata questa ricerca, subito si tira il tralcio, e da una resistenza insolita, che lo ritiene, si venga a dubitare esservi un altro feto. Imperciocchè quando le placente de' gemelli sono separate, la placenta del primo, se altre circostanze non si apponghino, viene facilmente, e dagli orifizj aperti nell'utero scorre il sangue; e se i dolori non spingono fuori subito l'altro feto, si cagiona una pessima emorragia; anzi la placenta de' gemelli, quando è unita insieme, può venir dietro a questo tirar del tralcio, e così formarsi una pessima specie di parto, quale è quella in cui la placenta vien prima del feto. Quella resistenza non indica sempre un secondo feto, poichè ella può nascere da moltissime altre cause.

§. 321. Nè pure la continuazione de' dolori è un contrassegno certo per dimostrare l'esistenza di un altro feto.

§. 322. Quando poi non vi sia che un feto solo;

- A Il tralcio si ravvolga intorno alle dita della mano sinistra.
- B Col pollice, e coll'indice della mano destra coperti da un panno asciutto, si prenda esso tralcio vicino alla vagina.
- C Con ambe due le mani smovendo si tiri.
- D Quando la placenta tirata segua la mano dell'operatore, questi continui a prendere il medesimo tralcio in luogo.

luogo più alto, ed a tirarlo finchè la placenta esca fuori.

E Tosto che la placenta si fa vedere, si prenda colla mano destra al principio della vagina, si cavi fuori con destrezza, e si scuota colla sinistra il tralcio, lo che aiuta un tal scioglimento.

F Quando la placenta è di già tutta fuori, si debbono ancora colla mano sinistra estrarre lentamente, e con diligenza le membrane, tirandole verso il perineo. In questa maniera si verrà ad ovviare gl'incomodi, che produconsi dai frammenti delle membrane rotte, e rimaste nell'utero.

§. 323. Fatte queste cose, subito si abbia cura della puerpera. Laonde

A Con un sciugatojo caldo, e morbido, si cuoprino subito ad essa le parti genitali.

B La puerpera potrà riposare nel letticciuolo quasi per mezz'ora, frattanto potrà mutarsi la camicia, porsi la cuffia, prendere un poco di brodo, il cordiale, o altra cosa simile.

C Lo stesso letto, in cui dovrà riposare tranquillamente nel tempo del puerperio, si conservi pulito dalle schifezze dei lochj, e ciò potrà facilmente ottenersi se si cuoprirà la materassa superiore con un panno incerato, che non abbia alcun cattivo odore, o con una pelle di cervo col pelo non per anco conciata ⁽¹⁾, e vi si metterà sopra un lenzuolo piegato a quattro doppj, o si adopererà altra equivalente difesa.

D Le si fasci lentamente il basso ventre.

E Con uno sciugatojo morbido si cuopra le mammelle, dopo avervi applicati gl'impiastri, soliti adoperarsi in tali circostanze ⁽²⁾. Con-

(1) In qualche paese si costuma questa difesa, ma appresso di noi sono molto più in uso i feltri, che ben coperti da un panno lino servono per l'accennato fine.

(2) Da noi nell'Italia, ed in altri paesi, non si costuma fare tali

impiastri, e del tutto si rigettano le unzioni con sì fatti unguenti ed untumi; ma bensì si invigila, che le puerpere stiano coperte in quella parte, e che non restino offese dal freddo.

- F Si faccia che conservi una traspirazione continova, ma che non ecceda, o passi in grave sudore.
- G Si purghi con un clistere se farà necessario:
- H E fulla fine del puerperio si purghi con un leggiero solutivo.

CAPITOLO XIII.

DI QUELLO CHE SI DEVE FARE NEL PARTO DIFFICILE.

§. 324. I. **S**E il parto *sia prematuro, o procrastinato* (§. 222. e 223.) non vi è bisogno di un'assistenza particolare, ma si devono secondare i successivi dolori, ed in ciò procedere lentamente, acciocchè la partorientente non si affatichi con sforzi inutili. Tal soverchia tardanza è rara, ma pure alcuna volta accade, ed in questo caso non ostante la faccenda ha esito felice per parte della stessa natura. Dell' aborto, e della mola ne parleremo più a basso.

§. 325. II. *Quando l'apertura della pelvi è troppo angusta* (§. 225.) il parto può divenire preternaturale; onde se ne tratterà di sotto in un capitolo a parte proponendo a riguardo di esso quanto si dovrà generalmente fare. Dove poi si parlerà del parto difficile cagionato dalla resistenza dell' osso del coccige, si spiegherà ancora la *causa dell' apertura inferiore troppo stretta di essa*. Quindi si tratterà del prolusso dell' utero, e allora si parlerà *della pelvi troppo larga* (luog. cit.).

§. 326. III. IV. V. VI. VII. In tanti capitoli parleremo della *situazione obliqua dell' utero*; della *cattiva situazione del feto*; e della *sua difettosa proporzione*. Si tratterà ancora a' suoi luoghi del caso in cui si *presentano insieme più membra*, e del *distaccamento della placenta* (§. 226. e seg.)

§. 327. VIII. Siccome *le donne giovani e primipare*
P (§. 232.

(§. 232. 245.) sono soggette alle convulsioni, procurino assolutamente di farsi cavar sangue sul principio del parto (§. 272.). Promovano con gli sforzi soltanto i veri dolori, e in nessuna maniera tentino violentare l' opera della natura.

§. 328. Ancora *le avanzate in età* (§. 232.) che partoriscono un poco più lentamente, si guardino dal violentare la natura con sforzi superflui. L' operatore ammolli le parti, forse troppo aride, con materie untuose.

§. 329. Non si può dare alcuno speciale consiglio *alle grasse, alle macilenti, e alle piccole* (§. 233. e legg.).

§. 330. Le *gobbe* (§. 236.) non si ponghino sulla sedia se non quando una gran necessità lo richiegga (§. 274.). La sedia ad esse è più comoda del letto, a cagione della positura. Le *zoppe* partorischino nel letto, con i piedi appoggiati al grembo della levatrice (§. 285. lett. A).

§. 331. Le *deboli* (§. 237.) si ristorino con i più grati cardiaci, non partorischino sulla sedia, ma fino dai primi dolori veri si ponghino a giacere in letto, o si tenghino da un' astante molto robusto in grembo (§. 304.). Le cose oppiate date con cautela dal perito sono buonissime: poichè sedano gli spasmi contrarj ai dolori, e producendo il riposo ristorano.

§. 332. Si operi con somma precauzione quando la situazione obliqua dell' utero è unita alla debolezza della madre: in questo caso in vero senza esitazione conviene, potendo, estrarre per i piedi il feto, perchè non si può sperare grand' ajuto dalla natura.

§. 333. Di sotto si parlerà particolarmente delle *convulsioni, e del profluvio di sangue* (§. 238. lett. A). Delle altre malattie (luog. cit. lett. B C F G) alcune si debbono rimuovere avanti il parto; altre si debbono mitigare nel tempo stesso del parto co' proprj loro rimedj.

§. 334. 1. Quelle che patiscono *malattie di petto* (luog. cit. lett. C) facciano i loro sforzi stando sulla sedia, e
non

non a giacere in letto, imperciocchè per esse è più conveniente la situazione elevata del tronco, che la supina.

2 L' *ernie* (luog. cit. lett. D) si riponghino; e postavi sopra la palma della mano si tenghino, acciocchè non possano crescere per la forza de' dolori, e incarcerarsi. Dopo il parto si cinghino con una fascia.

3 I *piedi gonfi* (luog. cit. lett. E) non si pieghino verso le parti superiori, ma da un' astante sieno tenuti fermi, e distesi, mediante la compressione fatta sulle ginocchia.

4 Le *varici* (luog. cit. lett. E) si debbono comprimere, o con la mano, o con una fascia, acciocchè non si rompano, e non si produca una pericolosa, anzi mortale emorragia, e la donna giaccia supina nel tempo del parto.

§. 335. L' *animo della partorientente indocile, ed abbattuto* (§. 239.) si sollevi, ed incoraggisca con buone maniere; ma la pertinace si reprima con maniere forti, e risolute.

§. 336. IX. Levata la causa *de' dolori vaganti* (§. 240.) subito ne sieguono i più efficaci. L'uso dei rimedj violenti sia rarissimo, nè si usino se non quando si trovano tutte le condizioni per un parto facile, e mancante soltanto dell'efficacia dei dolori, che è un caso più immaginario, che vero. Alcuni dei medicamenti oppiati, e più decantati, possono in questo caso convenire (§. 331.).

§. 337. I medicamenti, che ajutano a far partorire sono superstiziosi, ingannano la plebe stupida, e cuoprono l'ignoranza delle levatrici. I Medici più prudenti, e poco periti nell'arte ostetricia, consolano la partorientente e gli amici, e provveggonno al loro onore con dare dei medicamenti innocenti. Una gran turba di medicaſtri, di ciarlatani, e di levatrici, pretende che si debbano usare rimedj violenti, e che portano il sangue all'utero, simili in tutto a quelli, che con somma stoltezza si sforzano di estinguere un incendio colla spada.

§. 338. X. Le *malattie locali* (§. 242. e seg.) si tolghino avanti il parto coi rimedj proprj, per quanto sarà possi-

bile . In qual maniera si debba reprimere *il prolasso dell' utero* , e *della vagina* (luog. cit. lett. F) nel tempo del parto , si esporrà in un capitolo a parte .

§. 339. 1. *I tumori alla bocca dell' utero* (luog. cit. lett. A B) *ovvero la stessa bocca uterina chiusa* (lett. C) molto di rado si sanano coll' arte Chirurgica ; ma richieggono l' operazione detta cesarea .

2 Essendo imminente il parto (luog. cit. lett. B) si faccia sgravare la partoriente tanto delle *orine* , che delle *fecce* (§. 267. e 269.) . Il *calcolo* poi spinto dalla forza de' dolori nell' uretra , e nel collo della vescica , o si estragga , o coll' introduzione della sciringa , o col dito si rimandi indietro nella vescica .

3 L' *imene troppo stretto* , e che rende angusta la vagina , si apra con un taglio fatto in croce . La *vagina attaccata insieme* o si dilati a poco a poco , con l' introdurrevi delle spugne preparate , e di mano in mano accresciute di grossezza , o si taglino le briglie che formano la coalescenza , e si aprano i tumori qualora ve ne sieno . Abbia indi l' operatore riguardo all' emorragia , che può seguire , ed impedisca dopo il parto la riunione per mezzo di un' ampia cannella forata in più luoghi (luog. cit. lett. D E) . Alle volte la natura stessa con dilatare da per se (§. 87.) e colla forza dei dolori , suol rimuovere tali ostacoli . Nel caso urgentissimo di temere una duplice emorragia , massimamente per motivo di una conformazione preternaturale , l' operazione cesarea è l' ajuto il più sicuro .

4 La vagina viene ad allargarsi per ragione della marcia naturalmente maturata , o mediante l' ajuto dell' arte , e sgorgata da un' *ulcera* che vi si trovasse (luog. cit. lett. E) e avesse fatto anteriormente l' impedimento .

5 L' aumento che potrebbe acquistare un' *ernia uterina* (luog. cit. lett. G) si prevenga con una riposizione fatta a tempo , e se non è aderente si reprima nel tempo del parto , e l' utero si disponga ad un parto naturale . Se poi que-
sto

sto non si può fare, singolarmente per l'adesione che abbia, la sola operazione cesarea può esser giovevole.

6 *L'inflammazione dell'utero, della vagina, e del seno* (luog. cit. lett. E H I) si mitighi con cavate di sangue, con applicarvi rimedj temperanti, risolventi, ed emollienti. In caso d'inflammazione della vagina, e del seno, che non si può sciorre, e che tende all'ulcere, l'operatore deve promuovere la suppurazione, acciocchè non si formi una cancrena. Di poi si faccia uscire la marcia dall'ulcera matura, affinchè non resti angustata la strada (num. 4.). Nell'inflammazione dell'utero confermata non ci possiamo fidar punto dei dolori, che mancano in tal circostanza, ma dobbiamo ricorrere all'arte, e dobbiamo estrarre il feto. Conosciamo essere pericolosissima la malattia per la febbre, per i sintomi che l'accompagnano, per la tumefazione acuminata del basso ventre, e per il grandissimo dolore; per mortale poi si ravvisa dalla cancrena, o ulcera, che per lo più sopravviene.

7 Applicando un clistere (§. 267.) si ottiene che le *moroidi* (luog. cit. lett. H) non restino irritate, ed offese; e l'ostacolo che ne potesse venire all'apertura inferiore della pelvi (§. 287. num. 2. e §. 302.) si scema mediante i medicamenti emollienti.

8 *Le parti genitali escoriate* (luog. cit. lett. L) si bagnino con decozioni deterfive.

9 *I tumori edematosi* si scemano con medicamenti interni revulsivi, e con fomite di vino, e di aromati, e così saranno facilmente superati dall'impulso del feto (§. 244.). Rare volte si sciolgono totalmente avanti il parto, essendo parzialmente prodotti dall'impedimento, che trova il sangue in ritornare per le vene inferiori compresse dall'utero. Non sono punto a proposito le incisioni, e le scarificazioni, poichè facilmente cagionano la cancrena, e nel parto restano lacerate nel dilatarsi le parti.

§. 340. XI. Quando *il feto è morto* (§. 246.) l'opera-

ra-

ratore niente faccia di particolare, non adopri rimedj impellenti, e non tema per tal cagione che il parto sia per essere più difficultoso. Come poi si possa distinguere il feto morto dal vivo, s'intenderà da quanto sarà detto di sotto.

§. 341. XII. *Se il parto tarderà lungamente* (§. 247.) per affrettarlo non si devono lacerare le membrane (§. 309.) nè dare medicamenti che diano impulso (§. 336. e seg.) come pure non si deve incitare a fare sforzi troppo gagliardi, ma si devono rimuovere gl'impe-
dimenti, e dare ad essa i cardiaci i più innocenti, e qualche cosa ancora di oppiato (§. 331.) per acquietarla, e ingannarla nell'indugio del parto, e per mitigare ancora i dolori.

§. 342. XIII. *Le malattie che nascono dal parto* (§. 248.) si curino col metodo loro proprio.

C A P I T O L O XIV.

DELLO STACCAMENTO DELLA PLACENTA.

§. 343. **I**N verità nello staccamento della placenta è necessario che l'operatore distingua tre casi.

I. E' quello quando egli può lasciare operare alla natura.

II. E' quando la partoriente subito deve liberarsi della placenta.

III. Quando la placenta è rimasta per lungo tempo nell'utero.

§. 344. I. Quando la partoriente non preoccupata da strane opinioni lascia all'operatore tutta la libertà d'agire, può avendo partorito trattenerfi, e riposare giacente in letto (§. 323. lett. B) e l'operatore non comparendo alcun pericoloso sintoma, come verbi grazia l'emorragia, le
con-

convulsioni, che obblighino ad operare speditamente, può aspettare il distacco spontaneo della placenta fino al termine di una mezza, o di un' ora intiera in circa. Imperciocchè le stesse contrazioni dell' utero in quell' intervallo di tempo sogliono staccare la placenta dall' utero, e mandarla fuori dalla bocca del medesimo a forma di un altro parto.

§. 345. Questa placenta spinta nella vagina, esce spontaneamente da tal luogo, ovvero per un leggiero moto, o passeggio della partoriente viene a cadere, o senza difficoltà si estrae dall' operatore.

§. 346. II. Quando poi la natura non ajuti per il soprad detto spazio di tempo; o la partoriente desideri di esser liberata dal peso della placenta; o sia stanca dallo stare sopra una sedia disagiata, dalla quale già si doveva liberare subito succeduto il parto, e trasportare nel letto del puerperio (§. 301. lett. F) o un copioso flusso di sangue prodotto dallo staccamento di una parte della placenta, mentre la medesima in tutto il resto del suo volume sussiste aderente, muove l' operatore ad agire prestamente; si deve coll' arte staccare la placenta, o almeno aiutare la natura: il che certamente è stato costume di farsi in due modi, tentando in principio il più semplice, con tirare cioè il tralcio nel modo insegnato di sopra al §. 322. osservate sempre le cautele nel caso di due gemelli (§. 318. e seg.). L' altro poi più lungo, e tedioso (1).

§. 347. Imperciocchè la placenta non vien dietro sempre al leggiero scuotimento del tralcio, poichè

A Alle volte lo stesso orifizio subito dopo un parto anche facile si restringe talmente, che la placenta benchè di piccola mole vien ritenuta.

B I tumori nelle adiacenze dell' utero (§. 243. lett. A B) A

trat-

(1) Che consiste nell' introduzione, e cautele, che convengono della mano, e con quella operazione in tal caso.

trattengono la placenta, la quale è spinta con minor forza del feto.

C La placenta essendo di gran volume trova impedimento all'orifizio dell'utero, secondo che esso medesimo è più, o meno angusto.

D Il tralcio stà attaccato nel centro della placenta. (S. 77.).

E Le fibre colleganti sono dotate di validissima forza, e resistono egualmente alla soluzione, che può loro venire per parte della contrazione dell'utero, che per la tiratura violenta del funicolo.

F Quando l'adesione della placenta non è nel fondo dell'utero, allora segue che la contrazione non è diretta verso l'orifizio del medesimo. Imperciocchè quelle fibre alle quali stà attaccata sono troppo distese, e deboli; onde le altre più forti di queste si stringono intorno alle medesime, e tanto è lontano l'ajuto al distaccamento della placenta, che più tosto stringendola con maggior pertinacia la ritengono.

S. 348. Certamente l'operatore non deve tentare di tirarla.

1 Quando il tralcio è sanguigno (S. 76.), nel caso del feto putrido, e in quello dell'aborto, nei quali casi il tralcio è fragile, come pure nel caso dei parti acerbi, nei quali la coesione della placenta è molto grande.

2 Quando la donna ha disposizione al prolusso, o al rovesciamento dell'utero.

3 Quando il flusso del sangue per qualunque dimora può divenire dannoso.

S. 349. Nei sopradetti casi (S. 347. e 348.) e maggiormente se vi si aggiunge il principio della rottura del funicolo,

A Desista l'operatore di tirare.

B Colla mano sinistra tenga teso leggermente il tralcio, e lungo il medesimo, introduca la destra nell'utero fino alla placenta. Quan-

C Quando la contrazione della bocca dell' utero, i tumori adiacenti al medesimo, e lo stesso volume della placenta (§. 347. lett. A B C) ritardino l' uscita di questa, già staccata e situata dietro la bocca dell' utero, si prenderà colla mano, e si estrarrà. Per prenderla poi meglio, si ponga il pollice nel mezzo di essa ove stà attaccato il tralcio, e le altre dita nella circonferenza. Prima s' incominci a staccare il di lei contorno, dipoi il rimanente, per modo che la mole compressa successivamente venga a muoversi. Giova ancora che la partorientente tossisca, sotti forte in un suo pugno, o faccia degli sforzi simili a quelli del parto.

§. 350. Ogni volta poi, che la placenta rimane ancora attaccata all' utero, fatta l' introduzione della mano (§. prec.),

A Convien portare la mano intorno a tutto il giro della medesima placenta, e cercare quel luogo dove forse in parte è staccata; e trovato questo,

B Si deve dirigere essa mano col dorso verso l' utero, e con la palma verso la placenta; poi fra la parte staccata e l' utero, si debbono porre successivamente le dita, e con spingere innanzi le medesime si deve staccare tutta la detta placenta, in quella guisa che si leva la pelle agli animali.

C Staccata nella maniera detta al §. prec. lett. C si caverà fuori.

D Se in nessun luogo è staccata, deve l' operatore andare all' estremità inferiore delle membrane, o in quel luogo dove si può far ciò, e col porre il dito fra questa estremità, e l' utero, deve staccarla, e procedere nella maniera detta di sopra alla lett. B.

Tutte queste cose però si facciano con somma cautela, con moderatezza e sofferenza, e senza fretta, acciocchè non si offenda in alcuna maniera l' utero.

§. 351. Quando l' orifizio dell' utero si trovi assai

ristretto per qualche coalescenza sofferta, che le dita non vi possano entrare; primieramente s' introduca un dito solo nell' apertura, e portatolo in giro renda quella più ampia, dipoi s' introduca il secondo, indi il terzo, e il quarto nella stessa maniera, e finalmente tra esse dita si nasconda il pollice, e così la mano venendo a formare un cono, allarghi l' orifizio come un cuneo, ed estragga la placenta.

Se a caso l' orifizio della vagina ancora resiste, per aprirlo si tenga lo stesso metodo.

§. 352. III. Quando finalmente l' operatore è chiamato tardi dopo il parto, tenti prima i mezzi descritti di sopra. I sintomi che accompagnano la placenta restata molto tempo nell' utero persuadono ad operare con prestezza, e dipendono

A Dal flusso di sangue continovato, procedente da una porzione di essa placenta staccata.

B Dalla infiammazione dell' utero, la quale produce ascessi, scirri, cancri, e cancrena.

C Dalla putrefazione della placenta, che si manifesta dal fetore che si fa sentire.

§. 353. Se poi l' orifizio fortemente serrato non si può allargare con i mezzi stati detti, benchè ciò succeda di rado, non si dee aprire con violenza, o con lacerarlo, ma si deve unicamente stare in osservazione senza fare altro. Imperciocchè suole accadere, che la placenta rimasta, dopo un qualche tempo risvegliatisi di nuovo i dolori, venga spinta verso l' orifizio, e lo apra un poco. Allora si deve subitamente profittare di questo momento, e introdurre la mano nell' utero. Questa stessa operazione si deve tentare per due o tre volte, se a caso alla prima comparsa della doglia non si potesse effettuare l' introduzione della mano. Inoltre alcune volte la placenta rimasta nell' utero viene gettata fuori naturalmente dai dolori che sopravvengono,

no, o essendo dietro all' orifizio, viene fuori ad un semplice scuotimento. Non è cosa insolita neppure, che la strettezza dell' orifizio dell' utero diminuisca sul secondo o terzo giorno. Spesso ancora la placenta resta molto tempo nell' utero senza alcun pericolo.

§. 354. L' operatore poi non creda di aver soddisfatto al suo obbligo, quando abbia introdotto nell' utero due o tre dita, e con esse abbia preso la placenta. Imperciocchè come potrà uscire l' intera placenta, avendovi potuto appena introdurre alcune dita? Piuttosto questa tirata con violenza si lacerà, e se n' estrae quella porzione soltanto, che è stata afferrata; il resto che rimane nell' utero rende inutile quest' operazione.

§. 355. Nondimeno la placenta senza alcuna colpa dell' operatore alle volte essendo floscia, e putrefatta, si cava fuori, e si cava a pezzi, e così realmente si deve cavare, allora quando la contrazione della bocca dell' utero, ed altri mali (§. 352.) non permettano d' indugiare. Nel qual caso con le dita a poco a poco portate più in alto si stacchi una parte della placenta, si prenda, e si tiri a se, ed avendone staccata o liberata una porzione, si vada immediatamente ad afferrarne un' altra parte.

§. 356. Se forse a cagione della legatura fatta in una parte del tralcio, come si costuma, fosse trattenuto il sangue nella placenta, e perciò la medesima si trovasse piena, e gonfia, si può per tal fine sciogliere la legatura, o tagliare il tralcio, acciocchè versato il sangue, scemi essa alquanto di mole.

§. 357. Quando la placenta stà attaccata all' utero fuori del fondo, la sostanza di questo alle volte si contrae talmente intorno alla placenta, che la circonda tutta, la nasconde come in una celletta, o capsula, la quale si apre colla successiva introduzione delle dita.

(§. 351.) Il tralcio poi serve di guida all' indice , il quale si deve introdurre il primo , o mancando questo tralcio , si cerchi l' apertura di quella capsula , o quasi borsa .

§. 358. Se talora il tralcio si è rotto , siamo privi di guida , che diriga la mano da introdursi ; onde nel tempo stesso che si mette la destra nell' utero , la mano sinistra leggermente comprima il basso ventre della partorienti , acciocchè si possa determinare il luogo della placenta , che si distingue dalla prominenza degli integumenti . Prima ancora che sia compita l' operazione non si deve levare la mano , ma con leggiera pressione tener ferma , e fissare la placenta , e l' utero stesso , acciocchè questo commosso dall' azione della mano destra , non renda più difficile lo staccamento della placenta .

§. 359. L' operatore abbadi di non offendere con troppo maneggiare , e comprimere quella parte dell' utero , che forse crede esser la placenta . I vasi maggiori che si trovano nella superficie della placenta , un pezzetto del tralcio forse rimasto , e l' insensibilità della medesima placenta , la distinguono dall' utero , il quale per la superficie è simile , ed è inoltre a differenza di quella sensibile .

§. 360. Il metodo descritto è molto migliore di quello , col quale si estrae la placenta tirando violentemente il tralcio . Imperciocchè non solo è inutile nel caso che si rompa il tralcio , ma ancora succedendo che resti felicemente estratta , ne vengono i seguenti mali .

A Tirando in tal maniera il tralcio si fa scendere il fondo dell' utero : e per piccolo sforzo , che faccia la donna , vien portato più basso dell' orifizio medesimo , e così viene a formarsi il rovesciamento dell' utero : anzi il fondo qualche volta vien subito dietro a questa tiratura : in altre , che abbiano della disposizione al prolusso , l' utero tutto si rovescia .

B A cagione della ineguale contrazione dell' utero , nascono dopo il parto dolori fierissimi .

In

C In altre si lacerano gli orifizj dei vasi uterini, e ne segue l' emorragia; gli orifizj lacerati si rammarginano, e ne succedono i mestruj dolorosi, il flusso bianco, l'idropisia dell' utero, il sarcoma ec.

D Se a caso rimane un pezzo della placenta lacerata, e in parte, o del tutto staccata, continuamente si versa del sangue.

E Se poi questo pezzo di placenta stia attaccato più tenacemente all' utero, e sia di considerabil mole, il sangue ivi trattenuto infiamma l' utero.

§. 361. Non solo è vano il timore de' mali che si credono poter nascere dalla mano trattenuta nell' utero, poichè nel parto preternaturale si suol fare lo stesso senza pericolo, mentre s'introducono ancora varj strumenti; che anzi da ciò ne nascono molti vantaggi. Imperciocchè così

A Con certezza si distingue se vi sia rimasto, o no, nell' utero un altro feto, o una mola, o qualche altro corpo.

B La madre resta libera dalle doglie che cagiona la tiratura inutile del tralcio.

C L' operazione si fa presto.

D I mali descritti al §. prec. si scansano sicuramente.

§. 262. Non sono ancora da lodarsi, ma più tosto da temersi, diversi generi di rimedj, come gl' impellenti, i clisterj acri, le supposte, e le iniezioni similmente irritanti, i vomitatorj, i purganti, gli starnutatorj, e simili.

A Superflua è parimente la loro azione, se la placenta staccata trovisi arrestata vicino all' orificio (§. 347. lett. A B C).

B Dannosa ella è tutte le volte che non si può liberare essa placenta dalla contrazione dell' utero, e per la forte connessione della medesima con esso. Imperciocchè non

non solo essi rimedj non possono distruggere questo collegamento , ma adunano il sangue nell' utero , il quale ammassato , e non potendo cessere consumato dal feto di già uscito , infiamma l'utero , e ne nasce una febbre acuta , dal che si va incontro alla morte.

C. Se poi la placenta è in parte staccata , allora è aperto un esito al sangue che vi si porta , e molto presto la partoriente è privata insieme col sangue della vita.

§. 363. Non si possono neppure approvare diversi metodi di estrarre la placenta , quali sono per esempio.

1. Di forare la placenta con la forza del dito introdotto , e piegato a guisa d' oncinio , perchè resta in tal modo offeso anche l' utero , e questo facilmente s' infiamma , e sopraggiungono tutti quei mali indicati nel §. 360.

2. Le compressioni del basso ventre fatte o colla mano , o collo sciugatojo , o con globetti di legno , cagionano contusioni , infiammazioni , ed ascessi.

3. Le tanagliette facilmente prendono anche l' utero , e possono cagionare i mali accennati nel §. 360. e tiran fuori la placenta a pezzi , non già intiera. Più comode , e sicure delle tanagliette sono le dita.

§. 364. Ogni volta che una porzione della placenta è rimasta nell' utero , e ne nascono gl' incomodi descritti nel §. 360. lett. D E , subito si deve essa estrarre , o intiera , o divisa , acciocchè spontaneamente cessino quei mali , o si superino con gli appropriati rimedj . Spesso la bocca dell' utero ferrata , e quella porzione della placenta difficilmente distinguibile dall' utero medesimo , rendono questa operazione più laboriosa.

§. 365. Tutte le volte che la partoriente non soffre alcun male per cagione di questa porzione di placenta restata , e non si può facilmente estrarre , senza necessità non si deve stancare la medesima coll' operare ; ma si può eleggere il minor male , e lasciare tutto l' esito alla natura , la quale non senza qualche doglia manderà fuori

fuori questa porzione, o intiera insieme, con i lochj, o sciolta in fetida marcia.

§. 366. Il Medico molte volte non sa quali mali possa cagionare alla puerpera un pezzetto della placenta rimasta nell'utero: per la qual cosa venendo in sospetto dai gravi accidenti (§. 352. e 360. lett. D E) di un vizio nell'utero, non deve trascurare d'istituire sopra di ciò il più esatto riscontro.

§. 367. Tosto che la placenta è uscita, il Professore deve prender cura dell'utero. Onde subito tornerà ad introdurre la mano nell'utero per cavare tutto ciò che vi fosse restato di straniero, come le membrane, una particella di placenta, e il sangue aggrumato. In questa maniera l'utero si contrae egualmente, e senza alcuno impedimento, e resta liberato da ogni irritazione. Molto bene adunque si pone riparo al flusso del sangue, all'inflammazione, ed ai dolori, che potrebbero sopravvenire dopo il parto.

§. 368. Per far meglio queste cose, il Professore

A Con somma cautela, e moderazione conduca la mano intorno a tutta la circonferenza dell'utero, e prenda tutto ciò che deve cavarli; dipoi tenga ivi la medesima a pugno stretto, finchè l'utero non sia ugualmente contratto intorno alla medesima mano. Contratto poi che sia, la ritiri, e con essa porti fuori tutto ciò che dovrà essere cavato.

B Quando l'utero è obliquo, qualunque siasi questa obliquità, lo riduca nella situazione retta.

C Se una parte dell'utero si contrae più di un'altra, reprima quella, e spiani le rughe; finalmente quando sia egualmente contratto cavi la mano.

D Simile opera di mano s'impiegherà riguardo ancora alla vagina, rimettendo al suo luogo l'utero se fosse calato, e vuoterà esattamente la medesima vagina.

E Se per disgrazia l'utero dopo il parto non si volesse

lesse contrarre , è inutile che si trattenga in quello la mano , ma conviene lasciare quieta la madre , e superare il male con gli appropriati rimedj .

§. 369. Ogni volta che una porzioncella della placenta , o delle membrane , o di sangue concreto sia rimasta nell' utero , si scioglie in materia putrida ; cosicchè per mezzo d' iniezioni deterfive si deve ajutare l' opera della natura , acciocchè meglio l' utero resti purgato , e si difenda dal danno di queste fordide materie . A questo fine soddisfa pienamente un particolare schizzetto , che abbia il suo sifone , o cannello , che penetri nell' utero . Quello schizzetto poi , che lava la sola vagina è meno adattato a quest' uso .

C A P I T O L O XV.

DEI SEGNI DEL FETO VIVO, E MORTO.

§. 370. **L**A levatrice deve distinguere in due diversi tempi il feto vivo dal morto , per mezzo di segni affatto differenti .

A Nel tempo della gravidanza avanti il parto .

B E nel momento appunto precedente al parto .

§. 371. Avanti il parto ci dà un segno certissimo della vita del feto , il moto di esso , il quale incomincia quasi sul mezzo della gravidanza , e giornalmente si accresce (§. 154.) .

§. 372. Ma poichè nel basso ventre delle gravide si fuscitano molto spesso dei moti , i quali possono ingannare , perciò il Medico può determinare col seguente esame se il moto sentito nel basso ventre sia prodotto realmente dal fanciullo .

A L' agitazione del feto suol' essere più frequente , e più forte la mattina , per la qual cosa in quel tempo
stando

stando la donna gravida in letto si facciano le dovute ricerche sopra di essa.

B La donna stia a giacere supina, col capo e ginocchia alzate, ed i calcagni accostati alle natiche.

C Il Medico ponga sul basso ventre di essa la mano distesa nel mezzo, tra l'ombellico, e l'osso del pube.

D Se compresso leggermente il basso ventre sente un movimenro fatto verso l'esterno, non deve dubitare della vita del feto.

E Rinnovi quest' operazione più volte, se la prima sarà riuscita inutile, finchè non senta l'urto del feto.

F Se poi dopo aver ripetuto questa ricerca, il basso ventre resta perpetuamente senza far sentire moto veruno, si deve tenere quasi per certo, che il feto sia morto.

§. 373. Acciocchè questo segno acquisti maggior dimostrazione, se ne debbono aggiungere altri, i quali dipendono dall'incremento stesso del feto. Imperciocchè il feto vivo cresce ogni giorno insieme coll'utero; onde il basso ventre viepiù si distende, gonfia, s'indurisce, resiste, sale verso la fossetta del cuore, rende tesi gl' ipocondri, toglie e spiana la fossetta dell'ombellico, e a poco a poco la spinge in fuori a forma di un monticello.

§. 374. Quando poi il feto è morto non cresce di più, e perciò non distende ulteriormente il basso ventre; anzi il feto medesimo più tosto rimpiccolisce, divien più grave, e si abbassa insieme coll'utero, laonde diminuisce anche il tumore del basso ventre, discende, fa forza nell'apertura superiore della pelvi, rende libero l'ombellico, e gl' ipocondri, per modo che la fossetta di quello comparisca di nuovo, e la regione di questi si rilassi. Essendo ancora compresso l'intestino retto, e la vescica, ne segue il tenesmo, e l'incontinenza; o la soppressione dell'orina. Se ancora la gravida si volta con velocità da un lato all'altro, il peso grande del feto segue questo moto.

§. 375. Allorchè il feto muore, cessa quel moto che di già alcuna volta si era fatto debole, o languido, altre volte poi una gagliardissima agitazione, nata senza dubbio dalle convulsioni di esso agonizzante, precede la di lui morte. Nel tempo stesso ancora del parto, la partorientente sente le agitazioni del feto, che muore, con un notabile movimento del basso ventre, accompagnato da tremito, e da freddo.

§. 376. Gli altri segni, sebbene molto lodati, sono più incerti, anzi favolosi, come per esempio la faccia di colore piombato, gli occhi lividi e depressi, la palpitazione del cuore, il respiro difficile e fetente, il dolore di capo, l'offuscamento degli occhi, il mormorio e fischio degli orecchi, la febbre lenta, i deliquj, ed altre cose simili, si sospettano, per timore intieramente panico, come dipendenti dalla morte succeduta del feto.

§. 377. Questi incomodi certamente non affliggono la madre, se non quando il feto già putrido si trattiene nell'utero. Allora poi imputridisce, quando le membrane rotte e lacerate lasciano liberamente entrare l'aria nell'utero; ma questa rottura molto di rado segue avanti il parto, e però molto di rado ancora succede che il feto putrido dimori per lungo tempo nell'utero. Il sangue radunato dentro l'utero, e non consumato dal feto, produce mali più leggieri dei descritti (§. prec.) ma ne produce anch'esso diversi da considerarsi come una disposizione nello stesso utero all'inflammazione, la quale con gli ajuti dell'arte si deve togliere, dolore di capo, scarsità di lochj, dolore di ventre, e delle mammelle, la febbre, e il polso pieno, e duro.

§. 378. Il basso ventre freddo e rilassato, le mammelle divenute flaccide, e il fiero latte mandato fuori in copia dalle medesime, denotano l'esistenza del feto morto, ed essere intercetto l'afflusso del sangue nell'uo-

vo: onde questi segni uniti agli antecedenti (§. 371.) confermano la morte del feto.

§. 379. Sul preciso tempo del parto, si deve variare e regolare la propria condotta, a norma di quella parte del feto, che si presenta la prima. Difficile molto per altro è il conoscere se sia la testa quella che viene trattenuta nella cavità del bacino, nel caso che sia essa quella parte che si presenta la prima. Per vero dire nel parto facile questa cognizione è superflua, nel difficile poi alle volte è utile, specialmente quando siamo costretti a estrarre il feto con strumenti che possono offendere.

§. 380. Se il feto è morto avanti d'entrare nella pelvi, il capo arrestato in essa forma un tumore più piccolo, e questo si può dire segno non equivoco della di lui morte. Imperciocchè se il capo del feto vivo vien compresso, allora il sangue che scorre in maggior copia, che ristagna, e che si sparge nel tessuto cellulare, aumenta il tumore formato dal capo, il quale nel parto molto lento del feto vivo, forma quasi un secondo capo. Pertanto la mancanza del tumore denota non darsi più la circolazione del sangue, ma bensì rilevasi la morte. Quando poi la testa, o altra parte, dà luogo a prodursi una tumefazione, la quale certamente non può prodursi senza una continuazione del circolo del sangue, non si può altrimenti dubitare che il feto non sia vivo.

§. 381. Tuttavolta la sola esistenza del tumore non è una prova della vita attuale del feto, ma dimostra soltanto che il feto era vivo sul principiare del parto. Alle volte sul principio del parto gonfia il capo al feto vivo, dipoi per compressione muorendo il feto, rimane esso tumore del capo, il quale non cresce di più, nè viene indurito dai dolori, come quello del feto vivo, ma a poco a poco si ammolisce.

§. 382. Il feto, o vivo morto che sia, più non si muove quando il capo è disceso nella pelvi senza il liquido dell' amnio; onde niente si può inferire da questa sua immobilità riguardo alla morte, o alla vita. Allora il feto giace sbalordito, e non ha luogo da distendere le membra. Niente neppure dimostra la pulsazione della fontanella, la quale rarissime volte, anzi mai si può sentire, ancorchè sia vivo il feto. Il tralcio poi dell' ombelico pendente avanti il capo, quando è freddo, ed alle volte privo di battito, è un segno certo del feto morto.

§. 383. L'uscita del meconio, quando il capo scende come deve, indica che il feto è debole, e moribondo, ma non già morto. Imperciocchè nell' agonia, i muscoli che servono a mandar fuori gli escrementi sono con tutti gli altri muscoli agitati in tale occasione.

§. 384. Certamente finchè il feto vive, il suo cervello suol gonfiare, dilatare il cranio, e scostare gli ossetti in maniera che non si tocchino. Quando poi il sangue, e gli altri fluidi riduconsi alla quiete, il cervello si abbassa, gli ossetti del cranio tornano a riunirsi, in modo che se si muove col dito qualche osso del cranio, i suoi confini urtandosi, fanno una specie di sgretolio. Lo sgretolio o rumore adunque delle ossa del cranio ci dimostrano che il feto è morto.

§. 385. Non v'è segno più certo della putredine per dedurre la morte del feto, gl'indizj della quale sono:

A L'umore putrido, che scaturisce dalle parti genitali; resulti poi questo dal fluido dell' amnio, o dal meconio, o esca dalla bocca, e narici del feto, o dalla stessa placenta, che si disfà, e dal feto putrido.

B Il fetore nauseoso, che esala dalle parti genitali.

C Le carni del feto vizze e quasi disfatte, la cute, e la cuticola che si separano, benchè toccate leggiermente. Frattanto però non si deve subito giudicare vivo quel feto, che ha l'epidermide bene aderente. §. 386.

§. 386. L'umore putrido si distingue dal meconio per il colore, per l'odore, e per la sua particolare consistenza. Il meconio non ha odore, tinge l'acqua di verde, e giallo, e nuota nel liquido dell'amnio in figura di piccioli globetti. Gli umori putridi puzzano come la vera marcia, e sono scuri, e senza consistenza.

§. 387. Lo stesso giudizio che si fa del capo, si formi d'ogn'altra parte del corpo, se la medesima talmente abbia turato l'orifizio dell'utero, che del tutto sia impedito alla mano il potervi penetrare.

§. 388. Quando poi è permesso alla mano l'entrare nell'utero, è segno evidente che il feto è morto, come pure se manca il battito nel tralcio, e nel cuore, se sono immobili le dita delle mani, e de' piedi, e la lingua, e la parte che si presenta se non rendasi gonfia.

§. 389. Si giudicherà parimente morto il feto, se ci farà nota una qualche cagione, per se stessa capace a privarlo di vita, e che sia intervenuta. Nel parto poi uccidono il feto,

- A Una emorragia copiosa dell'utero.
- B Il collo per lungo tempo stretto dal tralcio ombelicale.
- C Il presentarsi col collo piegato.
- D Il capo situato obliquamente, e per lungo spazio di tempo spinto contro le ossa della pelvi.
- E Il capo lungamente arrestato nella pelvi stessa, a cagione della soverchia angustia.
- F Il collo stretto dall'orifizio dell'utero, o della vagina.
- G Il tralcio per essere stato compreso, essendo escito fuori avanti la testa.
- H Il medesimo quando è annodato strettamente.
- I Lo stesso rotto.
- K Il medesimo lungamente compreso tra il capo e l'ossa della pelvi, quando si sia obbligati a estrarre il feto per i piedi.

Quan

- L Quando la testa si stacca dal resto del corpo.
- M L'esserfi serviti di strumenti, l'uso dei quali può essere molto offensivo, e micidiale.
- N Quando l'umore dell'amnio s'è insinuato nei polmoni del feto.
- §. 390. Le cagioni poi che ammazzano il feto avanti il parto sono le appresso:
- A Una malattia acuta, e violenta, sopravvenuta alla madre.
- B La collera della medesima, e lo spavento improvviso, o gagliardo.
- C Una violenza esterna.
- D La costituzione morbosa della *placenta*, non sufficiente a somministrare bastevole alimento.
- E Lo stato infermo della madre, che priva il feto del nutrimento necessario.

CAPITOLO XVI.

CONDOTTA CHE SI DEVE AVERE NEL PARTO PRETERNATURALE.

§. 391. **Q**Uando il parto richiede assolutamente i soccorsi dell'arte, a motivo degli ostacoli che la natura sola non può superare (§. 214.), l'operatore deve estrarre il feto o colla mano, o con gli strumenti. Prima d'ogni altra cosa bisogna collocare la partoriente in una situazione comoda per l'operazione, ma diversa da quella che si richiede per fare i dovuti sforzi nel parto naturale (§. 276.) e questa deve essere tale, che

- A L'operatore possa fare comodissimamente quanto deve eseguire.
- B La partoriente resti affatto ferma.

§. 392.

§. 392. Il primo fine si ottiene, se

- A La partorientente stia a giacere supina, col capo e con gli omeri un poco più bassi delle natiche, talmente che l'operatore agisca con tutta la libertà, e l'utero col feto meno graviti sulla pelvi, ma piuttosto retroceda.
- B La medesima si ponga alla sponda del letto, talmente che posi sull'osso sacro, e tutte le cosce stieno pendenti. In questa maniera l'ingresso della pelvi rimane libero, e vicino all'operatore, in modo che può esso comodamente introdurre la mano nell'utero.
- C Avanti al letto da ambe due le parti segga un astante sopra uno sgabelletto, e ciascheduno di essi riceva in grembo un piede della partorientente, con una mano tenga fermo il malleolo, coll'altra il ginocchio, e con somma diligenza tenga debitamente discosta la coscia.
- D L'altezza del letto sia tale, che permetta all'operatore, seduto sopra una bassa sediola, di fare liberamente le sue operazioni; poichè lo stare in piedi, o in ginocchioni verrebbe troppo a stancarlo.

§. 393. Quando si debbono cercare i piedi posti sopra le ossa del pube nella parte anteriore del basso ventre, o si deve spingere verso quella stessa parte il torace del feto, mentre i piedi seguitano il nastro al quale sono stati raccomandati, riesce comodo che la partorientente stia inginocchioni, col capo sulle ginocchia di un'astante sedente in terra, e che l'operatore estrarra il feto per la parte posteriore della donna.

§. 394. Si ottiene l'altro intento, se

- A I lombi della partorientente si appoggiano ad un guanciale duro, e resistente.
- B Un astante tenga ferme le di lei spalle, acciocchè non si possano muovere nè in sù, nè in giù.
- C Qualora vi sieno più astanti, se ne ponga uno da ambedue le parti del letto, ciascuno de' quali con una mano tenga ferma la spalla dalla sua parte, e con l'al-

l'altra prenda la mano della partoriente, acciocchè
 non si muoverà non sia d'impedimento all'operatore.

Dopo l'Un terzo, tenga il capo della medesima
 §. 395. Pertanto è da per sé manifesto, che ad otte-
 nerfi questo fine moltissimo conferiscono,

A. Il letto descritto al §. 285, purchè si levino le afficel-
 le; vale a dire la inferiore scavata num. 3. e la ta-
 gliata num. 9. insieme coi guanciali minori num. 11.

B. Il letto estemporaneo di HOORN (§. 290.) è molto a
 proposito in mancanza di questo.

C. Si può ancora adoperare il letto di M. la MOTTE,
 quello di M. MESNARD, e l'altro di SCHLICHTZ, o al-
 tro bene accomodato.

§. 396. Le altre situazioni sono meno comode. Per
 esempio

A. La seggiola da partorire (§. 299.), e la staja sono
 troppo basse, ed obbligano l'operatore a stare inginoc-
 chioni, la qual cosa è troppo incomoda.

B. Posta la partoriente a traverso del letto comune, l'ope-
 razione si fa in vero comodamente, ma gli astanti con
 maggior difficoltà tengono ferma la partoriente.

C. Il situare la medesima sopra d'una tavola, non meno
 è contro la civiltà, di quello che debiliti le forze dell'
 operatore, che deve agire.

D. Le sedie ordinarie delle levatrici (§. 301.) e il letto
 di M. SIEGMUNDIN non sono da mettersi in uso in ve-
 runa maniera.

§. 397. Serve bensì alla civiltà, e al comodo dell'ope-
 ratore, se

A. Il lenzuolo che cuopre il letto stia pendente fino in
 terra

B. Si porre avanti il letto un vaso che riceva le im-
 mondezze.

C. Che un altro lenzuolo cuopra la partoriente fino ai
 piedi,

che

Che

- D Che l'operatore spogliatosi degli abiti d'impaccio, si premunisca contro le immondezze con un grembiale, o con altro panno, o copertura equivalente.
- E Tutto l'apparato degli strumenti sia pronto, ma nascosto agli occhi della partorientente.
- F Sieno preparate cose ristorative per la madre, e per il feto.
- G Ci si trovi un assistente pronto a porgere le cose necessarie.
- H L'operatore segga fra le ginocchia della partorientente.
- S. 398. L'operatore stesso prima di cominciare ad agire,
- A Provvegga al suo onore con un prognostico conveniente, e non deciso.
- B Sia cauto particolarmente nel predire un esito felice, quando l'esperienza non l'afficuri. Non si lasci ingannare dalla facile estrazione del feto, dallo stato tranquillo, e dall'animo forte e costante della partorientente.
- C Per ammollire, e per prevenire l'infiammazione delle parti genitali, le faccia un'emissione di sangue dal braccio; si applichino degli emollienti se v'è tempo da farne uso (vedi sopra S. 339. lett. B).
- D Si vuotino l'intestino retto, e la vescica dell'orina (S. 265. e seg.).

S. 399. L'operatore dallo stato dell'utero riconosciuto, giudichi se sia necessario l'affrettare, o l'indugiare. Quando l'utero è sano, niente vi è che stimoli ad affrettare, e l'operatore secondo le circostanze può concedere riposo a se e alla partorientente. Indicano poi un tale stato di sanità, la costanza delle forze della partorientente; l'introduzione facile nell'utero, per quanto può averfi in simile occasione; il polso cedente, ed eguale, e la pienezza mediocre del medesimo; la lingua umida, e di color naturale, ovvero pochissimo sbiancata, nè fosca; i denti umidi, il respiro buono e placido; l'estremità del calore naturale; vi sia facilità d'in-

ghiottire la bevanda ; e senza frequenti rutti ; abbia la pupilla dell'occhio mobile ; l'aspetto vegeto , e placido ; l'animo sollevato , senza stupidità , e avvilimento ; non senta calore nella parte inferiore del basso ventre ; e questo sia cedente , e non insensibile , nè doloroso ; il medesimo pure non tumefatto più di quello che comporta il tumore o mole stessa dell'utero ; i dolori del parto , o almeno del dorso , violenti , ma con intervallo ; la sensibilità perfetta delle parti genitali ; l'utero nel tempo dell'operazione non insensibile , ma dolente , e perciò cagione di strida nella madre ; le parti genitali non abbiano scolo di materia icorosa fetente ; lo sfintere dell'ano saldo ec.

§. 400. Allorchè vi sia qualche segno d'un'imminente infiammazione , e che il parto ritardi troppo , benchè il feto sia ben situato , manchino i necessarij dolori , e non vi sia fiducia sul ritorno di essi , non si differisca di passare all'operazione . I segni che annunziano l'infiammazione sono , le parti genitali gonfie ; la febbre , che per lo più sopravviene dopo il freddo , ed il tremito , la quale si conosce dal calore , e dal polso pieno , e frequente ; la debolezza , ed i sudori della partoriente ; la lingua coperta d'un mucco torbido ; il basso ventre dolente per una pressione benchè leggiera ; i dolori sul principio corti , e frequenti , che molestanto con molto spasmo la partoriente , di poi più tardivi , e che finalmente spariscono ; la cotenna del sangue cavato tenace , e gelatinosa ; il fetore , che esala dagli umori putrefatti nei quali è immerso il feto ; e la marcia che gronda dalle parti ec.

§. 401. Quando l'utero è molto infiammato , ed affalito di già da un principio di cancrena , l'operatore sappia , che la donna essendo in gran pericolo ha bisogno di un prontissimo ajuto ; e impari a conoscere questa necessità dalle forze abbattute , dalla cessazione dei
do-

dolori, dal duro tumore delle parti, dal polso debole e frequente, ma uguale, dalla lingua rossa, lustra, e coperta da una mucosità bianca, o alquanto fosca, e assai umida, dai denti egualmente umidi, e sordidi, dal fetore che esala, e dalla poca sensazione di dolore che prova la donna nell'operazione. Dopo il parto, restando tumido il basso ventre, venendo la febbre, e riscontrandosi una lassitudine di membra, la diminuzione dell'emorragia ec. sono segni mortali, ma l'operatore non ostante non l'abbandoni, perchè non di rado avviene che resti salvata.

S. 402. Se ai segni sopradetti, si uniscono l'insensibilità delle parti genitali; l'intollerabile fetore, e l'umore parimente fetente che scorre dalle medesime parti; il feto, e la placenta putrefatta, e nera; il freddo dell'estremità delle mani, e dei piedi, e della faccia, unito ad un sudore sparso per tutto il corpo; il tumore del basso ventre alquanto cedente, ma a poco a poco notabilmente aumentato senza dolore, e che per la forza dell'aria elastica rispinge la mano, che lo preme; la respirazione corta e piccola, che si fa a poco a poco peggiore; il polso piccolissimo, e che diviene di momento in momento più celere, finalmente intermittente; la sensazione sul dorso incomoda, simile a quella di una rottura, e maggiormente incomoda nei moti del corpo, e contraria al decubito; la paralisi de' piedi; una certa singolar tranquillità di animo, e stupidità, senza alcuna sollecitudine, o cura degli oggetti esterni, malgrado lo stato pericoloso in cui si trova; i frequenti rutti, e singhiozzi; lo spontaneo vomito di materia verde, e nera (S. 181.) l'inghiottire le bevande con del rumore; gli occhi torvi, e la pupilla molto dilatata, ed immobile al lume; le labbra pallide; i denti, le fauci, e la lingua arida; lo sfintere dell'ano rilassato; varj movimenti affannosi, anzi convulsivi; gli svenimenti; il sudore freddo della fronte, e altre

confimili cose dimostrano , che la donna è ridotta all' estremo per la cancrena già formata, e che vi è da temere la morte nell' atto dell' operazione ; perciò il Professore deve ricusare di operare, acciocchè non sia creduto aver egli ucciso la partoriente , la quale era impossibile di salvare.

§. 403. Sappia certamente il medesimo operatore,

A Che non si deve negare ajuto a nessuna partoriente, quando il caso non sia evidentemente disperato (si consulti il §. prec.),

B Che alle volte si può fare l' operazione senza farne consapevole la malata.

C Nell'atto dell'operazione s' armi di fermezza d' animo, e di pazienza, quantunque si presentino grandi impedimenti, e anche non preveduti.

D Non lasci la misera donna prima che il feto sia da essa estratto.

E Procuri di estrarre il feto intiero, benchè sia morto.

§. 404. Qualunque sia l' operazione da intraprendersi, osservi

A Nell'atto dell' operazione che la partoriente non si agiti con verun moto del corpo, nè con sforzi.

B Acciocchè la mano più facilmente penetri nelle parti genitali, la unga per di sopra con qualche materia grassa; non già unga la palma, o l' interno della medesima, perchè con essa asciutta più forte si tengono gli strumenti, o i piedi del feto; e già pur troppo è soggetta a divenire bagnata dagli umori che gemono dalle parti genitali.

C Se l' ingresso della vagina è troppo asciutto, si ammolli con qualche cola d' untuoso, e si taglino i peli in caso che imbarazzino.

D Quando il collo della vescica sia premuto dalla parte del feto che si presenta per modo, che la partoriente non possa orinare, si cerchi di rimuovere diligentemente l' ostacolo, affinchè si faccia strada all' orina; e se questo non

non basta, si estragga per mezzo della sciringa. In questa maniera si rende più ampia la strada, e si allontana il pericolo. L'impedimento però di urinare si dilegua bene spesso da per se, e naturalmente, allorchè l'operatore introduce la mano nell'utero.

E La mano si porti dentro l'utero, se vi è questo bisogno, col metodo descritto di sopra (§. 351.).

F Gli orifizj troppo angusti della vagina, e dell'utero si dilatino colla reiterata azione della mano, e con una nuova introduzione; se poi è rispinta dall'utero contratto dai dolori,

G L'operazione si faccia nell'intervallo dei medesimi, nel qual tempo l'utero è più rilassato, tanto nel caso di effettuarla colla sola mano, quanto coll'ajuto degli strumenti. Quando poi si tira fuori il feto, usate tutte le altre diligenze, l'ajuto dei dolori è molto utile.

H Gli strumenti dei quali si serve l'operatore si unghino leggermente con olio moderatamente caldo.

§. 405. L'operatore si può servire di quattro metodi per estrarre il feto, quando non può essere spinto fuori dalle ordinarie contrazioni dell'utero, cominciando dal mettere in pratica il più mite, e passando indi successivamente al più efficace, e forte.

I. Consiste il primo nel tirar fuori il feto prendendolo per i piedi.

II. Nel disimpegnare con gli strumenti il capo che si è presentato.

III. Nel mettere in pezzi dentro l'utero il feto, che non può uscire in altra maniera.

IV. Nel cavare il medesimo mediante il taglio dell'addome, e dell'utero.

Di queste operazioni però ne discorreremo in appresso.

§. 406. Tosto che l'operazione è compita, il fanciullo, qualora sia vivo, si deve con tutta diligenza esaminare, e si deve cercare di opporre rimedio a quei vizj che

che lo richiedono. Realmente queste operazioni, quantunque miti, e spedite, combinate essendo colla lentezza del parto, debilitano il feto; le più forti e lunghe per lo più lo ammazzano (§. 389.). I fanciulli partoriti prima del tempo sono per il solito deboli.

§. 407. Il fanciullo debole si deve subito ristorare; per il qual fine sono efficaci le seguenti cose.

- 1 Dal tralcio tagliato, prima che si legghi, si lasci uscire un poco di sangue, che equivale ad una emissione del medesimo. In questa maniera si libera il cervello, ed il torace da quell'abbondanza di sangue che vi si trovasse, e che vi potrebbe fare una funesta congestione.
- 2 Gli s'introduca un dito in bocca fino alle fauci, e con esso si cavi fuori quella mucosità che vi fosse ammassata. In questa maniera si rendono libere le fauci per l'ingresso dell'aria (§. 313.) e nel tempo stesso vengono sollecitate e stimolate al moto della respirazione.
- 3 Il fanciullo s'immerga in un bagno d'acqua calda, resa più corroborante con una porzione di vino, quando così piaccia, ovvero gli si cuopra il capo, il torace, ed il basso ventre con pezze bagnate di vino caldo, sopra le quali ne sieno poste altre asciutte, e parimente calde, ed il fanciullo sia tenuto in luogo e ambiente discretamente caldo.
- 4 La respirazione si promove in varie maniere, verbi grazia con la compressione delle narici, col soffiare in bocca; con lo stropicciamento aggiustato dei calcagni, per mezzo di spazzolette, o fetolini adattati a tale uso; folleticando le narici, e le fauci con una penna, con un odore grave accostato alle medesime, come quello che si produce da una cipolla tagliata, o un qualche spirito chimico; con succhiargli le mammelle; coll'introdurre dell'aria o del fumo nell'intestino retto; con premargli leggermente e continuamente il basso

ven-

ventre , e il torace , particolarmente se il fanciullo si tiene voltato sul suo ventre ; con spruzzargli in faccia e in bocca del vino , o dell' aceto.

5 Fatte queste cose si può maggiormente risvegliare , promovendogli il vomito , lo che si produrrà stillandogli in bocca di tanto in tanto dell' acqua calda con zucchero , o l' offimele scillitico , o del burro non salato .

6 Finalmente si ristabiliscono le forze con una moderata copia d' acqua mescolata con vino , e zucchero ; con brodi lunghi non salati , e dati alternativamente , finchè il fanciullo non sia capace di poppare .

Niente giova , anzi più tosto nuoce (si consulti num. 1.) se per ristorare il fanciullo lasciamo per troppo lungo tempo nell' utero la placenta col tralcio unita per anco al fanciullo , o avanti di tagliargli il cordone immerghiamo il medesimo fanciullo nel vino , o in acqua calda .

§. 408. Se comparisce con la faccia , e il capo enfiato per la contusione sofferta nell' escire , o cagionatagli dalla mano dell' operatore , o dalli strumenti ; come pure se avesse i piedi lividi , per l' impressione del nastro col quale si è tirato fuori dall' utero , gli s' involtino tali parti , o membra , in pezze inzuppate nel vino caldo , o in qualche liquore vulnerario . Si lasci escire ancora una o due once di sangue dall' ombellico (§. prec. num. 1.) . Con questi mezzi si rimedierà molto facilmente a tali inconvenienti .

§. 409. Suole alle volte ancora accadere , o per accidente , o per colpa dell' operatore , qualche frattura nelle membra del fanciullo ; per esempio

A Nelle mani , e nei piedi , allorchè si rivolta .

B Nel braccio , che essendo fuori sia stato violentemente tirato ,

C Nelle costole , quando venendo il feto per i piedi si prende per il torace , e facendo sopra di esso molta forza acciocchè si estrarra il capo .

Nel.

D Nella mascella inferiore presa per condur fuori similmente il capo.

§. 410. Queste forti di fratture si consolidano il più delle volte da per loro, ed in breve spazio di tempo, purchè una tal parte sia posta nella sua naturale situazione, e legata con fascia bagnata di vino caldo, o di altro liquore vulnerario, e si lasci in riposo.

§. 411. Facilmente ancora succedono nel fanciullo varie lussazioni, perchè sono meno profonde le cavità delle articolazioni, e molto lassi e deboli i legamenti. E ciò può seguire specialmente nei casi seguenti.

A Nel rivoltare il feto, i piedi, e le braccia si lussano con qualche rumore.

B L'obliquità del collo del femore, il quale è ancora cartilagineo, fa sì che facilmente si separi dal corpo dell'osso; e se non vi si rimedia prontamente, il fanciullo rimane zoppo.

C La mascella inferiore per lo più si lussa, quando si estraie il capo coll' introduzione delle dita nella sua bocca.

D La pelvi del fanciullo, formata di più pezzi, che si riuniscono per mezzo di cartilagini molto tenere, si sforma quando vien tirato per i piedi, ed una parte resta più d' un' altra ristretta allorchè sia tirato per un piede solo. Se si tarda a rimediarvi, il fanciullo rimane con una gamba più lunga dell' altra.

E Per la medesima ragione la spina del dorso si può incurvare verso l' una, o l' altra parte, se da una levatrice poco pratica si tira il braccio, o se uscito fuori, e l' altro restato dentro, venga nientedimeno tirato con violenza il tenero corpo del feto. Se la spina incurvata non si riduce immediatamente nella sua direzione naturale, un braccio resta più lungo dell' altro.

§. 412. Siccome queste lussazioni sono prodotte da cause leggiere, così si risanano facilmente, servendosi delle regole consuete, e senza indugio, per non dar

tem-

tempo alle parti di consolidarsi in quello stato . Per esempio ,

A La pelvi (§. prec. lett. D) si rimette al suo posto per mezzo di una fascia , colla quale si ferma alla spalla il ginocchio della gamba più lunga , e a poco a poco si tira in sù .

B La spina incurvata (§. prec. lett. E) si riacomoda , mediante l' avvoltatura di una fascia , e con l' ajuto della mano .

C A P I T O L O X V I I .

DEL PARTO DIFFICILE, E PRETERNATURALE, NEL CASO
CHE IL FETO SI PRESENTI COL CAPO .

§. 413. **I**l capo, presentatosi il primo, e disceso nella cavità della pelvi, molto frequentemente rende difficile il parto, che anzi non si può compire se non con l' arte, a cagione della sua mole, e di qualche infermità, e parimente mala situazione, e cattiva conformazione di altre parti del corpicciuolo, ovvero per gl' istessi inconvenienti appartenenti all' utero, alla vagina, ed alla pelvi, anzi provenienti ancora dalla stessa placenta, e dal funicolo ombellicale.

S E Z I O N E I .

DEL PARTO DIFFICILE E PRETERNATURALE
A CAGIONE DELLA MOLE DEL CAPO .

§. 414. **B**enchè tutte le altre cose sieno nel loro stato naturale, e l' utero ed il capo sieno nell' asse della pelvi; nondimeno la mole del capo, quando supera di troppo la capacità della pelvi, e delle parti genitali, rende il parto vizioso.

§. 415. La mole del capo può superare la capacità della pelvi, e delle parti genitali.

I. Se la pelvi, quantunque ben conformata, e proporzionata nelle sue parti, paragonata però col rimanente del corpo della madre si trova non essere nella giusta proporzione con il corpo di essa, mentre poi il feto è proporzionato alla madre (§. 12. lett. A).

II. Se il capo è ben proporzionato, ma i diametri coniugati della pelvi hanno qualche difetto (§. 12. litt. B e seg.).

III. Se la pelvi ha la giusta formazione, e proporzione, ma il capo è più grande del dovere.

IV. Se non essendovi difetto nella pelvi, le parti genitali sono troppo anguste.

V. Se i difetti del capo, e della pelvi, e delle parti genitali si trovano insieme combinati.

VI. Se altri vizj si uniscono ai descritti.

§. 416. Il capo è troppo grande,

A Quando eccede la giusta proporzione delle altre parti del corpo.

B Quando è mostruoso.

C Quando è sformato e cresciuto per idropisia.

§. 417. Se trovasi difetto nella pelvi, o nelle parti genitali, o nel capo, la condotta che si deve tenere in consimil caso di parto è sempre la medesima. Per negare l'esistenza di simili parti, a torto si addurrebbe l'ammirabile proporzione che osserva la natura nella conformazione delle creature: poichè i mostri, le parti superflue, le mancanti, gli orifizj chiusi o troppo aperti, dimostrano, che alle volte la medesima si allontana dalle regole ordinarie. E quali ostacoli non apportan' eglino all'operatore i feti idrocefali, e le pelvi mal conformate (§. 12.)?

§. 418. Sul principio in vero questo parto pare molto facile, se non che il tumore del ventre non cala, nè l'ori-

l'orifizio dell' utero discende secondo il solito . La bocca dell' utero siegue l' asse della pelvi , e si arresta nell' apertura superiore di essa ; si dilata ancora insensibilmente , per modo che viene ad occupare quasi tutta l' apertura della pelvi . Le acque spinte innanzi dalla violenza de' dolori formano una grossa vescica , la quale , essi dolori raddoppiando , finalmente crepa .

§. 419. Tosto che poi la vescica dell' amnio è rotta , i sintomi che comparivano da principio favorevoli divengono funesti . La forza dei dolori , che nel parto facile , è bastante a far discendere il capo nella vagina , in questo caso poco vagliono : poichè quantunque vengano dolori veementissimi , e frequentissimi , il parto si promove poco o nulla ; il capo si ferma , s' inchioda dentro la pelvi , si forma una vera paragonfosi , tocca e preme tutto il contorno della pelvi , anzi apparisce un corpo continovato con essa .

§. 420. I differenti gradi degli ostacoli si riducono comodamente a tre . L' intervallo poi del tempo impiegato nel parto , la discesa più lenta o veloce del capo , e la compressione più o meno forte del medesimo , il trattenimento che fa nell' apertura superiore , o inferiore della pelvi unitamente ad altri vizj del parto , e lo stato delle parti genitali , o sane , o indurite per motivo d' infiammazione , la grandezza dei dolori ec. costituiscono la differenza di questi gradi fra loro .

§. 421. Nel *primo grado* certamente tutto è nei limiti della moderazione , e il parto non si prolunga più di due giorni ; la rotonda e larga forma del capo a poco a poco si comprime , si allunga , e prende la forma di cono , in modo che può passare per la pelvi , con moto lento in vero , ma continuo ; il resto del capo coll' occipite cala dall' apertura superiore della pelvi nella vagina , e da questa nell' inferiore , e nel seno esterno ; il tumore che si forma nel capo del

feto vivo è piccolo (§. 380.) il sito dell' utero, e del capo poco o nulla è discosto dall' asse della pelvi; il tralcio non è punto avvolto intorno al corpo, e nessun altro vizio esiste nella corporatura del feto; le forze della partorientente si conservano vegete; ottimo è il polso, e in ottimo stato, e poco infiammate sono le parti genitali (§. 399. e 400.) e per conseguenza senza timore alcuno di cancrena, i dolori, benchè lenti, spingono avanti il capo sempre un poco più in ogni sforzo.

§. 422. A questo primo grado si possono per lo più ridurre i parti delle primipare, le parti genitali delle quali si dilatano più lentamente, e con più difficoltà, ed in esse con lentezza il capo di tondo divien lungo, benchè la pelvi ed il capo sieno nel loro stato naturale; allora ne nasce un idrocefalo esterno, che si manifesta da un tumore molle, e ondeggiante, che si presenta avanti il capo.

§. 423. Nel *secondo grado* la sola natura può terminare il parto, ma con esito funesto. La mole del capo supera molto la capacità della pelvi; tardissima è la discesa di esso nell' apertuta inferiore; si consumano più giorni prima di partorire; si richiede una pertinacia di dolori grandissimi per produrre l'allungamento del capo; nasce sopra al capo del feto vivo un gran tumore, somigliante ad un altro capo; le parti genitali s' infiammano molto per la contusione, cioè l' orifizio dell' utero, la vagina, l' uretra, e lo stesso seno esterno, e non di rado ancora si cancrenano; i dolori divengono più gagliardi, e più frequenti, la testa ancora, quantunque compressa, rimane molto grossa, ed è spinta con grandissima violenza; anzi alle volte l' uretra, ed il perineo è malamente lacerato con fiero spasmo; la donna rimane in seguito sempre soggetta all' incontinenza dell' orina, o degli escrementi; o almeno, a cagione di una molto forte infiammazione, che si comunica per
con-

consenso anche all'utero, il puerperio diviene molto pericoloso, e lentamente ritorna la forza all'uretra.

Tali cose succedono ogni volta che è grande la mole del capo, o che vi si aggiunge qualche altro considerabile ostacolo.

§. 424. Nel *terzo grado* il capo, o sia spinto da' dolori, o dall'arte, non può nella sua mole divenire minore delle aperture della pelvi, e per questo anche i più gagliardi dolori, egualmente che l'istrumento comprimente, divengono inutili. Questo grado è di due specie.

A Se le proporzioni della pelvi sono viziose nell'apertura superiore, il capo si arresta sempre sopra la medesima, ed occupa maggiore spazio della di lei circonferenza, o almeno la sommità dell'occipite discende nella capacità della pelvi, avendo formato un considerabil tumore.

B Tutte le medesime cose si osservano relativamente all'apertura inferiore, quando questa sia più stretta della superiore.

Le pelvi specialmente compresse (§. 12. lett. B seg.) e mal conformate, e gli altri ostacoli uniti, sogliono rendere pessimo questo grado.

§. 425. Quando si trovano le condizioni del primo grado (§. 421.) vi sono due partiti ai quali poterli at- tenere: uno cioè di rimettersi totalmente alla natura, l'altro di ricorrere all'arte. Coll'indugiare, e col lasciar operare alla natura, possiamo sperare un felicissimo esito. La forza lenta de' dolori comodamente apre le parti genitali, e spinge avanti il capo senza alcun pericolo, o della madre, o del feto; la piccola infiammazione che gonfia le di lei parti genitali, dopo il parto da se stessa svanisce, o cede ai moderati cataplasmi; il piccolo tumore ancora, che gonfia il capo del fanciullo, con egual successo e prontezza si dissipa (§. 408.). Pertanto non

vediamo che cosa in questo grado ci deva determinare a ricorrere all' operazione, e di servirsi della tanaglia, avendo osservato bene spesso che essendo stati chiamati ad assistere varie donne inquiete, e impazienti per la tardanza del parto, in capo ad un' ora, o due per sola opera della natura, e senza ricorrere a strumento veruno, hanno felicemente partorito.

§. 426. Frattanto coll' emissione del sangue, la quale qualche volta conviene rinnovare, l' operatore deve difendere la partorienti dall' infiammazione. La medesima deve ancora prendere cose diluenti, e si ristori con cardiaci (§. 341.) faccia sforzi moderati, acciocchè la natura meglio, e gradatamente possa condurre a fine la sua opera. Le parti già pur troppo naturalmente irritate, non si devono certamente irritare con molto riscontro, nè con soverchio brancicamento di mano.

§. 427. Tosto che il capo scende nell' apertura inferiore della pelvi, questa si rende più ampia con i mezzi da insegnarsi in appresso (§. 497.) acciocchè si faccia al capo una più comoda strada.

§. 428. Vi sono però de' casi ne' quali conviene terminare il parto colle tanaglie. Molti Professori celebri de' nostri tempi, e singolarmente di quei paesi, e città, nelle quali frequentemente si brama l' ajuto de' medesimi nel parto lento, anzi in qualunque, hanno per costume di liberare subito la madre dall' incomodo, e di provvedere al proprio onore e fortuna coll' uso delle tanaglie, le quali tanto più sono adattate per la gloria del Professore, quanto è più mite il grado di cuneazione, o inchiodamento. Le tanaglie in vero spediscono l' operazione, comprimono il capo, allungano quanto conviene il volume del medesimo, dilatano le parti genitali, e tirate dal Professore secondo le leggi dell' arte, suppliscono alla lenta azione de' dolori. Così senza dubbio è chiaro come si possa addurre, e con-

verità ancora esaltare un gran numero di operazioni, fatte felicemente colle tanaglie nello spazio di alcuni anni dal medesimo Professore. Noi però crediamo essere utile il non fare questa operazione alla partorientente, quando non la richieda la necessità, e crediamo ancora in qualunque paese non esser lecito ai Professori di usare con tanta facilità gli strumenti, e le tanaglie, le quali non sono esenti da qualunque inconveniente. Le parti genitali dilatate a poco a poco dal capo, premute graduatamente dalla forza de' dolori naturali, soffrono meno, che dalla tanaglia, e dal capo tirato con essa. Il capo del feto è esposto ancora a maggiori pericoli per la compressione della tanaglia, che per quella che può venirgliene dai predetti dolori.

§. 429. Si farebbe male certamente se nel secondo grado, quando il progresso del parto è lentissimo, stessi oziosi fino ad aspettare la forte infiammazione delle parti, che è pericolosa. In questa specie ancora fin tanto che vi è speranza di ulterior compressione nel capo, e le parti genitali non sono turgide per causa d'infiammazione, si può con le tanaglie tirare il capo, facendo discreta forza sopra di esso, essendo già allungato. Se si possa ricavare qualche utilità per parte della compressione prodotta dalla tanaglia, si conoscerà dal minor tumore del capo, e dalla rotondità del medesimo con pochissima acuminatezza nell'occipite, lo che è un indizio sicuro che la pressione de' dolori, qualunque di lunga durata, non è stata efficace a bastanza per comprimere esso capo e ridurlo conico.

§. 430. Se poi il capo è di già allungato, se l'occipite è molto avanzato, se gli ossetti del cranio sono tra loro sovrapposti, se vi è nel capo un gran tumore, senza fondamento speriamo una ulterior compressione, o dalla natura, o dall'arte; imperciocchè chi potrebbe darsi ad intendere essere senza limi-
te

re la mutazione della figura nel capo, la mobilità delle parti, e l'estensione delle piccole membrane, che uniscono gli ossi del cranio? Anzi il capo compresso talmente resiste ad un'ulteriore compressione, che se ostinati in questo stato lo prendiamo colle tanaglie, e lo tiriamo, le tanaglie stesse si sformeranno, o si romperanno più tosto, che il capo si riduca in una mole minore. Se poi comprimiamo di più il capo, questa grandissima pressione guasta l'organizzazione del cervello, ed uccide il feto: come ancora suole accadere nello stesso parto prolungato e laborioso, nel quale il capo resta compresso dentro la cavità della pelvi.

§. 431. Si può certamente aver ricorso alla tanaglia, allorchè il capo permette ulterior compressione, le parti genitali sono sane, e non rigide, o immobili per causa d'inflammazione, e non serrano violentemente esso capo. Chi mai introdurrebbe le tanaglie quando o la bocca dell'utero, o la vagina fascia e stringe il capo come un guanto molto stretto, e il capo stesso a somiglianza d'un chiodo talmente è incastrato nella capacità della pelvi, che non è permesso d'introdurre fra esso e le parti genitali in modo alcuno neppure una tenta? Ciò realmente non si può mai fare senza lesione di esse parti genitali, o della testa del feto. Molto peggio è ancora quando si tiri fortemente in giù le branche dello strumento, tutte le volte che le parti genitali, che serrano il capo, sono già gonfie, e rigide, per motivo d'inflammazione, e minacciano cancrena. Possiamo in questi casi spingere le branche delle tanaglie, e tirar fuori il capo, ma si ferisce il medesimo, sebbene questo instrumento sia fatto apposta per conservarlo, laceriamo le parti genitali, e cagioniamo una mortal cancrena, o i danni riferiti nel §. 423. quando le circostanze sono meno critiche.

§. 432. Singolarmente fa d'uopo ricercare se il feto
fia

sia vivo, o veramente morto? Ogni volta che l'operatore è certo della morte del feto, specialmente quando non è sperabile un'ulteriore compressione del capo, e vi è una vera paragonfosi, ed una grave infiammazione, l'usare la tanaglia riesce pericolosissimo alla madre, perciò giudichiamo che allora senza indugio si debba aprire il capo collo strumento, per diminuire la mole di esso, e liberare la madre da quel peso con una operazione sicura, e per essa insensibile. Questa è un'ottima regola in quei paesi, nei quali si cerca l'aiuto del Professore molto tardi, nè si chiama se non passato qualche giorno, o quando il tumore infiammato delle parti genitali talmente stringe il capo, ridotto a forma di cono, che inutilmente si penserebbe all'uso della tanaglia; nelle quali circostanze ancora quasi mai il feto è vivo, avendo molto sofferto per la continova pressione, e per i tentativi che l'operatore suole aver praticato per estrarlo.

§. 433. Quando poi con qualche fondamento si spera che il feto sia vivo, il caso è più arduo, e si deve prendere la risoluzione a norma delle circostanze. Stimiamo che a tutte le altre operazioni si debba preferire quella nella quale si taglia il basso ventre, che si chiama Parto cesareo, ogni volta che ci viene accordato poterla praticare, poichè può conservare la madre insieme ed il feto. Ma questa operazione non è senza pericolo; richiede che la madre sia in tutte le sue forze, e che sia di ottimo temperamento, nè si può fare senza il consenso della medesima partoriente, e de' parenti. Per la qual cosa è condannata in quei paesi, ne' quali si costuma chiamare il Professore tardi, e quando le forze della partoriente sono abbattute per la lunghezza del travaglio, e già è nata nell'utero l'infiammazione, le quali cose rendono questa operazione molto dubbiosa, tanto più che dalla

partoriente egualmente che dagli astanti, anche in circostanze tutte favorevoli, tale operazione si pospone ordinariamente alla morte, dal Professore annunziata, e fatta intendere come certa.

§. 434. Ogni volta adunque che il Professore non può fare il taglio cesareo, o deve lasciare la partoriente senza tale ajuto, ed abbandonarla alla sorte; la qual risoluzione non sarà presa mai da un uomo saggio, essendo essa fatale egualmente alla madre, che al feto; o sìvvero deve con lo strumento aprire il capo al feto, e quantunque vivo, che peraltro raramente lo è, deve sacrificarlo per la vita della madre: noi senza dubbio giudichiamo esser molto meglio che perisca esso solo, e non con esso la madre ancora. L'apparente crudeltà della risoluzione viene in gran parte mitigata dalla necessità. E chi non confesserà, che la tanaglia stessa è più pericolosa alla madre, ed al feto (§. 430.) dello strumento col quale si eseguisce la perforazione del capo nelle descritte circostanze?

§. 435. Tutte le volte che per l'effettuazione del passaggio vi è luogo alla compressione del capo, un simil parto si riferisce al secondo grado, perchè nel terzo grado non vi è speranza alcuna di favorevole esito, volendo far uso della tanaglia. Le circostanze poi sopra esposte decidono se si debba tagliare l'addome, o aprire il capo. La pelvi angusta, che effettivamente non ammette la mano dell'operatore, molto meno concede passaggio al feto, quantunque col capo compresso e assottigliato, perciò ella è una circostanza che indica la necessità dell'operazione cesarea. In questo parto la natura non somministra ajuto veruno, ma piuttosto la continovata pressione e gli sforzi abbattono le forze della partoriente, e inducono la cancrena nelle parti genitali.

§. 436. In qualunque specie di parto certamente sono nocivi e superflui i rimedj volgarmente giudicati espel-

espellenti (§. 337.) quelli inoltre che agitano , e irritano il sangue , sono in questo grado all' eccesso dannosi , poichè accrescono l' infiammazione , e cagionano spasimi nel basso ventre . Con i medicamenti locali emollienti poi si perde il tempo inutilmente . I soli strumenti tolgono la cagione del male , e con la compressione e attenuamento del capo del feto salvano la madre .

§. 437. Intorno all' uso degli strumenti , sieno poi questi tanaglie , o perforatorj , si osservino le seguenti cautele , oltre le dette di sopra nel Cap. XVI.

A Con gli strumenti uno si può impossessare della testa del feto più comodamente quando è giunta all' apertura inferiore , di quello sia quando si trova nella superiore ; perciò , se la natura del parto lo permette , l' operatore procuri di aspettare una tal discesa . Se il parto poi non permette questa tardanza , benchè ciò riesca di maggior fatica , si deve tirar fuori con gli strumenti il capo ; ma quando l' orifizio dell' utero sia aperto totalmente .

B L' operatore prenda con una mano lo strumento , e coll' altra lo conduca pel seno esterno , e per la vagina ; servendosi per guida quando faccia d' uopo , del dito indice .

C Prima d' introdurre lo strumento riscontri col dito la parte del capo sulla quale ei deve esso strumento appoggiare .

§. 438. Non ogni tanaglia è egualmente buona per tale effetto .

1 Quella lunga e liscia di GIACOMO RUEFFIO s' introduce meno comodamente , per avere le branche collegate , e i manichi piccoli , e per essere , come si è detto , diritta e liscia , non ferma , nè tiene quanto bisogna la testa . A questa si potrebbe anche riportare forse quella di SLEVI , di PUISSEAU , di FRIED , e di BURTON .

2 Le tanaglie adoperate dai Sigg. PALFYN , GILLES , LE DOUX , PETIT , GREGOIRE , SOUMAIN , DUSSE' , MESNARD , BING , RATHLAUW , e SCHLICHTING , ROONHUYSEN , hanno il comodo per l'introduzione, avendo le branche separate, o disgiunte, ma per la curvatura delle cucchiaie, per gli anelli, e per il modo col quale si riuniscono nelle branche, non lasciano di avere i loro difetti.

3 Altri migliorarono le cucchiaie, avendovi fatte delle aperture, e resa la curvatura proporzionata alla forma del capo. Senza dubbio di questa natura sono le tanaglie di CHAMBERLIN, di CHIAPMANN, di GIFFARD, di FREKESIO, di GREGOIRO, il figlio, e di LEVRET.

4 LO SMELLIE' perfezionò ancora di più la congiunzione delle branche, ed i loro anelli.

5 LEVRET ingegnosamente incurvò l'estremità delle cucchiaie traforate, e le rese più adattate alla forma della pelvi, e probabilmente da ciò ne sarà derivata la tanaglia del PUGHIO.

§. 439. Quando si deve tirar fuori collo strumento il capo dalla cavità della pelvi, fissato dietro all'apertura inferiore di essa, possiamo servirci di una tanaglia più piccola, e più corta, come è quella di SMELLIE' (§. prec. num. 4.) la quale, certamente

A Essendo nella sua lunghezza minore d'un piede con somma facilità si regola.

B Avendo i manichi grossi, e molto larghi, questi si prendono bene. Si possono anche fermare con un nastro, se così ci piace, nella loro incavatura, che rimane all'estremità de' medesimi; ciò peraltro non è assolutamente necessario per maneggiar questa tanaglia. Ved. Tav. XIII. Fig. 3.

C La semplice congiunzione forma facilmente la riunione, mediante i denti e l'incastro dei tronchi delle branche, senza detrimento della stabilità.

I cuc-

D I cucchiai forati, fatti con laminette sottili nell'estremità, e compresse, e che dalla congiunzione sono divergenti, formando un angolo curvilineo, prendono bene il capo, e lo premono, se sono lavorate colle dovute proporzioni. Preferirei sempre questo strumento nudo e unto con olio (§. 404. lett. H) al medesimo coperto con pelle benchè sottile.

§. 440. Se poi il capo deesi estrarre dall'apertura superiore della pelvi, le tanaglie corte e diritte non arrivano più in sù delle tempie del capo, nè in quel sito prendono il medesimo con stabilità e sicurezza; onde allora si debbono usar le tanaglie che abbiano,

A Branche più lunghe.

B Curve nell'estremità, alla maniera di LEVRET (§. 437. num. 5.) Ved. Tav. XIII. Fig. 2.

C Nel rimanente lavorate come le tanaglie (§. preced.).

Mancando però queste si prenderanno altre, quantunque di maggiore imbarazzo e fatica per l'operatore.

§. 441. Si osservi, intorno alla maniera di adoprare la tanaglia, quant' appresso.

1 S'introduca una branca dopo l'altra fino alla regione delle tempie.

2 La prima branca si conduca verso quella parte, alla quale il capo si appoggia meno, indi lentamente e con destrezza si conduca nella parte opposta, girando la circonferenza della pelvi che meno resiste. Si può ancora introdurla a dirittura nella parte più stretta.

3 In questo sito la branca o vi stà da se stessa, o si tiene da un'astante.

4 Dipoi l'altra branca s'introduca nella parte più larga.

5 Si habbia l'attenzione di accostare la cucchiaia della tanaglia più alla testa, che alle parti genitali, per timore di non recare ad esse offesa.

6 Ciascheduna di queste branche si porterà con direzione

zione obliqua fino alla regione del mento, lo che si conoscerà dalla lunghezza della parte, che è stata introdotta, e dalla mancanza di resistenza nello strumento. Le branche, quando si tirano, calcano da se stesse verso il perineo, se non sono introdotte a bastanza.

7 Le punte si dirigeranno per quanto si può verso la parte anteriore della pelvi; la congiunzione inclini verso il perineo.

8 Certamente le branche si fermeranno con arte nel luogo della loro unione, e si legheranno, se così piaccia, con un nastro forte.

9 Con una mano si prenderanno fortemente i manichi, applicando l'indice sul luogo dell'unione, coll'altra si respingeranno le parti genitali dilatate. Se un'assistente fa ciò, l'operatore con una mano prenderà i manichi, con l'altra i luoghi della congiunzione.

10 La donna si terrà ferma dai circostanti, acciocchè non venga dietro alle tanaglie quando si tirano.

11 L'operatore dovrà tirare le tanaglie, comprimendole fortemente, e girandole nel tempo stesso con moderazione, e destramente, come se fosse uno strumento da traforare (vale a dire come si farebbe con un fucchiello); in questa maniera le parti cedono meglio al capo, e allo strumento.

12 Primieramente si farà calare il capo, che trovavasi alto, nella capacità della pelvi, reprimendo nell'atto del tirare il perineo con quella parte stessa della tanaglia ove resta la sua articolazione.

13 Si tratterrà per qualche momento fermo per riprender forza, e per dare animo alla donna.

14 Se a caso le tanaglie si scoltino in tutto, o in parte dal capo, di nuovo le riapplicherà, e nuovamente le tirerà.

15 Continoverà a tirare seguendo l'asse della pelvi finchè l'occipite non sarà entrato nel seno. Fi.

- 16 Finalmente alzerà la tanaglia verso la sinfisi delle ossa del pube, e l'accolterà talmente, come ad un punto d'appoggio, finchè il sincipite, e la faccia non esca fuori dal seno esterno.
- 17 Se con sagacità in quest'operazione si manderà dietro alla testa più che sarà possibile il perineo (§. 311. lett. C) l'operazione riescirà sbrigativa.
- 18 Quando ci serviremo delle tanaglie curve (§. prec.) debbonsi introdurre per tal modo le branche, che l'estremità convesse, a somiglianza della pelvi, sieno appoggiate alla curvatura dell'osso sacro, le punte poi sieno dirette agli ossi del pube. Per la qual cosa se a caso si volesse condurre la prima branca dal lato più largo nel più stretto (num. 2.) si faccia che la parte convessa della tanaglia guardi nell'introduzione le ossa del pube, poichè condotta nel lato opposto da se stessa si volge verso l'osso sacro. Tutto questo però si farà colla dovuta attenzione (num. 7. e 16.).

§. 442. Quando le tanaglie non potranno comprimere e far forza sul capo per la di lui grandezza (§. 430. e 435.) si ricorrerà alla perforazione del medesimo, col metodo conosciuto e tenuto fino da MOSCHIONE, dando così esito al cervello, e diminuendo per conseguenza il volume del capo medesimo. Gli strumenti per effettuare tal cosa sono:

A In caso di necessità uno si può servire delle *forbici* grandi, e forti, colle quali si sfonderà il cranio, e dilatandone i manichi si renderà più ampio il foro che si è fatto. Non di meno sono più atte a far ciò quelle di BING, e di SMELLIE'. V. Tav. XIII. Fig. 4. Quelle curve di WALBAUM penetrano non solo nella parte molle del cranio, ma ancora sono capaci a tagliare gli ossi del medesimo.

B Lo scalpello, o qualunque altro coltello acuto, tanto
ta-

tagliente da ambe le parti, che da una sola, se non si dirige con somma cautela, facilmente offende le parti adiacenti, e suole essere troppo debole. Migliore assolutamente è per quest' uso il coltello inguainato.

C Gli strumenti *perforatorj* di MAURICEAU, e di MERNARD, benchè sieno più forti che non è lo scalpello, possono egualmente offendere le parti. Quello di SIMPSON offende la mano dell' operatore, e si maneggia con più difficoltà. A questa specie si può riferire l'*oncino a due punte* di ALBUCASI.

D I *trapani o perforatorj coperti* di DENYS, d' OULDIN, e di FRIED non possono offendere le parti vicine, essendo inguainati; e quando sono bastantemente forti, particolarmente se sieno forniti di molla come quelli di DENYS, e di OULDIN, aprono, e tagliano insieme benissimo il cranio.

E Quando il feto sia putrido si può alcune volte sfondare la fontanella molle e debolè col semplice dito.

§. 443. Acciò non si apportì veruna offesa s' introdurrà lo strumento, col quale si vuole effettuare la perforazione, nella seguente maniera.

A L'indice della mano sinistra si fermerà se è possibile sulla fontanella, o almeno fra lo spazio di mezzo alle due ossa;

B Colla guida di questo dito si porterà lo strumento nel medesimo luogo, e si condurrà con le sopradette cautele, acciocchè le parti vicine non restino danneggiate (§. 437. lett. B e C).

C Puntato che sia alla parte non ossea, ma membranosa, con forza vi si farà addentro penetrare.

D Introdotto lo scalpello, o il perforatorio, o il trapano coperto, si moverà per ogni banda acciò l'apertura venga a farsi maggiore. Le forbici ordinarie dilatano, quelle di WALBAUM tagliano.

E Col dito indice della sinistra mano si accompagnerà
sem.

sempre lo strumento dovunque si porti, e si terranno lontane le parti adiacenti della madre, che si potessero fare incontro.

§. 444. Siccome gli ossi della calvarie soprapponendosi gli uni sopra gli altri, possono chiudere l'apertura istata fatta nel cranio, si cercherà d'impedire tale inconveniente. Perciò

A Si spingeranno col dito gli ossi del cranio, che si presentano i primi; c'impadroniremo dei medesimi, prendendoli fra due o tre dita della mano, e si smoveranno da ogni banda per poterli tirar fuori. Con questo mezzo si renderà più ampia l'apertura.

B Altri consigliano a rompere, ed estrarre le ossa con una tanaglia piccola, e forte. Così inculcò IPOCRATE, ed ALBUCASI ci diede la figura di certe tanagliette, colle quali a suo tempo si metteva in pezzi il cranio del feto. Ciò può anche ottenersi colle tanaglie di SCHURER, di MESNARD, e di MITTELHAUSER.

C M. FRIED per ridurre in pezzi gli ossi del cranio propone una specie di sega.

D M. WAULBAUM per questo medesimo effetto loda le forbice di sua propria invenzione.

§. 445. Queste cose eseguite,

1 Spesso accade, che il cranio, venendo a restar compresso per la violenza de' dolori, prema il cervello, e lo faccia escire per la fatta apertura, e lo stesso capo pure sia mandato fuori come nel parto naturale.

2 Ma se i dolori sieno affatto cessati non si comunica alcun moto al capo, onde è necessario ricorrere ad altri ajuti dell'arte.

§. 446. Ecco quanto giova a fare in questo caso.

A In primo luogo si tenti se prendendo il cranio colle dita piegate a guisa d'uncino si possa tirare e comprimere la testa in modo da fare uscire il cervello.

B Riescendo vano questo artificio si cavi il cervello con la cucchiaja.

X

Se

- C Se con tutto ciò il capo non viene , si tirerà il feto per mezzo delle tanaglie.
- D L' azione delle tanaglie si rende più forte, se in quel tempo , che l' operatore tira le medesime, un' assistente abbia cura di comprimere, e tener fisse come devono stare le ossa del capo.
- E Quando il capo sia troppo estenuato e spianato, non si può prender bene colla tanaglia ; perciò se è possibile si disimpegnino le braccia del feto, le quali daranno tutta la facilità all' operatore per poter tirare, ed estrarre il medesimo.
- F Si tira ancora il cranio mediante un oncinio, introdotto nel gran foro dell' occipite, o nel margine frontale dell' orbita degli occhi. Può l' operatore nel tempo stesso prendere colle dita dell' altra mano uno degli ossetti del cranio, o tutto il capo, per fermarlo, o tirare un braccio, se a caso trovasi disimpegnato.
- G Ancora due oncini curvi, uniti insieme a guisa di tanaglia, si possono introdurre nel capo, e tirarlo; Tali sono gli oncini di MESNARD, e quelli corretti di SMELLIE. Ved. Tav. XIV. Fig. 1.
- H Tosto che il collo non è molto lontano dall' orificio esterno della vagina, l' operatore può prendere il capo o per la bocca, o pel mento, o per la nuca, e tirarlo fuori.
- I Può esso ancora, quando il capo è calato nel seno, con una mano reprimere il perineo, e coll' altra far saltar fuori il capo come una fava dal guscio.
- §. 447. Sono a proposito ancora altri generi di strumenti, quando il cranio sia diminuito.
- A MESNARD vuole che si estraiga il capo colle *tanaglie* da esso inventate. Io per altro credo che ciò appena si possa fare senza cagionare la frattura delle ossa del capo; e allora lo strumento perde la presa e diviene inutile.

B Il *tira-testa* di MAURICEAU , è stato riconosciuto molto ingegnoso ed elegante ; ma non vale parimente niente, perchè spezza il cranio ; quello di BURTON ha lo stesso inconveniente.

C Volendo introdurre il *nastro*, col fine di passarlo sopra il mento per tirare la testa, non si può questo eseguire senza uno strumento , che ve lo accompagni : con l'ajuto poi tal nastro ha qualche utilità.

S. 448. I soli *orcini*, se talmente s'introducano, che per la ferita fatta da essi il cervello esca in poca quantità, come suole accadere, o non esca punto, non diminuiscono la mole del capo. Se poi l'apertura di essi fatta manda fuori il cervello, si fa certamente il vuoto, per cui si può comprimere il cranio, e togliere la causa dell'impedimento ; nondimeno non producono sempre questo vantaggio, nè si applicano con tutta la sicurezza, e facilità, perchè scappando offendono la partoriente.

C A P I T O L O X V I I .

S E Z I O N E I I .

DEL PARTO DIFFICILE , E PRETERNATURALE

A CAGIONE DELLA SITUAZIONE OBLIQUA

DELL' UTERO.

S. 449. **Q**Uando l'asse longitudinale dell' utero non corrisponde all'asse della pelvi, l'utero si dice situato obliquamente : per la qual situazione nasce il parto difficile, e preternaturale, e perchè il capo del feto, il quale trovasi nel medesimo asse, e che è spinto verso la pelvi, incontra un ostacolo straordinario.

S. 450. Per lo più sono incerte le cagioni producenti

X² causa del parto obliquo

l'obliquità dell'utero . Nondimeno possiamo considerare ,

- A** La primitiva conformazione , la quale scosta l'utero dall'asse della pelvi verso un'altra parte , come ci fanno conoscere le osservazioni fatte sopra uteri di tal natura nelle donne giovani . Da ciò senza dubbio nasce una naturale disposizione al parto difficile di questa specie .
- B** Diversi vizj delle parti genitali , i quali abbiano scostato dall'asse della pelvi l'utero , specialmente disteso nel tempo della gravidanza . Tali vizj sono l'utero collocato tanto alto , che la cavità della pelvi non possa cooperare alla sua buona situazione . La viziosa figura della pelvi , particolarmente la troppa stretta , lo scirro dell'utero , la cicatrice , il sarcoma ec.
- C** In una donna che sia gobba l'utero si allontana dalla situazione naturalmente buona ; la pelvi si trova più alta in un lato che nell'altro , donde procede che nel tempo dei dolori il feto grandemente premuto dalla violenza dei medesimi tenda e vada a calare nella parte più bassa .
- D** La violenza cagionata all'utero dall'intestino retto , e dal colon per la sinistra parte , e dalla vescica urinaria , a motivo di quanto può in queste parti esser contenuto .
- E** L'attaccatura della placenta fuori del centro del fondo dell'utero , la quale fa che il corpo del feto sia collocato nell'opposta parte , e l'utero ivi più si distenda .
- §. 451. Alcune volte in vero questa obliquità è semplice , altre poi è unita con altri diversi vizj del parto , particolarmente colla strettezza della pelvi (§. prec. lett. B) nel qual caso il parto suol esser pessimo .
- §. 452. La medesima direzione obliqua dell'utero nell'atto del parto produce un effetto diverso da quello , che produce la retta , e principalmente sveglia quei *dolori* , che si chiamano *spurj* .

§. 453. Le cose contenute nell' utero , premendo nel segmento inferiore , svegliano i dolori del parto (§. 100.) Lo stesso accade quando l' utero è situato obliquamente. Siccome poi la direzione dell' utero non combina coll' asse della pelvi , nè l' utero stesso fa la minima resistenza per dirigere verso quest' asse l' effetto della sua contrazione ; questo effetto per conseguenza si deve spiegare in un luogo dove non vi sia resistenza , vale a dire verso quella parte della matrice che si trova compresa tra la pelvi , e la parte del feto che si presenta la prima . Il rimanente poi del segmento inferiore , che dalla parte del feto che si presenta non resta premuta , nè si assottiglia , vien dilatata meno , e più lentamente dell' altra . Pertanto è manifesto , che l' orifizio da questa contrazione dell' utero non si apre bene , nè l' utero è spinto nella vagina .

§. 454. Pertanto il dolore spurio si conosce ,

A Quando col dito introdotto in tal tempo non si può comodamente giugnere a toccare la vescica dell' amnio piena d' umore , nè il capo , nè qualunque altra cosa contenuta nell' utero .

B Quando l' orifizio del medesimo utero non si apre , e non si allarga bene secondo il solito , ma alle volte più tosto si ristringe .

C Quando l' utero col feto non discende nella vagina .

§. 455. La stessa sensazione ancora del dolore spurio è diversa da quella , che risveglia il vero .

A Imperciocchè il dolore vero incomincia nella regione de' lombi , e discende verso le parti pudende . Il dolore spurio non si stende tanto , ma gira intorno all' apertura superiore della pelvi .

B Il vero ancora è più veemente , e più acuto a cagione della ineguale contrazione dell' utero , e di una somigliante pressione della parte che si presenta . Principalmente il dolore tormenta quella parte verso la quale

quale è spinto il capo , stendendosi fino agl' inguini , ed alle cosce .

§. 456. Si osservano differenti gradi di obliquità dell' utero , perciò , secondo che la porzione del capo che riguarda la vagina è maggiore , o minore , ne nasce un differente esito de' dolori spurj .

§. 457. Quando l' asse dell' utero continuato cade dentro la vagina , e una porzione del cranio maggiore della metà riguarda la vagina , i dolori spurj a poco a poco si mutano in veri . Imperciocchè la successiva contrazione dell' utero , premendo il capo contro le ossa della pelvi , assottiglia a poco a poco la maggior parte del margine del di lui orifizio ; onde il resto indebolito resiste così poco , che finalmente dalla contrazione del corpo dell' utero è superata la resistenza , si assottiglia il margine , il capo si deprime , nascono i dolori veri , il parto si promove , e si compisce .

§. 458. Che se poi l' asse continuato va a terminare sopra il margine superiore della pelvi , e una porzione del capo minore della metà riguarda la vagina , contraendosi l' utero , il capo è successivamente spinto di più nella pelvi , l' orifizio dell' utero più si ferra , e il parto non si compisce in nessuna maniera coll' ajuto della sola natura .

§. 459. Si osserva che questo male può terminare in due maniere .

1 Ritorna l' equilibrio dell' azione dell' utero ; si diminuiscono i dolori , e affatto cessano , l' utero compresso dal peso del capo s' infiamma , il feto muore insieme colla madre , ovvero si risolve in putredine colle membrane , e allora ha esito a traverso di un ascesso .

2 In tale occasione la forza de' dolori non si mitiga , il capo è premuto contro l' utero , la sostanza di questo si assottiglia , e finalmente si rompe .

§. 460. Allorchè l' asse dell' utero è diretto verso il
bor-

bordo superiore del bacino, o sia della pelvi, in modo che si possa solamente toccare intorno la metà dell'orifizio, e che la testa forzi egualmente sopra l'orlo dell'una, e dell'altra banda, le cose restano senza avanzare in quello stato, e la testa non può portarsi nè innanzi, nè indietro, e finalmente i dolori, venendo a poco a poco a diminuire, del tutto cessano.

§. 461. Il parto in questo stato di cose può avere tre esiti diversi.

1 L'utero compresso tra il cranio e la pelvi s'infiamma, e muore il feto insieme colla madre.

2 Se l'asse dell'utero si muove verso la vagina, accade il parto descritto al §. 457.

3 Se il medesimo asse sale, tende colla sua direzione più alto che non è il bordo dell'apertura superiore della pelvi, e ne segue la specie del parto descritto al §. 458. e 459.

§. 462. I *dolori del ventre* nati dalle cagioni accennate di sopra al §. 266. e che sono da mitigarsi con l'appropriato e parziale loro metodo, non si devono confondere coi dolori veramente spurj, poichè quelli non cagionano alcuna mutazione nel corpo dell'utero, e suo orifizio, non attaccando realmente esso utero. Laonde

A Nel tempo che tormentano miserabilmente la partoriente, posta la mano sopra il basso ventre si trova l'utero molle, e rilassato, il quale, quando è contratto dal dolore del parto, diviene stirato, rigido, e duro a somiglianza di una pietra (§. 178.).

B Alle volte questi dolori del basso ventre ostinatamente occupano un solo luogo, altre girano.

C Il polso da quelli non è alzato, ma piuttosto è contratto.

D La faccia non si accende.

E Nè la partoriente è stimolata a sforzarsi.

Alle

F Alle volte la diarrea che sopraggiunge, più chiaramente dimostra la natura e origine degli accennati dolori.

§. 463. Alle volte ancora si osserva una varia vicenda di dolori, talmente che si risenta ora un dolore spurio, ora un dolore simile ai veri, che deprima il feto, ed ora un dolor colico, quale tormenta la donna. Questa variazione produce *i dolori misti, o equivoci*.

§. 564. Nel tempo in cui la partoriente è tormentata dai dolori spurj, o dai dolori colici, non deve fare sforzo veruno; mentre ella non farebbe altro, che perdere inutilmente le forze. Tosto che poi i dolori spurj si cangiano in veri, giova che la partoriente coi suoi sforzi gli accompagni, e gli promova.

§. 465. Ma a bastanza si è parlato de' dolori spurj; onde torniamo a parlare dell'obliquità dell'utero, la quale si può conoscere dai seguenti segni più generali.

A Nel tempo della gravidanza.

1 Il basso ventre della donna gravida sollevasi più, e più resiste nella parte occupata dal feto, che nell' opposta, la quale contiene la placenta, onde il basso ventre è meno prominente nel mezzo, anzi alle volte si sentono due tumori uno maggiore, e l' altro minore, e fra questi rimane uno spazio depresso.

2 La donna ivi sente maggior gravezza, ed ivi si fa più vigoroso e frequente il moto del feto. Alle volte ancora dalla parte ove posa il feto sono più gravi gl' incomodi, ed accidenti accennati al §. 153. come farebbe l'enfiagione dei piedi, le varici ec.

3 L' orifizio poi dell'utero riman voltato alquanto verso la parte opposta: si guardi perciò il Professore, mancando della giusta cognizione dell' asse della pelvi, di credere obliquo l' utero per essere soltanto voltato con l' orifizio all' indietro.

4 L' apertura esterna dell' orifizio rimane chiusa, stretta,

ta , e grossa per più tempo , che quando l' utero è situato nell' asse della pelvi.

§. 466. B Avvicinandosi il Parto,

1 La testa arrestata da un ostacolo osseo , poco può scendere per conseguenza nell' apertura superiore della pelvi , ed impedisce che il basso ventre possa calare (§. 176.).

2 Laonde con maggiore difficoltà la levatrice può arrivare il capo del fanciullo .

§. 467. C Nello stesso parto,

1 I dolori spurj , a norma del grado dell' obliquità dell' utero con più frequenza e forza assaliscono la partoriente (§. 453.) .

2 La vescica dell' umore dell' amnio , la quale nella situazione retta dell' utero è corta , e largamente distesa , rappresenta comunemente un segmento , o porzione di una grossa sfera ; ma trovandosi l' utero in un maggior grado di obliquità , pende assai lunga , meno distesa nella larghezza , ed alle volte rassomiglia un intestino pendente dall' orifizio dell' utero : anzi alcune volte è spinta affatto fuori della vagina , e ciondola fuori delle parti esterne a foggia di una pera . Questa vescica prendendo la configurazione dell' apertura , o spazio uterino , deve esser larga , e circolare , allorchè l' utero è diritto ; perchè la testa , riempiendo allora tutta l' apertura superiore della pelvi , impedisce che l' umore dell' amnio scenda in gran copia , e questo rende la vescica più corta . Quando poi l' utero è situato obliquamente , l' umore dell' amnio è spinto verso quel lato in cui si trova minor resistenza , ivi si aduna , e la suddetta vescica prende una figura bislunga .

3 Per la stessa ragione questa vescica si rompe più presto del dovere , e si versa l' umore contenuto . Imperciocchè le fibre delle membrane essendo distese non solo da una forza ineguale , ma ancora eccedente , e

spesso premute contro le ossa, non possono certamente resistere, ma cedono alla forza che le distrae.

4 Dopo il primo sgorgo del fluido dell' amnio, seguita questo a sgocciolare anche in appresso, non essendo impedito dal capo, che si presenta, e che non anche tura o sigilla tutta la superiore apertura della pelvi.

5 Versato poi questo umore non rimane quasi cosa alcuna che possa stendere ed estenuare il segmento inferiore dell' utero, e farlo scendere nella vagina; e l'azione dei dolori non effettuandosi secondo la direzione dell' asse della pelvi, l'orifizio dell' utero non si dilata che lentamente (§. 457.). Per il solito nel caso in cui la testa viene innanzi, il primo a dilatarsi è quel margine, o bordo, sopra del quale ella preme, l'opposto poi che meno è premuto rimane più duro, gonfia, e gradatamente soffre le mutazioni del primo.

6 Per tal cagione il capo scende lentamente, dimora più lungo tempo sopra la pelvi, e più difficilmente si tocca col dito.

7 Quando ancora il capo incaglia, e si trattiene in uno dei due lati, non tura tutta la pelvi, e perciò lascia nell' opposta parte uno spazio vuoto in modo, che tra il capo, e le ossa della pelvi si può frapporre tutta la mano, o almeno alcune dita. Da questo spazio ancora esce fuori qualche volta il tralcio.

§. 468. Il tumore che formasi nel capo del nato fanciullo dopo un parto laborioso non occupa il mezzo del vertice, o dell' occipite, come succede quando l' utero è dritto, ma bensì si forma in quel lato che puntò e restò forzato contro le ossa della pelvi.

§. 469. Gli accennati fenomeni generali si possono applicare a tutte quante le diverse specie di obliquità; tutte quante però si possono considerare e ridurre sotto le quattro specie seguenti.

1 Quando l' utero è obliquamente situato verso la parte anteriore del corpo della madre. Ver-

2 Verso la parte posteriore.

3 Verso il lato destro.

4 Verso il lato sinistro.

Fra queste quattro specie vi sono le intermedie.

§. 470. Quando l'asse dell'utero prolungato forma coll'orizzonte un angolo più acuto, che l'asse della pelvi, e che il suo fondo per conseguenza è portato troppo in avanti; da questa situazione ne nascono principalmente i seguenti fenomeni.

A L'Addome diviene voltato, e pendente sopra le ossa del pube, e tanto, fino ad avanzarsi a riposare sopra le cosce della donna stando essa a sedere, la qual cosa cagiona alla medesima un incomodo peso.

B Gl' ipocondrij meno tesi, e meno ripieni.

C Il capo del feto rivolto verso l'osso sacro.

D L'orifizio ancora dell'utero guarda l'osso sacro.

E Il medesimo si sente difficilmente, e non senza alcune volte l'introduzione nella vagina di tutta la mano. L'introduzione poi del dito nell'orifizio è molto difficile, e soltanto vi si può condurre e introdurre torto.

F In un grado di obliquità grande, per la compressione della vescica, ne nasce la soppressione o l'incontinenza dell'orina.

G L'occipite è spinto verso l'orifizio; perchè la sommità della testa, essendo premuta contro l'osso sacro, l'impulso dei dolori, quando il feto è ben situato nell'utero, fa scendere l'occipite.

Le accennate cose meglio si conoscono sullo stesso principio del parto, prima che i dolori abbiano mutato lo stato delle parti.

§. 471. Quando l'asse prolungato dell'utero forma coll'orizzonte un angolo meno acuto di quello che forma l'asse della pelvi, allora il fondo dell'utero sale più in alto verso il torace.

A Il fondo dell'utero volta in maniera verso il dia-

framma, che la elevatezza del basso ventre si manifesti molto alta, ma meno prominente in fuori, o sia più spianata.

B Il ventricolo poi, ed il diaframma resta compresso, e viene impedita la digestione, e la respirazione; perciò verso il termine della gravidanza nascono dei vomiti maggiori, difficoltà di respiro, e particolarmente la inspirazione più corta, e fitta.

C Il capo premendo contro le ossa del pube, e pigliando l'uretra, cagiona la soppressione dell'orina.

D La regione del pube si trova tutta tesa, ed elevata, a motivo della pienezza che vi produce il capo, e la vescica: e pigliata che sia duole ancora molto sensibilmente.

E L'orifizio dell'utero facilmente si tocca.

F La fontanella si presenta alla bocca dell'utero in vece dell'occipite.

§. 472. Questa specie di obliquità nasce specialmente dalla tuberosità dell'osso sacro troppo vicina alla sinfisi degli ossi del pube, e dalle vertebre de' lombi piegate verso la parte posteriore, unendovisi molto frequentemente l'angustia della pelvi, e l'obliquità laterale.

§. 473. Questa medesima specie di situazione, in circostanze d'altronde eguali, è peggiore della precedente, come la struttura della pelvi, e l'esperienza lo dimostrano. Perchè

A Per poco che la testa si porti obliquamente indietro, ella è forzata sulla superficie interna dell'osso sacro, lungo il quale ella scende, seguitando un piano inclinato alle forze impellenti, ella rispinge il coccige, e cala da se stessa.

B Se poi ella è diretta verso la parte anteriore, allora è spinta contro il margine delle ossa del pube, e niente più ella può scendere.

§. 474. Quando l'asse dell'utero guarda l'uno, o l'altro osso degli ilei, il capo è rivolto verso uno di questi

sti ossi, il fondo poi è diretto verso l'altro, donde ne risultano i fenomeni generali descritti al §. 465. e seguenti, se non che alle volte i vasi, ed i nervi di quel lato, su cui posa la mole dell'utero, talmente sono compressi, che nasce la stupidità del piede, lo zoppicare, l'enfiagione delle glandule inguinali, lo spasimo della coscia nell'atto del parto, e altri simili mali.

§. 475. Raramente poi la testa si volta verso il mezzo appunto di qualcuno degli ossi ilei, ma ora si accosta più da vicino all'osso sacro, ora all'osso del pube, e per questo partecipa della obliquità verso la parte anteriore, o posteriore.

§. 476. La medesima obliquità quando è laterale ha i suoi particolari incomodi. Poichè

A Facilmente giù si porta il braccio. Per esempio se il capo sia premuto verso il fianco sinistro scende il braccio della spalla destra. Imperciocchè il braccio, come la parte più vicina, sia poi spinto dalla propria gravità, o dall'urto dei dolori, si porta in quello spazio che resta vuoto sulla destra.

B Il braccio calato impedisce affatto l'ulterior progresso del capo: imperciocchè chiude la strada, e reprime talmente il capo, che questo si ritira nel luogo meno resistente, cioè nella parte concava formata dagli ossi ilei; onde il collo è spinto nella vagina, si slunga, e in breve tempo il feto muore.

C Se questo non succede, ma bensì nella cavità della pelvi scenda il capo, questo è spinto contro l'ischio, e il braccio poi stando fisso all'osso degli ilei impedisce l'ulterior progresso del capo.

§. 477. La situazione obliqua lasciata senza soccorso dell'arte può avere un vario evento. Felicissimo avviene quando i dolori spurj, mutati a poco a poco in veri, mandano fuori lentamente il capo senza offesa (§. 457.).

§. 478. Se poi il grado maggiore di obliquità si accosta

sta al descritto nel §. 460. il capo certamente cala, ma dopo molto spazio di tempo: per la qual cosa la partoriente, ed il feto, soffre frattanto molti incomodi, cioè simili a quelli, che cagiona il capo troppo grande (§. 423.)

§. 479. Imperciocchè il capo spinto dai dolori urta nella bocca dell' utero, comprime le parti di mezzo, e le infiamma a segno di produrre non di rado anche la cancrena; lo stesso capo poi, se il feto è vivo, gonfia, e diviene di gran mole. Dal che ne succede, che la strada per due cagioni si renda angusta, si riempia, nasca una vera paragonfosi, e il capo non solo sia arrestato nell' apertura superiore della pelvi, ma ancora nella vagina, e perciò, spinto da uno sforzo più gagliardo dei dolori, lasci le parti contuse, o lacerate, e lo stesso feto nasca molto debole, o veramente morto.

§. 480. Quando l'asse dell'utero è diretto al contorno superiore della pelvi (§. 460.) nascono i sintomi descritti al §. preced. e l'esito è tale quale fu accennato al §. 461. Non solamente poi il cervello del feto si comprime dalla violenza della pressione, ma ancora il collo si slunga a segno, che s'interrompe il circolo del sangue nel capo; anzi alle volte si rompono gli stessi ossi del cranio,

§. 481. Il peggior grado di obliquità ha l'esito descritto al §. 459.

§. 482. Questo parto non si abbandoni mai alla sola natura, imperciocchè quantunque nel minor grado di obliquità si effettui finalmente dalla medesima natura, nulladimeno si può molto facilitare coll'ajuto dell'arte. Laonde giova immediatamente prestare questo ajuto, e diversamente, secondo la diversità del tempo, e dell'obliquità, che si riscontra.

§. 483. Acciocchè tutto questo riesca bene, l'operatore osserverà le seguenti cose.

I. Tutte le volte che si troverà ad assister la partoriente prima che abbia perdute le acque. De-

A Deve introdurre, e tenere sempre nella vagina avanti il capo due o tre dita, o più, secondo l'opportunità, e per mezzo di esse impedire alla testa d'avanzarsi, finchè da per se sieno uscite le acque.

B Allorchè sarà uscito l'umore, subito introdurrà tutta la mano nell'utero, appoggerà la palma al capo, il dorso poi della stessa mano alla pelvi, per quanto può libererà il capo dalle ossa del bacino, specialmente nel tempo dei dolori, e lo ricondurrà nella direzione dell'asse di esso bacino, o sia della pelvi.

C Se questo espediente riescirà bene, seguirà a fare lo stesso finchè il capo non sia uscito fuori; lo che certamente succederà alle volte ancora nel maggior grado di obliquità. Se la mano farà spinta indietro dalla forza dei dolori, immediatamente cercherà di rimettervela.

D Da un'istante si pigerà il basso ventre in quella parte che viene dal feto occupata.

§. 484. Quando poi il grado maggiore di obliquità rende talmente inutile questo artificio, ed il capo non possa avanzar punto, senza stare a perder tempo, conviene portare più in alto la mano, e prendere il feto per i piedi, ed estrarlo nella maniera che sarà insegnata in appresso.

§. 485. II. Se poi l'operatore arriverà dopo essere uscite le acque, e l'obliquità non ecceda punto la metà del capo;

A Un'istante parimente pigerà verso l'opposta, e conveniente parte il basso ventre (§. 483. lett. D.).

B Nella medesima maniera porrà la mano tra il capo, e la pelvi, talmente che al ritorno, e nella veemenza di ciascun dolore vero, approfitterà di tal tempo per ricondurre nell'asse della pelvi il capo, che puntava nelle ossa, e continuerà di prestare quest'ajuto fino a tanto che il capo non sia venuto fuori affatto. In questa congiuntura la mano di chi opera soffre molto venendo compresa fra due ossa.

Quan-

- C Quando la sola mano non basterà si disimpegnerà il capo con la leva, o con una branca della tanaglia dalle ossa, collocando lo strumento nel mezzo tra il capo e la pelvi (si consulti il §. 441.) in modo che nel tempo dei dolori la leva possa rispingere il capo nell' asse della medesima pelvi. La mano dell' operatore introdotta nella vagina potrà servire di punto d' appoggio alla leva, acciocchè la partorientente non soffra alcun danno. Da quest' azione della mano, e della leva, ne risulterà un' altra azione composta dalla forza de' dolori e da questa pressione, la quale spinge per la diagonale il feto, che discende in un piano inclinato. Questo si potrà eseguire per mezzo della leva di M. ROONHUYSEN. Ved. Tav. XIV. Fig. 2.
- D Qualora poi i dolori non faranno tanto efficaci, si potrà estrarre il feto con la tanaglia; ovvero quando il capo resti puntato verso uno dei lati, s' intruduca una branca sola della tanaglia dalla parte ove sta fisso il capo, e la mano dalla parte opposta, e così si prenderà, e si tirerà fuori il feto, facendo essa mano le veci dell' altra branca della tanaglia.

§. 486. Ma all' opposto senza alcuno indugio l' operatore cercherà di estrarre il feto per i piedi tutte le volte che il grado di obliquità è maggiore di quello accennato nel §. preced. nè mai si servirà in questo caso della tanaglia fuori che quando lo spazio si renda troppo stretto da non ammettere nell' utero altrimenti la mano; poichè in simili circostanze si perde in realtà più tempo che a voltare il feto, senza valutare che il farne uso è ancora pericoloso. La sola opera della mano non è mai sufficiente in questo caso per cavar fuori il capo, nè ancora l' aiuto della leva è molto utile.

§. 487. Questi artifizj riescono bene se in tempo si chiamerà il Professore. Al contrario quando da lungo tempo sieno uscite le acque, e l' utero ferri più gagliardamente il feto, e per conseguenza meno aperto il passaggio.

faggio, e il capo sia fortemente piantato contro le ossa della pelvi, non solo la natura indebolita non è sufficiente per se ad ultimare il parto, ma neppure vi è luogo a estrarre il feto per i piedi.

§. 488. Nel caso certamente che il tumore del capo, e delle parti genitali, non sia tanto considerabile da impedire che la testa cali nella pelvi, si potrà ricorrere con tutta la fiducia alle tanaglie per estrarre il feto.

§. 489. Quando poi accaderà che la pelvi sia troppo angusta, e il tumore del capo, e delle parti genitali cresciuto in maniera, da non potersi estrarre esso capo intiero senza una pericolosa contusione, e lacerazione di parti, o che non si possa estrarre onninamente, non rimarrà altro rimedio, che la diminuzione del capo, descritta nella Sezione precedente.

§. 490. Inoltre qualsivoglia specie di obliquità richiede certe particolari cautele. Per esempio se la testa è rivolta con la faccia verso l'osso sacro, e il parto per il resto non si discosti dal naturale.

A E' molto a proposito che un assistente sostenga con una mano il basso ventre della partoriente, per ravvicinare quanto è possibile l'utero all'asse della pelvi, e che lo tenga in questo stato fintanto che il parto non sia ultimato.

B Gioverà ancora far partorire la donna in situazione supina, posciachè in questa positura il fondo dell'utero per la sua gravità piomba sulla spina del dorso, e la testa del feto con la bocca dell'utero si solleva, e si scosta alquanto dall'osso sacro.

§. 491. Subito che la testa avrà passato l'angolo dell'osso sacro, si facilita il di lei ulteriore progresso coi seguenti mezzi.

A Acciocchè la partoriente faccia meglio, e con maggior

gior vigore i suoi sforzi, dalla situazione supina si deve rimettere nella consueta (1).

B Al ritorno di ciascun dolore, essa faccia i più vigorosi e possibili sforzi.

C Si spingerà indietro il coccige, col metodo da insegnarsi fra poco.

§. 492. Quantunque la testa abbia passato l'angolo dell'osso sacro, ella è ancora ciò non ostante obliqua in riguardo a quest'osso, ed avanza difficilmente. Succede ancora nel principio del parto, che la testa, la quale abbia poca obliquità, scendendo dall'angolo dell'osso sacro si torca, e si porti sopra il corpo del medesimo. Per restar persuasi di questo, si deve avvertire,

A Che il margine superiore degli ossi del pube è distante circa due pollici dall'inferiore, e che l'altezza dell'osso sacro dal suo angolo fino all'estremità dell'osso del coccige è di sei pollici; talmente che l'altezza posteriore supera per due volte l'anteriore (2).

B Onde può succedere, che il capo, il quale essendo inclinato verso la parte posteriore, si arresti sull'osso sacro medesimo quattro dita sotto l'angolo di quest'osso, indipendentemente dall'ostacolo, che esso riscontra nell'angolo medesimo.

§. 493. Questa stessa obliquità poi si conosce, allorchè

A La testa ha passato l'angolo dell'osso sacro, ed è calata nella cavità della pelvi.

B L'orifizio dell'utero successivamente si dilata a poco a poco.

C Nulladimeno si scuopre lo stesso troppo rivolto verso

(1) Vale a dire a norma della consuetudine, o positura tenuta dalla donna in altri parti, e secondo le ragioni, o circostanze, che possono essere stimolate opportune per meglio partorire o in letto, o sulla sedia, o in piedi.

(2) S'intenda cioè che l'altezza, o lunghezza dell'osso sacro, o parte posteriore e inferiore del margine è più avanzata, o più lunga di quattro pollici, che non è la parte anteriore o sia del pube.

so l'osso sacro, ed i sintomi che ne risultano (§. 470.) si riscontrano meno violenti.

D Il capo arrestato nella vagina, sebbene i dolori sieno grandi, si avvanza lentamente.

E Il perineo è spinto qualche poco per l'avanti.

F Il capo lascia un vuoto presso l'osso del pube.

§. 494. Sebbene l'utero sia situato nella direzione dell'asse della pelvi, s'incontrano tuttavolta nel parto gl'inconvenienti dei quali è stato parlato qualora il perineo e la vagina sono più angusti del dovere; perchè da ciò succede che il perineo lungi dall'essere spinto indietro dalla testa che scende, salga, e si sollevi in fuori a ogni doglia gagliarda.

§. 495. Le primipare singolarmente sono soggette a questa specie di male, poichè le loro parti non sono per anche state dilatate, e quelle fra esse maggiormente le quali partoriscono per la prima volta in età avanzata, a motivo che le fibre di tutto il loro corpo sono più dure, e resistenti.

§. 496. Si conosce poi dai seguenti segni.

A Il capo scende liberamente nell'apertura superiore della pelvi.

B Nella stessa maniera si avvanza fino all'inferiore apertura della medesima.

C Da ciascun nuovo dolore è spinto ancora fuori di essa pelvi.

D Ogni volta poi che il capo si avvanza, tira seco talmente il perineo, l'ano, e l'orifizio della vagina, che l'intero giro della sommità del capo del fanciullo sporge da queste parti fuori del corpo della madre circondato o vestito.

E L'ano soffre un prolusso maggiore del solito.

F La partoriente si lagna di fieri dolori, che risente in queste parti.

§. 497. Dubbioso è l'esito se l'affare si lascia alla sola

natura. Raramente in tal caso il capo esce senza inconveniente, o danno alcuno. Spesso addiviene, che i dolori crescano a segno di stendere, assottigliare, e rompere, o lacerare il perineo, fino ancora all' intestino retto; qualche volta ancora succede, quando la resistenza dell' osso sacro, del coccige, e del perineo è grande, che i dolori cessino, ed il capo si arresti.

§. 498. Perciò l' espediente migliore è di ovviare a simili inconvenienti, e di apportar rimedio avanti che il capo comprima il perineo, per modo che non vi si possa altrimenti introdurre nè la mano, nè le dita. Perciò a voler che le cose accadano bene,

- A Si collocherà la partoriente in maniera, che resti interamente in libertà il perineo, e l' osso del coccige.
- B L' operatore si ungerà tutta la mano con qualche sostanza pingue.
- C Introdurrà due, o tre dita di ciascuna mano nella vagina, anzi secondo l' opportunità farà penetrare la mano intera fra il capo, e l' osso sacro.
- D Prenderà il capo con la palma della mano, tenendo le dita distese con il dorso di essa mano appoggiato all' osso sacro, e lungo il coccige, e il perineo.
- E Nell' intervallo dei dolori le dita staranno ferme.
- F La partoriente farà delli sforzi più che potrà.
- G Il Professore tirerà il capo del feto con doppia azione, reprimendo cioè nel tempo medesimo il coccige, ed il perineo, ma lentamente, e con moderazione, acciocchè gradatamente si dilatino le parti genitali, e senza lacerazione, nè gran dolore per la partoriente.
- H La mano dell' operatore, se restasse spinta indietro per la violenza dei dolori, ei tornerà a rimetterla al suo posto nell' intervallo de' medesimi.
- I Si continueranno tutte queste diligenze, fino a tanto che il capo non sia venuto fuori.

§. 499. Se poi cesseranno i dolori (§. 497.) e il capo

A po si riscontrerà immobile nella cavità della pelvi ; Il Professore dovrà introdurre la sua mano, nella maniera affatto simile a quella indicata al §. preced. e per mezzo di essa disimpegnerà la testa dalle ossa , reprimendo il coccige , e il perineo . In questa maniera diminuita la resistenza , ed aggiunta una nuova irritazione la forza dell' utero ritornerà , e si accrescerà , i dolori ritorneranno con maggiore energia , ed il capo medesimo del feto , sempre diretto nella via dalla mano dello stesso operatore , finalmente escirà .

B Se con questi tentativi ancora non viene il capo , si estrarrà colle tanaglie , e nell' atto stesso , che l' operatore tirerà il capo , un' assistente reprimerà il perineo , e allargherà le parti genitali .

§. 500. Mi sia qui permesso , a cagione dell' aiuto così simile che si suole impiegare per rimediarvi , il parlare di un' altra specie di parto vizioso , il quale procede dall' osso sacro , e dal coccige alcune volte tanto piegato per l' indentro (§. 120 lett. D.) che la testa dopo esser scesa nella cavità della pelvi , venga arrestata nella sua apertura inferiore .

§. 501. Questo difetto dell' osso del coccige facilmente si conosce , mediante il riscontro . Il rimedio è lo stesso di quello descritto al §. 498. e 499. ; ma se il coccige fosse divenuto immobile , per essersi ossificate le sue cartilagini , onde non si potesse mandare indietro , o respingendolo non lasciasse tanto spazio da permettere l' uscita del capo , si deve in tal caso aprire il cranio ,

§. 502. Mi resta da dover considerare l' obliquità dell' utero , allorchè propendè sulla parte anteriore del ventre , o sia sulle ossa del pube , in modo che l' asse del feto prolungato non viene ad incontrare l' orizzonte , ma bensì gli resta parallelo , o da esso è divergente , la quale obliquità di tutte le altre specie è la peggiore . In questo caso il collo del feto incaglia , e si ferma sugli ossi

del pube, e le spalle fanno forza contro la parete anteriore di questi ossi. Questo stato di cose produce che il parto non avanzi, e i dolori premano più fortemente le spalle del feto contro le ossa di esso pube, mentre esse lasciano avanzare il collo. Il tronco ancora non può muoversi a cagione del dorso, che non può piegarsi. Per la qual causa il collo si allunga, il feto perisce, e la madre ancora è in pericolo, a cagione della contusione che soffre.

§. 503. Siccome, quando di fresco fieno escite le acque, è più facile d'introdurre la mano nell'utero, bisogna in queste circostanze cercare il modo di tirar fuori il fanciullo per i piedi. Ma questa operazione in vero è difficilissima a cagione

- A Della testa che chiude il passaggio.
- B Dell'angolo formato dall'utero, dentro il quale la mano introdotta non lo può secondare,
- C Della renitenza, o impedimento del capo. Imperciocchè quanto più si tira il fanciullo per i piedi, tanto più esso capo resta impegnato nell'apertura superiore della pelvi, e speso in modo, che non si può ultimare il parto con gli ajuti ordinarij.
- D Quando poi i piedi del feto sono piegati sul di lui dorso, è difficilissimo, anzi quasi impossibile il tirare i medesimi.

§. 504. Acciocchè meglio si possa fare questa estrazione, si devono osservare le seguenti cose.

- A L'operatore deve, per quanto è permesso, rimuovergli da quel posto il capo, che chiude il passaggio.
- B Con la sola mano deve condurre finchè potrà i piedi verso l'orifizio; ed in caso che trovi resistenza, deve legare con un nastro uno di quelli, o tutti due ancora occorrendo.
- C In questa maniera con una mano tiri il nastro, e con l'altra contemporaneamente rispinga dentro l'utero il capo, e il tronco del feto. Nel

C Nel tempo che si eseguisce tutto questo, un' assistente sostenga il basso ventre pendente della donna.

§. 505. Ogni volta che poi sarà passato lungo spazio di tempo dacchè l' umore dell' amnio fu perduto, e l' occipite impegnato nella cavità della pelvi impedisca alla mano il poter penetrare nell' utero, allora si deve estrarre il capo con le regole addotte di sopra alla Sezione I. L' operatore per altro sia cauto di non tirare sul principio dell' operazione il capo in giù, e di non impegnare di più le spalle con il collo; ma lo rispinga piuttosto indietro, acciò esse spalle si rendano più facilmente libere.

§. 506. Allorchè la testa è arrestata alle ossa del pube,

A La partorientente si farà sgravare dell' orina, o naturalmente, o per mezzo della sciringa, acciocchè la vescica distesa non riceva danno dall' impulso dei dolori, o dalla mano del Professore. Affinchè poi tal cosa riesca meglio fatta, per mezzo delle dita si scosterà dagli ossi del pube il capo che comprime l' uretra.

B Lo stare in piedi non giova alla partorientente, ma bensì deve giacere supina, acciocchè il capo non graviti, o forzi contro le ossa del pube. Mai la partorientente non dovrà esser consigliata a giacere sul ventre, perchè questa situazione non è capace a poterli sostenere.

C Nel medesimo tempo che l' operatore, con una mano introdotta nella vagina, libera il capo dalle ossa del pube, coll' altra rispinga esso capo, applicandola esternamente sopra il pube.

D Tosto che il capo è liberato dalle ossa, la partorientente si deve rimettere in quella situazione ad essa solita, acciò possa più fruttuosamente fare quegli sforzi, che sono allora necessarij.

E Acciocchè l' uretra, e la colonna superiore delle rughe vaginali restino meno offese, si frappongano dall' operatore due, o quattro dita aperte fra le ossa del pube,

pube , ed il capo , per modo che l' uretra stessa , e la detta colonna superiore delle rughe vaginali venga a rimanere in mezzo ad esse dita .

§. 507. Quando il capo sarà diretto verso l' uno o l' altro dei lati , si procurerà , tosto che questo sarà uscito , di liberare dall' apertura superiore della pelvi , le spalle arretrate .

C A P I T O L O X V I I .

S E Z I O N E I I I .

DEL PARTO DIFFICILE , E PRETERNATURALE
PER CAUSA DI PESSIMA SITUAZIONE DEL CAPO .

§. 508. **B** Enchè l' utero sia nell' asse della pelvi , non-
dimeno il capo che si presenta può avere delle situazioni viziose . Le medesime situazioni ancora si uniscono alle volte coll' obliquità dell' utero , e col vizio della pelvi .

§. 509. I. Primieramente si osserva , che la *faccia* , la quale nel parto facile deve riguardare l' osso sacro , è diretta *verso le ossa del pube* .

§. 510. Non si può dubitare che da una simile situazione non sia per nascere un parto difficilissimo . In fatti affinchè l' impulso dei dolori , che comincia dalla contrazione del fondo dell' utero , si propaghi per lo stesso corpicciuolo del feto fino all' orifizio , è necessario per quanto è possibile che il medesimo sia della massima forza , perchè la testa , che è appoggiata al petto , e che forma una larga base , sia spinta verso l' orifizio dalla forza riunita dei dolori , e che questa forza si stenda lungo le vertebre del collo , e per il petto . Ora se la faccia riguarda le ossa del pube , l' impulso dei dolori rimuove
il

il capo dal petto, e lo rispinge verso il dorso; la qual cosa fa sì, che la forza dei dolori non si comunichi alla testa, che per mezzo delle vertebre del collo, che fanno una colonna molto stretta, e tutta la forza dei dolori che si consuma nel tronco del corpicciuolo riesce inutile, se non si eccettua quella che si diffonde per la serie delle vertebre.

§. 511. Nondimeno questo parto alla fine, se sia semplice, vien terminato dopo lungo stento dalla solazione della natura.

§. 512. Non si può pienamente conoscere prima, che il capo sia uscito fuori. Tuttavia ne danno indizio,

A Il parto non avanzare quanto è solito di avanzarsi, quantunque l'utero si trovi in situazione retta, e i dolori sieno violenti, quando daltronde non v' interverga altro ostacolo.

B La fontanella essere più vicina alle ossa del pube, che quando la faccia guarda l'osso sacro.

C Mediante la mano introdotta e portata sulla faccia, in modo da toccare, e distinguere le orbite degli occhi, si conosce bene quale sia la situazione della testa.

§. 513. Allorchè la specie del parto è semplice, l'arte non vi ha luogo alcuno, e basta che la partoriente faccia valere, o ajuti le sue proprie doglie. L'operatore avverta però, che la faccia nell'uscire non riceva offesa dalle ossa del pube.

§. 514. Combinandosi l'obliquità dell'utero, il male diventa doppio; onde allora è meglio estrarre il feto per i piedi, che con incertezza riposare sulle sole forze della natura. Quando poi ciò non si possa fare, nel caso meno cattivo, si deve estrarre il feto colle tanaglie; nel più grave poi, a cui si unisce la vera paragonosi, si deve diminuire il cranio, facendo uscire il cervello. Il Professore prenda le tanaglie lunghe, e curve (§. 440.) ; perchè le corte, e le diritte prendendo sola-

mente l' occipite , facilmente lasciano la presa .

§. 515. II. Se in vece dell' occipite *si presenta prima la faccia* .

§. 516. Può nascerne danno dallo spasmo dell' utero , dalle convulsioni della madre , dal vomito , dalla tosse , colica ec. e dal soverchio manuale ajuto impiegato dalle levatrici .

§. 517. Se si fa il riscontro immediatamente dopo lo spargimento dell' umore dell' amnio , si distingue la faccia con molta facilità . Tutte le volte però che sarà passato lungo spazio di tempo , e che la forza dei dolori averà di già spinto il capo nella cavità della pelvi , tutte le parti gonfiano , e mutano talmente figura , che divengono difficilissime a distinguersi . Onde si richiede un più esatto riscontro , per mezzo del quale attentissimamente si vada indagando tutto il contorno della parte , che si presenta .

§. 518. Le differenziali attenenze , determinano se sia la faccia quella che si è presentata ; tali sono la fronte , gli occhi , il naso , le guance , e la bocca . Le parti poi contenute nella bocca , cioè la lingua , e le mandibule , ci danno i contrassegni più particolari della faccia , e ottimamente fanno distinguere l' apertura stessa della bocca dall' orifizio dell' intestino retto .

§. 519. Questo parto non si suol compire con tutta felicità . Imperciocchè per la ragione accennata al §. 510. la forza dei dolori non solo viene molto a mancare , ma ancora qualche parte della faccia , sia poi questa la fronte , il mento , o qualunque altra , è arrestata nell' apertura superiore della pelvi ; gli ossi della faccia non possono prendere la forma della pelvi , come quelli del cranio , quando l' occipite si presenta il primo ; poichè sono più duri , ed uniti senza membrane intermedie . Anzi questo parto benespesso non si può compire dalla sola natura .

§. 520.

§. 520. Quando si presenta la faccia, ella può prendere tre situazioni principali. Tuttavia se ne sogliono osservare altre diverse intermedie, che si debbono distinguere dalle principali.

La prima è, quando a cagione dei dolori improvvisi, ed immaturi, essendo ancora ben situato l'utero, *la fronte è trattenuta dall'osso del pube, il mento poi è diretto verso l'osso sacro*; il basso ventre del feto verso il dorso della madre; e il dorso di esso verso il basso ventre di questa: il collo resta slungato considerabilmente, e il feto è in pericolo.

§. 521. La forza dei più gagliardi dolori compisce questo parto, benchè lentamente, soprattutto se non è altro che una piccola parte della fronte, la quale impunti nelle ossa del pube, i dolori sono bastanti per farla calare a poco a poco nella pelvi.

§. 522. Se il Professore arriva subito dopo lo spargimento dell'umore dell'amnio, può apportare ajuto, ed abbreviare il travaglio, osservando quanto segue.

A Nell'intervallo dei dolori, avrà cura che la donna riposi supina, e senza fare alcuno sforzo.

B Introduca la mano nell'utero, e colle dita distese s'impadronisca del collo del feto, senza stringerlo, e respinga per quanto può le di lui spalle: in questa maniera la fronte si disimpegna, e da se stessa si scosta dalle ossa del pube, e si può facilmente far calare il capo nella pelvi, e metterlo nella direzione dell'asse.

C La riduzione nell'asse, e nel sito naturale, si fa col porre le dita, o la leva, tra l'osso del pube, e la fronte del feto.

D Fatto questo, la partorienti si rimette nella sua consueta situazione.

§. 523. Quando si trascura di respingere, e voltare il feto nella maniera stata detta, o troppo tirandolo; si corre rischio di apportargli offesa, ed in vano uno si

può lusingare di rimetterlo in buona situazione. Non si debbono perciò lodare quelli, che introducono al medesimo il dito nella bocca, mentre vi è tutto il rischio di lussargli, o rompere la mascella inferiore. Quelli poi, che passano all'altro inconveniente di prendere, e stringere il feto per la faccia, producono sopra di essa delle contusioni, e particolarmente cagionano offesa alla di lui vista, se lo comprimono negli occhi.

§. 524. Inoltre se l'utero è obliquo, ovvero se una maggior porzione della faccia è arrestata sopra l'osso del pube, in vano si tenterà di ridurre il capo nella situazione retta; perciò in questo caso si estrarrà il feto prendendolo per i piedi; ed essendo questo impossibile, si ricorrerà alla tanaglia: e quando l'angustia delle parti sia tale da non dar passaggio alla testa, sarà espediente in questa pessima circostanza di passare a diminuirne il volume.

§. 525. II. La seconda situazione è quando, a cagione del feto supino, e dei dolori subitanei, e anticipati, sebbene l'utero si trovi ottimamente situato, *la fronte è ritenuta dall'osso sacro, il mento poi è voltato verso l'osso del pube*: in questa situazione l'addome del feto è rivolto verso quello della madre, e il dorso di questo contro il dorso di quella.

§. 526. Qualche volta accade, ma con molta difficoltà, che la violenza dei dolori compisca questo parto.

§. 527. Quando il Professore arrivi in tempo, lo può facilitare nella maniera seguente.

A. Introducendo la mano nella vagina, con appoggiare il dorso della medesima sulla parte posteriore della vagina, o sia lungo l'intestino retto, e con voltar la palma verso il capo del feto.

B. Portando avanti la medesima mano fino alla fronte del fanciullo, e cogliendo il tempo del primo dolore, per deprimerla, e portarla verso l'osso del pube.

Se

Se ciò non potrà eseguirsi con l'ajuto della mano, si potrà effettuare colla leva.

§. 528. Restando inefficace anche questo artificio, ed il feto mantenendosi per anche vivo, si estrarrà potendo per i piedi, o sìvvero si dovrà estrarre per mezzo delle tanaglie. Se si abbiano poi dei segni della di lui morte, come principalmente si rileverà dall'immobilità della sua lingua, e non vi resti altra strada da tentare, potrà l'operatore insinuare due dita dentro la bocca del fanciullo quanto potrà, e piegandole a guisa di oncinio, se ne servirà per tirar fuori la testa.

§. 529. III. La terza situazione è quando *la faccia è posta a traverso*, cosicchè la fronte sia situata verso uno degli ossi ilei, e il mento verso l'altro. Qualche volta la fronte è isolata, il resto della faccia è voltata verso un osso degl'ilei, e l'occipite riempie la larga espansione dell'altro: questa positura si conosce facilmente, perchè riscontrando lo stato del parto, si presenta l'orecchio, il quale sicuramente si distingue per le sue prominenze, e cavità.

§. 530. Se il Professore giungerà in tempo, **A** Potrà far discendere nella cavità della pelvi colla leva la fronte, o l'occipite.

B Se il capo nel calare si porterà verso la parte anteriore, o posteriore, farà segno, che le spalle sono in una situazione laterale; in tal caso potrà lasciar operare alla natura, la quale ordinariamente compisce l'opera.

C Se poi le spalle faranno impegnate nelle ossa, produrranno il parto della specie descritta al §. 533. e seg.

§. 131. Se l'artificio accennato non riescirà, e se specialmente vi si unirà l'obliquità dell'utero, come frequentemente succede, senza tentare inutilmente la riduzione, subito tirerà fuori il fanciullo per i piedi, ovvero non essendo questo possibile, si estrarrà con la

la tanaglia ; non trascurando , quando il caso mal ridotto lo esiga , la diminuzione del capo .

§. 532. Quando con le dita *s'incontri la nuca* del fanciullo , si deve operare come appunto è stato insegnato al §. 501.

§. 533. IV. La quarta situazione è quando la sommità della testa , o sia il vertice , si presenta il primo , e l'utero stà nell'asse della pelvi ; ma *il feto è voltato in un lato* per modo , che la faccia guarda un osso dell'ischio , e una spalla stà sopra l'osso del pube , e l'altra sopra l'osso sacro .

§. 534. In questo caso certamente la testa entra bene nella pelvi , e senza veruno ostacolo , e cala senza impedimento fino all'orifizio della vagina ; anzi alle volte è spinta fino fuori di tale orifizio , ma dopo avere percorso questa strada , ella si arresta , ed i più forti dolori ancora divengono inutili , infiammano le parti , e poi cessano ; e questo alcuna volta succede non solo senza l'obliquità dell'utero , ma senza che si osservi neppure difetto alcuno nella testa . La situazione laterale sola della faccia non può cagionare i detti mali , ma bensì congiunta con quella delle spalle poste sopra gli ossi del pube , e sopra l'osso sacro ; poichè la testa sola si adatta sempre bene alla figura della pelvi , e non rende il parto nè difficile , nè laborioso .

§. 535. Se si troveranno i segni detti al §. preced. e la testa non sia ancora fuori della vagina , vi è da dubitare se ciò proceda dalle spalle incagliate nell'osso del pube , o nel sacro , o sivero per esser le medesime troppo larghe , come anche per causa del tralcio troppo corto , o avvoltato al collo , o per le braccia del feto incrociate sul dorso , o per causa del di lui ventre gonfio , ovvero per la mostruosità o grandezza di tutto il suo corpo .

§. 536. Per togliere adunque ogni dubbio , con le dita
si ri-

fi ricercherà ed esaminerà il capo, e si stabilirà verso qual parte sia voltata la faccia, come pure a qual parte voltino gli orecchi, la fontanella, e le future, le quali parti certamente se si rinverranno nella situazione adattata, e propria per produrre il parto della specie che dovrebbe in tali circostanze essere, e non vi sieno segni particolari indicanti altri impedimenti (§. preced.) ed è chiaro che le spalle puntano nelle ossa della pelvi.

§. 537. Quando poi la testa si troverà fuori della vagina, farà più facile l'apportare il necessario soccorso.

A Acciò le spalle, che sono incagliate nelle ossa della pelvi, più facilmente si rendano libere, si deve rispingere moderatamente il corpicciuolo del feto.

B Si prende la testa dall'uno e l'altro orecchio, e si dirige a quella parte verso la quale la faccia è più rivolta, e per modo che riguardi l'osso sacro, e il corpicciuolo seguiti quella voltatura. Tirando il capo troppo forte, facilmente si stacca dal tronco.

§. 538. Non riuscendo questo rivoltamento, si deve disimpegnare un braccio nella seguente maniera:

A Con una mano si prende il collo, e si solleva la testa verso l'osso del pube, ed ivi si sostiene, acciò per il proprio peso non ricada.

B L'altra poi introdotta lungo la parte posteriore della vagina, e nell'utero, si avvanza fino alla spalla.

C Indi con la guida della spalla, si porteranno due dita fino alla piegatura del gomito.

D Potendo con esse due dita, piegate a foggia d'oncino, si tiri a se il braccio per detta piegatura, e non potendo, si prenda e tiri il gomito.

E Affinchè non si rompano le ossa, o non si offenda il perineo, non si deve tirare per linea retta, ma descrivere nel far ciò un arco.

F Di rado si richiede l'uso degli uncini spuntati, o dei nastri, perchè questi mezzi sono incomodi, ed anche pericolosi.

§. 539.

- §. 539. Allorchè il braccio è così liberato ,
- A L'operatore prende il capo con la mano , introducendo due dita nella bocca del feto , e portando le altre di essa mano lateralmente in modo , che il pollice resti sopra l'orecchio .
- B Con l'altra mano prende la spalla già liberata .
- C Combinando il movimento di condurre all'ingiù la faccia verso l'osso sacro , e la spalla all'insù , si seguirà a crollare , e smuovere il feto , fino a tanto ch'ei non abbia acquistata la dovuta situazione .
- D Finalmente la partoriente accresce i suoi sforzi , e
- E Il feto si tira fuori .
- §. 540. Fin tanto che la testa sarà occultata dentro la vagina , non vi è luogo a questo espediente , se prima non sarà stata liberata la testa medesima , la qual cosa si deve eseguire nel modo seguente .
- A La partoriente con i proprij sforzi deve aiutare la discesa del capo , nel tempo stesso che l'operatore la procura .
- B Due dita di ciascuna mano , per esempio l'indice , e medio , si debbono introdurre insieme nella vagina per modo , che si portino fra il capo , e le ossa del pube .
- C Il capo si deve liberare dalle ossa del pube , e spingere verso l'osso sacro .
- D Le dita distese si devono condurre in giro sul capo , fin tanto che non saranno arrivate al perineo .
- E Questo , insieme col coccige , si deve reprimere verso la parte posteriore .
- F Similmente si deve premere all'insù il perineo con la vagina , acciocchè l'operatore possa prendere il collo del feto .
- G La testa si deve tirare abbasso quanto si può .
- §. 541. Quando non saranno sufficienti le dita per compire quest'operazione , liberata essendo la testa dalle ossa del pube ,
- In-

- A Introdurrà tutta la mano nella vagina, finchè le dita portate dietro l' orecchio non giungano ad investire e prendere il capo.
- B Con due dita di una mano rimuoverà la testa dalle ossa del pube.
- C Con l'altra mano poi, dentro la vagina, spingerà il perineo in alto e indietro, e parimente il capo, finchè non rimanga portato fuori.
- D Nel tempo stesso la partoriente si unirà coll'operatore a fare gli sforzi possibili.
- E Se la mano non farà a quanto si è detto sufficiente; si averà ricorso alla leva.

§. 542. Se poi anche in questo modo la testa non si potrà liberare, e altri impedimenti si aggiungeranno, con la peggiore situazione, si ricorrerà alla tanaglia maneggiata secondo le regole dell' arte, e si adoprerà in modo, che primieramente vengano respinte un poco le spalle, per liberare più facilmente la testa, dipoi si rivolterà la faccia verso l'osso sacro, e nel tempo stesso si tirerà fuori il feto. Se vi si unirà la paragonfosi, si passerà ad aprire la testa, per diminuirne il volume. Anzi, diminuito il volume, la mano alle volte potrà penetrare per disimpegnare le spalle, per le quali indi si tirerà il feto comodamente.

C A P I T O L O X V I I .

S E Z I O N E I V .

DEL PARTO DIFFICILE, E PRETERNATURALE
PER QUALCHE OSTACOLO, CHE SI RITROVI
NEL CORPO DEL FETO.

§. 543. **S**E la testa, e l'utero sieno posti nella giusta situazione, e il capo non venga ritardato

dato per la sua mole eccedente , si deve rintracciare la causa di tutto l' indugio del parto nel corpo stesso del feto , o nell' utero medesimo .

§. 544. I. Dopo la testa , la parte che produce il maggiore ostacolo nel parto , è I. *il cordone ombellicale avvolto intorno al collo del feto* .

§. 545. Questa specie di ritenzione , o legatura , non si può distinguere per mezzo di segni infallibili .

A Vi è luogo per altro a congetturarla , quando non vi sia veruno degl' impedimenti accennati al §. 543. e il capo in ogni doglia si avvanzi , ma cessando la medesima ritorni indietro , ed all' istesso posto o altezza nella quale trovavasi avanti della doglia . Così dunque si rende manifesto esservi un impedimento , che ritiene indietro la testa .

B Succede qualche volta che i dolori sieno meno vigorosi , e allora il capo si avvanza più lentamente .

C Il detto contraffegno si conferma , se in questo tempo in cui è per uscire il capo , sopraggiunge una perdita di sangue alla partoriente . Quando i dolori cessano , il fondo dell' utero si ritira indietro , e conduce seco il capo mediante l' avvolgimento del cordone : il capo poi resistendo , stira a segno esso cordone , che viene a staccarsi una porzione della placenta , e ne nasce l' emorragia .

§. 546. Per lo più la forza della natura suole compire questo parto , ma riesce più tardo del naturale , e alle volte è accompagnato da grandissimi travagli ; ed espone a varj pericoli la madre , ed il feto . Perchè

A Alcuna volta il tralcio molto teso stringe fortemente il collo al feto , e impedisce il libero corso del sangue nella testa , la quale perciò diviene livida , e il feto ancora , quantunque per altro di rado ciò succeda , viene a morire .

B La placenta violentemente staccata dall' utero cagiona

na un pericoloso flusso di sangue, il rovesciamento, e la lacerazione dell' utero.

C Qualche volta ancora si rompe esso tralcio, e tramanda gran quantità di sangue: altre volte poi si lacerà la placenta, e ne nascono i pericoli esposti sopra al §. 360.

§. 547. Quantunque si possa lasciare alle sole forze della natura questo parto, quando l' impedimento è leggiero, nondimeno l' operatore non si deve lasciare ingannare dalle apparenze che mostrano annunziare un parto vicino. Acciò le forze della partoriente non vadano troppo a debilitarsi, è necessario apportarle ajuto con l' arte, e in maniere diverse, secondo il diverso avanzamento, e periodo del parto, tanto più che l' ostacolo prodotto dal tralcio prevale allo sforzo prodotto dai dolori.

§. 548. Il tralcio corto per lo più non impedisce l' avanzamento libero del capo fino all' apertura inferiore della pelvi; ma dopo che il capo è calato fino a quel luogo, si manifesta la forza grandissima dell' impedimento, e con esito diverso in tre maniere.

1 Dalla sola natura si libera il capo, mediante l' ajuto di una leggiera tiratura, e facilmente si manda fuori col resto del corpo del feto.

2 Dalla stessa natura si manda fuori il capo, ma non già il restante del corpo del fanciullo, se prima non venga svoltato il tralcio dal di lui collo.

3 Dalla sola natura non è mandato fuori neppure il solo capo.

§. 549. Nella prima specie giova il seguente ajuto.

A Acciocchè meglio e più presto esca fuori il capo, sul principio di ciascun dolore si prenderà con uno o due dita esso capo, e si terrà fermo con esse, applicate sulle tempie, acciò non possa tornare indietro.

B Indi si tirerà il capo bel bello, e se tutto il corpo
B b 2 farà

farà libero , e in stato di poter seguitare il capo , si continoverà a tirarlo finchè tutto intiero il corpo del fanciullo non sia fuori. In tal tempo un astante comprimerà moderatamente il basso ventre della partoriente , affinchè nè l' utero , nè il feto possano risalire .

C Subito che sarà fatto ciò , si tirerà leggermente il tralcio , e si libererà dal medesimo il capo del fanciullo .

§. 550. Quando il corpo del fanciullo , tirato con discreta forza , non vien dietro alla mano , benchè tutto il capo sia fuori delle parti pudende , e si veda il tralcio avvolto al collo (§. 548. num. 2)

A Si tirerà leggiermente il tralcio per la parte che riguarda la placenta .

B Per quella medesima parte si piegherà anche il capo .

C Si toglierà la legatura del tralcio d'intorno al collo . Con questa operazione si libererà il tralcio , si toglierà l' impedimento , ed il rimanente del parto si compirà facilmente .

§. 551. Che se poi non è permesso all' operatore di mettere in pratica quanto si è detto ,

A Si deve tagliare il tralcio con forbici spuntate , e curve .

B Lo stesso feto si deve estrarre prontamente .

C Se viene ritardata l' operazione , l' estremità del tralcio , che manda sangue , si deve comprimere con le due dita , pollice , e indice .

D Tosto che il feto è uscito fuori , la parte del tralcio pendente dal medesimo si deve legare da un astante .

E La placenta si deve estrarre dall' operatore .

In questa guisa si toglie l' ostacolo , e fatta l' operazione con molta prestezza , non vi è da temere una gran perdita di sangue .

§. 552. Tutte le volte che dalla sola natura non si manda fuori il capo (§. 548. num. 3.) è necessario che vi concorra l' arte . Per la qual cosa Si

- A Si aprino le membrane, se non fossero rotte, acciò il capo non seguiti ad esser mobile, e non debba rimontare indietro col fondo dell' utero (§. 545. lett. C).
- B Col metodo sopra insegnato al §. 498. si tiri il capo.
- C Se ciò non riesce, si estrarrà con le tanaglie.
- D Affacciandosi il tralcio si taglierà, come è stato avvertito nel paragrafo precedente.

§. 553. Estratta la placenta l' operatore introdurrà la mano nell' utero, e forzerà indietro il fondo di esso, il quale si era slentato, e portato innanzi per la tiratura violenta fatta sul tralcio (§. 367.).

§. 554. II. Nella specie seconda *il tralcio troppo corto* è similmente, se ben di rado, un impedimento o gran ritardo del parto: nel qual caso certamente è ben fatto d' aprire la bocca dell' utero; ma non ostante tal forte d' impedimento difficilmente si può conoscere avanti l' uscita del corpo del feto. I segni sono quasi i medesimi che quelli del parto, di cui abbiamo parlato al §. 545. eccettuato che non vi si vede circonvoluzione alcuna del tralcio intorno al collo.

§. 555. In questo caso se con l' aiuto dell' arte non si evita, suol quasi sempre staccarsi violentemente la placenta dall' utero, o rompersi il tralcio vicino all' ombelico, o vicino alla placenta (§. 546. lett. B C).

§. 556. L' operatore deve apportare ajuto consimile a quello, che richiede il parto della specie antecedente (si consulti ancora il §. 548. e seguenti). Che nel caso di cui si parla non vi possa essere avvolgimento alcuno del tralcio intorno al collo, resta evidente. Le cautele da avvertirsi saranno:

- A Se la testa si trattiene lungo tempo sull' apertura superiore della pelvi, e che per un lato della medesima si possa introdurre la mano nell' utero, non solamente con più chiarezza allora si conoscerà la cagione dell' impedimento, e si toglierà con strappare il tralcio, dopo

po di aver voltato il fanciullo in positura da poterlo tirare sbrigatamente per i piedi, e immediatamente si legherà esso tralcio vicino al di lui basso ventre.

B Allorchè il feto farà uscito fuori fino all' ombellico, si conosce se il tralcio è troppo corto, dalla tensione del medesimo: in questo caso si deve prendere con una mano, acciocchè non si rompa vicino all' ombellico, nel tempo che l'altra tira il feto.

§. 557. III. La terza specie consiste *nelle spalle troppo larghe* con il corpo tutto del feto troppo grosso, dal che ne nasce un grande ostacolo al parto; ma questo caso è piuttosto raro.

§. 558. I segni indicanti essere il feto situato in un lato, sono quasi i medesimi descritti al §. 534. e 535. ma nell'esaminare la testa (§. 536.) si trova che tutto è nella situazione naturale.

§. 559. Non si deve fare null' altro per condur fuori il fanciullo, che

A Tirare diligentemente il capo, il che si fa o prendendolo colle mani per le tempie (§. 549.) o con le tanaglie, sia poi esso dentro la vagina, o sia comparso anche fuori della medesima.

B Se le spalle non possono passare, si disimpegnino le braccia (§. 538.) e col possesso di esse si anderà smovendo e tirando il corpo come si deve.

§. 560. Succede alcuna volta, che il capo sia già fuori delle parti pudende, ed ivi si fermi, e non faccia ulteriore avanzamento, neppure nei momenti delle doglie maggiori, quantunque non si scorga esservi avvolgimento del tralcio sul collo del fanciullo, e l'orifizio della vagina neppure lo stringa; in questo caso l'ostacolo potrà derivare dalle braccia, dal basso ventre enfiato, e dalla mostruosa conformazione del feto.

§. 561. IV. Allorchè il fanciullo ha le braccia incrociate sul suo dorso, esse si arrestano negli ossi del pube, e im-

pediscono al corpo l'ulteriore avanzamento, a segno, che le medesime, o il collo, più tosto si strappino, e senza che i più forti dolori promovino l'avanzamento del fanciullo.

§. 562. Laonde per terminare questo parto, si debbono liberare le braccia del feto (§. 538.), la qual cosa eseguita, facilmente si potrà estrarre il rimanente del corpo. Talora questa estrazione si può effettuare tirando il feto per le mani.

§. 563. La suddetta cautela, di liberare le braccia, si deve praticare allora quando il basso ventre del feto sia enfiato, o il feto stesso abbia una conformazione mostruosa; onde ne casi dubbiosi (§. 560.) si deve sempre cominciare dal disimpegnare le braccia.

§. 564. V. Se dopo aver disimpegnate le braccia del fanciullo non verrà il tronco, s'introdurrà la mano nell'utero, e si cercherà la causa di tal ritardo, la quale ordinariamente deriva *dal basso ventre del feto gonfio di aria, o di umore*.

§. 565. Acciocchè poi si possa meglio estrarre il tronco,

A Dopo avere disimpegnate le braccia, si deve prendere il fanciullo per le ascelle, e si deve tirar fuori il tronco con muoverlo, e scuoterlo moderatamente per più versi. Così facendo, il fluido, che lo rendeva enfiato, si distribuisce in guisa che il basso ventre possa comodamente aver passaggio.

B Ma se poi le acque che contiene sono in copia tale, che per ragione di esse non possa mettersi in pratica il sopradetto mezzo di smuoverlo, e scuoterlo, allora non vi rimane altra speranza che forare esso basso ventre, con appropriato strumento, e dare in questa maniera esito alle acque, e minorare il volume di esso.

§. 566. Si deve usare un somigliante artificio, quando
do

do un tumore follicolato, e linfatico distende gl' integumenti del corpicciuolo del feto, come si è alcune volte veduto accadere.

§. 567. VI. *Quando si trovi esservi due feti fra loro attaccati, o veramente un feto solo, ma ricresciuto di qualche membro oltre il numero ordinario*, da ciò ne nasce un ostacolo all' uscita, e gran dubbiezza per l' esito del parto.

§. 568. Dal riscontro, e dalla natura dell' ostacolo insolito, conosciamo questa specie di parto. Se si presentano alla bocca dell' utero due teste, quando se ne farà un poco rispinta una, riscontrando, facilmente si arriverà a sentire la seconda. Ma di più ancora essendo uscita fuori la prima, si distinguerà a traverso degli integumenti nella regione del pube un tumore sferico, e quando si potrà introdurre la mano nell' utero, allora senza difficoltà si conoscerà lo stato, e forma di tutto il corpo del feto.

§. 569. La sola natura alle volte supera tutti gli ostacoli prodotti da consimile superfluità di membra.

A Alcune volte queste membra, e ancora le medesime due teste, quando sono ben situate, talmente sono compresse dalla forza dei dolori, che felicemente passano per una pelvi ampia.

B Altre volte la carne, o la pelle, che unisce i due feti si rompe, e uno nasce dopo l' altro, se il capo del secondo è situato ai piedi del primo.

§. 570. Non di rado ancora uno si trova nel caso di non poter' ajutare la partoriente, che con ricorrere alli strumenti taglienti, la qual cosa è sempre per la donna di qualche pericolo. In tale occasione gli strumenti si debbono introdurre, e dirigere secondo le regole insegnate di sopra al Cap. XVII. Sez. I.

A Nel caso, che un feto abbia due capi, si aprirà quello che si presenta il primo, col perforatorio, per diminuir-

nuirne il volume , di poi si condurrà l'altro alla bocca dell' utero , e si farà sopra di esso la medesima operazione : fatto questo tutti due i capi potranno esser compressi , e mandati fuori dalla sola forza dei dolori . L'operatore baderà bene , che le punte degli offetti dei due capi non offendano la vagina . Se il feto si estrarrà per i piedi , non ostante prima si dovranno diminuire i volumi delle loro teste .

B Quando i feti hanno il collo molto lungo , si compisce il parto con togliere l'impedimento di uno di quelli , e se ne farà tosto l'estrazione , e il secondo facilmente ne verrà in seguito : Ovvero si respingerà il capo indietro , si volterà il corpo per i piedi , si tirerà fuori fino alle ascelle , e si disimpegnerà una testa dopo l'altra .

C Se le parti stanno attaccate per mezzo della carne , o della sola cute , facilmente essa carne , o cute s' incide con lo strumento perforatorio , e si termina di strapparla colle dita ; ma essendo le parti unite per mezzo di ossi , uno si servirà di strumento a taglio , come si dirà in appresso , ma l'operazione è più difficultosa .

D Se il feto manchi dei piedi , e per conseguenza non possa somministrare la comodità di esser tirato per tal parte , si estraiga colla tanaglia prendendolo per la testa , ovvero con un oncinio inferito nel basso del suo corpo , o con introdurgli un dito nell'ano .

E Se si tirerà violentemente il feto senza aver prima liberate , o diminuite con arte le parti del feto , ne nascono gli accidenti accennati al §. 423. ed anche si arriva a romper la sinfisi degli ossi del pube con la morte immediata della madre .

CAPITOLO XVII.

SEZIONE V.

DEL PARTO NEL QUALE IL FETO SI PRESENTA COL CAPO,
MA CHE DIVIENE DIFFICILE E PRETERNATURALE
A CAGIONE DI QUALCHE VIZIO DELL' UTERO,
O DELLA VAGINA.

§. 571. I. **L**A prima specie è quella nella quale *il tronco del corpicciuolo è ritardato per la contrazione dello sfintere dell' utero, o della vagina.*

§. 572. Allorchè l'esterne parti genitali troppo irrigidite, fanno soverchia resistenza al capo disceso dentro la vagina, perchè l'orifizio dell' utero non presta quanto bisogna, l'orlo duro e teso è rispinto contro le pareti della vagina dal capo che discende: questo orifizio si ritira indietro, e si ferra di nuovo, tosto che la testa è uscita, e non vi è altro che il solo collo che resiste. Il fanciullo il più delle volte muore, e si riconosce la compressione che ha sofferta, mediante un cerchio livido intorno al suo collo.

§. 573. Succede ancora, che per aver trascurata l'estrazione del corpo, dopo che la testa è uscita fuori, lo sfintere della vagina si ferra da per se intorno al collo del fanciullo con tanta forza, che le doglie le più vigorose non possono slentarlo, ed aprirlo, e non si può senza violenza introdurre un dito tra il collo, e la vagina. In questo caso il fanciullo non tarda per il solito molto a morire, restando interrotta la circolazione del sangue tra il di lui capo ed il resto del corpo. Dunque con tutta l'attenzione si deve procurare che uscito il capo, non resti trattenuto il tronco dentro l'utero.

§. 574.

§. 574. Nel caso in cui

A L'orifizio dell' utero stringa il collo del fanciullo, si deve tirare la testa nelle maniere esposte di sopra al §. 498. e seguenti.

B Allorchè il medesimo viene stretto dallo sfintere della vagina, si deve dilatare colle dita esso sfintere, introducendole successivamente tra il capo, ed il collo, acciò il tronco venga facilmente tirato dietro al capo, o che si possa estrarre per le braccia dopo averle disimpegnate.

§. 575. I non pratici di quest' arte, per aver trascurate le diligenze descritte nel precedente paragrafo, violentano la madre ed il fanciullo, e tirano la testa con tanta forza, che, non venendo il tronco, ella si stacca, specialmente se il feto abbia principiato a imputridire, e i ligamenti delle ossa con le carni si trovino molto flosci e deboli.

§. 576. II. La seconda specie è quella quando succede il *prolasso dell' utero, o della vagina*.

§. 577. La testa nello scendere spinge qualche volta avanti di se l' orifizio dell' utero verso le parti genitali esterne, e questo accade, quando

A L' apertura superiore della pelvi è troppo ampia. (§. 14.)

B Quando l' utero, o il capo, sia situato obliquamente.

C Quando la partoriente avanti la gravidanza fu già soggetta a tal prolasso.

D Quando l' orifizio dell' utero di natura sua si dilata difficilmente, ed è spinto abbasso dalla forza de' dolori.

§. 578. La testa poi spinge e porta fuori la vagina, allorchè

A L' utero è situato obliquamente.

B La parte del fanciullo presentatasi la prima per uscire è grande eccedentemente, sia poi essa parte il capo o le natiche.

C La vagina rilassata e pendula. Producono questo rilassamento

lafsamento , oltre le interne malattie fierose , i part molto frequenti , e la vescica dell' orina piena , e gonfia nel tempo del parto , e che produce nella vagina una specie di tumore ; e siccome la colonna superiore delle rughe vaginali è quella che forma la maggior prominenza , è quella parimente che con maggior facilità viene nel parto a rilassarsi .

§. 579. L'una , e l'altra specie di prolafso si conosce facilmente . Allorchè l'orifizio dell' utero cala a motivo della troppa ampiezza della pelvi , l' utero si mantiene retto , e i dolori fanno avanzare la testa , ma l' orifizio scende , e s' apre lentamente . Qualora questa discesa dell' orifizio sia complicata coll' obliquità dell' utero , uno se ne assicura col tatto , o sia col riscontro ; e con questo mezzo parimente si possono determinare le altre specie .

§. 580. Questa discesa ritarda il parto , turba la partoriente , e la tormenta , e se non s' impedisce dall' operatore un ulterior progresso , dopo il parto diviene maggiore , e reca un perpetuo danno alla donna . Se la forza dei dolori fa scendere tutto intiero il collo dell' utero , avanti che l' orifizio sia stato aperto , è necessario assolutamente ricorrere all' arte , acciò il parto venga effettuato .

§. 581. Quando si riscontri prolafso d' utero , vi si rimedia .

A Facendo giacere la donna in letto supina , e proibendo ad essa lo stare a federe , siccome il camminare (§. 301. lett. E), e fare sforzi grandi .

B L'operatore , in qualunque dolore , con due dita ritenga e respinga l' orifizio , che discende , operazione che è di sollievo alla partoriente .

C Da un'astante si sostenga la testa del fanciullo quando essa farà uscita fuori , acciocchè l' operatore possa proseguire il rispingimento del soprad detto orifizio dell' utero .

La

D La placenta si stacchi più tosto coll' ajuto delle dita , che col tirare il tralcio .

E Terminato il parto, si faccia risalire l' utero con tre dita disposte a forma di cono .

F La puerpera rimanga tranquilla in letto, e per quanto si può si allontanino da essa le occasioni di tossire, di starnutire e di vomitare, e di entrare in qualunque agitazione per moto di spirito , o di corpo .

G Nel caso più grave , in cui la testa presentatafi la prima, venga a puntare in qualche osso, e non possa scendere nell' orifizio poco dilatato , l' operatore deve introdurre la mano nell' utero, rimuoverè il capo, rompere le membrane, se fa d' uopo, e tirar fuori il feto per i piedi . Alcune volte la bocca dell' utero chiusa (§. 351.) con gran difficoltà si perviene ad aprirla .

§. 582. Quando si trova il prolusso della vagina .

A Per mezzo della sciringa, se conviene, si cavi l' orina , e questo si faccia sul principio , acciocchè la vescica dilatata non dia occasione e tempo alla vagina di tumefarsi .

B Le medesime cose , che si sono prescritte nel §. precedente, si osservino ancora qui .

§. 583. III. La terza specie è quando *l' utero si rovescia dopo il parto* .

§. 584. Questo male nasce ,

A Naturalmente per la forza dei dolori, i quali subito dopo il parto spingono il fondo dell' utero con la placenta fuori del collo del medesimo, o quando il tralcio è tanto corto, che violentemente tira la placenta (§. 546. lett. B. e §. 555.) .

B Dalla levatrice , la quale con forza tira la placenta non staccata , e con essa il fondo dell' utero (§. 360. lett. A) . Ve ne sono alcune che perfino prendono il fondo dell' utero calato fino alle parti genitali esterne, e rovesciato , per una mola .

§. 585. Si conosce il fondo dell' utero esser rovesciato dopo il parto, se

- A Oltre la placenta si presenta altro corpo spugnoso, o infanguinato, anzi che versa una gran quantità di sangue di color fosco, senza che sia forato da cospicua apertura, o che riempia l' orifizio dell' utero, o la vagina, e che sia pendente fuori delle parti genitali.
- B Tra questo corpo, e la bocca dell' utero, vi è un solco in giro, che confina con una parte immobile, e fa con essa un corpo continuato.
- C La donna sente fra le cosce un peso noioso, le dolgono i lombi, e non può nè orinare, nè andare di corpo.

§. 586. Questa malattia richiede pronto soccorso, e la reposizione dell' utero; altrimenti sopraggiunge una copiosa emorragia, il deliquio, la convulsione, e la stessa morte. Il fondo dell' utero però rovesciato in modo che non esca fuori della vagina, può restare in tal forma per lungo tempo, senza metterè la donna in pericolo di vita, e soltanto portare ad essa qualche molestia.

§. 587. Affinchè si possa meglio riporre al suo luogo l' utero rovesciato,

- A La donna si ponga nella solita situazione, che richiede il parto preternaturale (§. 392. e segg.).
- B Si stacchi la placenta, che è forse peranche attaccata al fondo (§. 350).
- C Se il fondo dell' utero è indurito, o anche infarcito di umori viscidì, si atterga, e si rilaksi con gli emollienti; prima ancora che si può si evacui la vescica, e l' intestino retto.
- D La parte inferiore dell' utero, qualora sia pendente fuori della vagina, si riporrà bel bello e diligentemente dentro la medesima, mediante le dita dell' amano destra. Indi si darà alla puerpera qualche pocadi quiete.

Con

- E** Con una simile operazione si riporrà il fondo , a quale si farà riprendere la sua forma concava , dopo averlo fatto risalire al suo posto per l' orifizio .
- F** Si tenga la mano ferrata in forma di pugno nell' utero , fin tanto che non si senta che il medesimo la stringa ; indi a poco a poco si ritirerà , e allontanando ed accostando insieme le dita , si formerà una specie di cono , attorno del quale l' utero si stringerà ; finalmente si caverà la mano , e allora sarà difficile o rara cosa , che l' utero torni a cadere .
- G** Fatta questa operazione , la puerpera riposi per più giorni quieta , e giacente colla testa più bassa che potrà , e colle cosce strette , e non prenda che alimenti leggieri , e gelatinosi . Se il ventre non sia obbediente , si ecciterà a sgravarsi con dei clisterj emollienti , e non irritanti ; frattanto si avrà cura di applicare sopra le parti genitali delle pezzette imbevute di vino , avvalorato con delle droghe .

CAPITOLO XVII.

SEZIONE VI.

DEL PARTO DIFFICULTOSO A CAGIONE
DEL CAPO STACCATO DAL TRONCO.

S. 588. **Q**Uando sia venuto fuori il capo , con molta cautela , e senza violenza , si deve tirare il tronco , quando lo stesso tronco , o qualche vizio della vagina , o dell' utero , formi e frapponga ad esso un ostacolo . Quando senza la debita diligenza , ma con violenza si tira il capo , il collo si strappa , e riesce tirar fuori il capo solo senza il tronco (S. 575.) la qual cosa può accadere anche ad un operatore abilissimo.

lissimo nel caso di un feto immaturo , putrido , o estenuato , i di cui ligamenti debolmente collegano le ossa .

- §. 589. La testa si può staccare dal tronco , allorchè
- A Una delle spalle punta nelle ossa del pube , e l'altra nell' osso sacro (§. 533.).
- B Quando le spalle sono troppo larghe (§. 557.).
- C Quando le braccia incrociate posano sul suo dorso (§. 561.).
- D Qualora il basso ventre è enfiato (§. 464.).
- E Quando vi siano due feti (§. 567.).
- F Finalmente quando lo sfintere della vagina stringe e impedisce il tronco (§. 573.).
- §. 590. Il tronco restato dentro l'utero si estrae nella maniera che segue .
- A L'operatore introduca due dita nella vagina lungo la parte posteriore di essa .
- B Colle medesime , piegate a forma d' oncinio , tiri il feto per l' una , o l'altra piegatura del gomito .
- C Dopo avergli disimpegnato un braccio , ed avere afferrato il feto presso alla spalla , lo conduca verso l' osso sacro , e ne faccia l'estrazione .
- D Se in questa maniera non gli riesce , deve disimpegnare l'altro braccio , e tirarlo fuori con prenderlo per tutte due le spalle .
- E Se non gli si può disimpegnare il braccio sulla piegatura del gomito , si tiri per la mano .
- F Con i mezzi poi insegnati di sopra , si rimuova qualche altro particolare impedimento che vi si aggiungesse .
- G Quando finalmente veruno degli espedienti accennati riesca , si ricorra all' oncinio , introducendolo , e inferendolo fra le costole , e con questo mezzo si estragga il tronco .

CAPITOLO XVIII.

DEL PARTO DIFFICILE , E PRETERNATURALE PER CAUSA
CHE IL FANCIULLO SI PRESENTI CON ALTRA PARTE
DEL SUO CORPO , FUORI DELLA TESTA.

SEZIONE I.

DEL PARTO DETTO AGRIPPINO.

§. 591. **Q**Uando il fanciullo si presenta per i piedi
all' orifizio dell' utero, Tav. X. Fig. 2.
questo parto si chiama *parto agrippino*.

§. 592. Gli antichi stimarono questa specie di parto difficilissima, e molto malagevole ; il più delle volte però non è tanto da temersi, se si presentano ambedue i piedi , e si trovino tutti i requisiti di un ottimo parto (§. 216.) e che non vi sia altro di straordinario, fuori che questa suddetta situazione del feto. Quantunque la natura per se sola rare volte compisca l' esclusione del feto in questa positura , facilmente però si conduce al termine dall' operatore , e con esser tirato soltanto per i piedi.

§. 593. La natura sola è sufficiente, quando la pelvi è ampia, il feto piccolo, la faccia rivolta verso l' osso sacro, i piedi uniti insieme, e con le piante opposte all' orifizio dell' utero, la forza dei dolori è efficace, e le membrane molto resistenti a rompersi. Da tutte queste cose insieme è prodotto il dilatamento dell' orifizio uterino per il comodo passaggio del feto. Quante poi meno di queste descritte circostanze si trovano concorrere, tanto più questoparto è difficile, e tanto maggiormente richiede nel professore prudenza, e attenzione.

§. 594. I segni che annunziano queste specie di parto, sono in generale quelli, che presagiscono un parto

preternaturale, perchè il fanciullo presenta tutt' altra parte fuori che la testa ; ed ecco quali sono :

- A Spesso la mole del basso ventre non è così regolare , come quando il feto è nella situazione ordinaria .
- B Negli ultimi mesi della gravidanza , allorchè si riscontra col dito l' utero della donna , non si sente in modo alcuno la testa , la quale si fa distinguere per il suo peso .
- C Quando nel sopraggiungere i dolori non si presenta all' orifizio dell' utero che la vescica formata dalle acque , o qualche altra parte tra le minori del fanciullo .
- D L' orifizio si apre più tardi , a cagione della pressione più debole .
- E La vescica non si riscontra di figura o superficie molto larga , ma bensì ordinariamente di figura trasversale , quale è appunto allora l' apertura dell' orifizio dell' utero ; tosto indi diviene , lunga floscia , e pendente .
- F Dalle membrane rotte si sparge una copia di umore maggiore del solito , e i dolori o cessano , o si mutano in spurj . Vi è da fare qualche eccezione , qualora per prima parte si presentino le natiche , e i piedi uniti insieme . Spessissimo le natiche sono sbagliate , e prese per il capo , singolarmente negli ultimi mesi della gravidanza , e avanti la rottura delle membrane .

§. 595. Si resta accertati essere i piedi quelli che si presentano ,

- A Allorchè a traverso le membrane non si arriva a sentire che qualche parte piccola : segno per altro molto incerto , poichè potrebbero essere anche le mani .
- B Ma quando le membrane sono rotte , con somma certezza si distingue il piede , dalle sue dita , che sono più corte di quelle delle mani ; dal pollice non dis-

co-

scoſto dalle altre dita come nella mano ; dalla prominenza propria del calcagno , e dalle prominente formate nell' uno , e nell' altro lato dai malleoli .

§. 596. Allorchè tutti due i piedi ſi presentano all' orifizio dell' utero , il fanciullo ſi eſtrae nella ſeguen- te maniera .

A Si prendono tutti due i piedi in modo , che il dito medio ſtia fra l' uno e l' altro piede , l' indice ſopra il malleolo eſterno di uno , ed il dito annulare ſopra il malleolo eſterno dell' altro piede , affinchè non poſſano ſdruciolare .

B Si tirino nella direzione dell' aſſe della pelvi , movendoli a dritta , ed a ſiniſtra , ſintanto che non compariſcano uſcite fuori le ſure , o ſieno le polpe delle gambe .

C Si rinvolti ciaſcuna gamba , nella parte ſuddetta , con un panno lino morbido aſciutto , e ſcaldato , e ſi tiri il fanciullo fino alla compaſſa delle ginocchia .

D Si oſſervi in ſeguito ſe il tralcio ombellicale paſſi fra le coſce . Eſſendo così , ſi tiri la parte di eſſo , che riguarda la placenta , ſi pieghi il ginocchio del fanciullo , e ſi liberi dal tralcio . Nella ſteſſa maniera ſi deve liberare qualunque altra parte , che dal medefimo ſi trovaſſe legata .

E Il tralcio ſviluppato che ſia , ſi pone da una parte , e l' operatore oſſervi di non comprimerlo colla mano .

F Venute che ſieno fuori le gambe , e le coſce del fanciullo , ſi prenda per le ginocchia , e poi per le coſce medefime , come è ſtato detto alla lett. C. e ſi continovi a tirarlo fuori .

G Se le dita dei piedi ſono voltate verſo l' oſſo ſacro , il feto poſa ſul ſuo baſſo ventre , ed è ben ſituato ; al contrario poi , ſe riguardano la ſinfiſi del pube , il feto è ſituato ſul ſuo dorſo , e allora ſi deve voltare ſul baſſo ventre . Per far bene queſta coſa ,

H Si applica la palma d' una mano ſopra il pube del

feto , quella poi dell' altra sopra i lombi , e operando con esse unitamente si volta il medesimo .

I Ciò fatto si cingono i fianchi , e gl' inguini del fanciullo con un panno lino asciutto , e riscaldato , e si tirano secondo la direzione dell' asse della pelvi ; la partoriente può aiutare questa estrazione con fare degli opportuni sforzi .

K Tirato fuori il fanciullo fino sotto le ascelle , non si disimpegnino le braccia , ma con smuovere il feto per più versi , l' operatore tenti di estrarle insieme con il capo . La partoriente nel medesimo tempo può molto contribuire con accrescere qualche suo sforzo .

§. 597. Se poi la testa non può uscire , il professore introdurrà la mano nell' utero lungo l' osso sacro , per cercare la cagione dell' impedimento . Questo suol' essere di quattro specie ; o il capo è troppo grande , o situato malamente , o le braccia sono incrocciate , o la vagina è troppo angusta .

§. 598. Si giudicherà che la testa sia troppo grossa , quando la faccia guarda l' osso sacro , o l' ischio , se le braccia seguono le ossa delle tempie , e lo stesso corpo del feto è più grande del dovere .

§. 599. Affinchè un tal capo meglio si tiri fuori ,

A Si disimpegnino le braccia .

B Un assistente sostenga il corpo del feto .

C L' operatore introduca due dita della sua mano dentro la bocca del fanciullo , e lo prenda per la mascella inferiore ,

D Porti l' altra mano sopra le spalle del medesimo , in modo che si arrivi ad afferrarle con due dita da ambe le parti del collo .

E Il professore con smuovere in diverse parti il feto , e col tirarlo , tenti di liberargli la faccia , acciò per quella si presenti . Se il perineo resiste troppo , e la testa sia quasi inchiodata , col girargli la faccia , dall' una e l' altra parte , si estrapga .

La

F La partoriente si unisca a fare degli sforzi, ed accompagni l'operatore.

§. 600. Se con tutti questi artifizj non si può disimpegnare la testa,

A L'operatore per quanto può porti ulteriormente sopra l'occipite del feto la mano, che fino allora ha tenuta sopra le spalle del fanciullo, e tenga l'altra sulla mascella.

B Nel tempo stesso non solo deprima l'occipite, ma ancora tiri la mascella inferiore fino all'apertura della vagina, di maniera che la faccia resti tutta scoperta.

C L'astante che sostiene le ginocchia del feto, sollevi questo verso il pube della partoriente.

D L'operatore con un moderato smovimento procuri l'ulteriore disimpegno, e liberazione del capo.

§. 601. Finalmente se nessuna delle cose finora proposte gioverà per tirare il capo, come suole in vero accadere se la mole di esso è maggiore dell'apertura della pelvi, non vi è che un compenso solo, il quale consiste

A In ismuovere il corpo del fanciullo, come si farebbe maneggiando un succhiello, acciò la testa si allunghi, e diminuisca di diametro. Se questa operazione poi non riesce,

B Si apra ad esso il cranio nella regione dell'occipite, acciò il cervello, o l'acqua che vi fosse, esca, ed il suo volume diminuisca.

C Con le dita della mano, introdotta nell'utero, si prenda per la mascella, o per le orbite degli occhi.

D Si tiri dopo la testa nella maniera descritta al paragrafo precedente.

§. 602. Ogni volta che le braccia, le quali dovrebbero seguitare le tempie, per essere incrocicchiate l'una sopra l'altra, impediscono alla testa di venir fuori, si debbono disimpegnare nella maniera di sopra in-

insegnata al §. 538. portando prima il corpicciuolo del feto sulla parte opposta a quella del braccio che uno vuole disimpegnare, per poter più facilmente introdurre la mano nell' utero.

§. 603. Suole alle volte accadere, disimpegnate le braccia, che il collo del fanciullo si trovi stretto dalla bocca della vagina, e ciò particolarmente per non essere stata praticata l'attenzione di prontamente tirar fuori la testa. Allora si deve dilatarla, introducendo adagio adagio le dita fra essa ed il collo.

§. 604. La faccia è mal situata, quando ella guarda le parti superiori, e che il mento sia arrestato dalla sinfisi degli ossi del pube. Perciò in tal caso:

- A Si prenderà il feto per il torace, e si respingerà al possibile nella pelvi, acciocchè il mento si discosti dal pube.
- B Si porterà l'altra mano sul posto in cui la faccia è trattenuta.
- C S'introdurranno due dita nella bocca, e coll'ajuto di esse si rivolterà la faccia, per modo che guardi l'ischio, e che un orecchio resti in su, e l'altro in giù.
- D Il rimanente si faccia col metodo indicato al §. 600. lett. D.

§. 605. Può accadere che il capo non obbedendo niente al movimento di rotazione dato al corpo, e da noi descritto al §. 596. lett. H, il mento incagli nelle ossa del pube, benchè il feto riposi sul ventre. Da ciò procede che il collo si storca; onde non si deve essere indifferenti sulla banda verso la quale si voglia voltare la faccia: sempre ella si deve voltare per la parte opposta a quella sulla quale il collo ha piegato, e che si riconosce dalla tensione di esso.

§. 606. Acciocchè il feto non perisca per la compressione del tralcio, nel tempo che l'operatore tenta la liberazione del capo, avrà l'attenzione, Di

- A Di portare la mano sinistra sotto il torace lungo l'osso sacro fino alla faccia di esso.
- B Di mettere due dita dentro la bocca del fanciullo, e spingerle nelle fauci, dove abbascerà la lingua, stimolerà la gola, e farà escire la mucosità che vi si trovasse. In questa maniera le fauci del fanciullo si aprono, e si nettano per l'ingresso dell'aria, e insieme sono stimulate alla respirazione, (§. 407. num. 2.)
- C Acciocchè l'aria meglio penetri dentro la bocca, del fanciullo colla stessa mano si faccia del luogo nella vagina scostandone la parete.
- D Dopo che il feto avrà incominciato a respirare, l'operatore si accinga alla liberazione del capo (§. 597. e seg.) §. 607. Se mai il fanciullo non presenta che un sol piede, Tav. X. Fig. 4. si dovrà ricorrere al metodo seguente:
- A Si rispingerà un poco il piede che è fuori, affinchè si liberi l'altro, nel caso che sia arrestato nell'osso. Se l'operatore si trova presente nel tempo medesimo che si rompono le membrane, può impedire l'ulteriore avanzamento del piede, che si presentasse.
- B Con la scorta del pollice del piede uscito, s'introdurrà la mano nella vagina fino al ginocchio, ivi forse stando l'altro piede, si prenderà per i malleoli, si tirerà fuori, e si metterà accanto al primo.
- C Se non si troverà l'altro piede, si tenterà potendo di estrarre il feto per quello solo che si sia presentato. Ciò in vero si potrà fare ogni volta, che il piede sia ripiegato sopra il dorso ovvero basso ventre del fanciullo.
- D Tosto che compariscono gl'inguini, si tira fuori facilmente l'altro piede, col porre il dito nella piegatura.
- §. 608. Se poi il fanciullo non può escire col tirarlo nella suddetta maniera per un solo piede, e non si possa vincere la resistenza che l'altro piede oppone per la sua cattiva situazione, bisogna dolcemente disimpegnarlo: e per riuscir bene, l'operatore osserverà quanto segue.
- De-

- A Deve fermare il piede uscito con un nastro legato sopra i malleoli.
- B Rispingere il medesimo quanto può, affinchè l'altro si possa più facilmente disimpegnare.
- C Colla guida del pollice del piede di già uscito, introdurre la mano fino ai malleoli dell'altro piede; in modo che il dorso della medesima sia rivolto verso il primo.
- D Trovatolo lo afferrerà sopra i malleoli.
- E Lo disimpegnerà dal luogo ove è arrestato, con riaccostarlo verso il corpo, e allora lo tirerà fuori.
- F Legherà anche questo piede col nastro come aveva fatto nel primo.
- G E farà tutto il resto secondo il metodo espresso nel §. 596.

CAPITOLO XVIII.

SEZIONE II.

DEL PARTO DIFFICILE, E PRETERNATURALE, A CAGIONE
CHE IL FETO SI PRESENTI COLLE GINOCCHIE
VOLTATE VERSO LA BOCCA DELL' UTERO.

§. 609. **Q**Uando all'orifizio dell'utero si presenta un corpo duro, convesso, piano da ambe le parti, e dietro al quale si sente una piegatura, è certo questo essere un ginocchio, o un gomito, che si presenta; si distingue quello essere il gomito dai condilj delle ossa più prominenti, ovvero essere il ginocchio quando vi si senta la rotula mobile. Tav. X. Fig. 5.

§. 610. Inoltre si conosce più chiaramente che il fanciullo abbia presentato il ginocchio, quando conducendo la mano fino all'estremità della parte che si presenta

v' in-

s' incontra il piede (§. 595.) ; in questo caso l' operatore , per abbreviare l' operazione , lo prenda sopra i malleoli , lo spinga verso una parte , nel mentre che lo tira , lo estrarra , e compisca il parto descritto nella sezione precedente.

§. 611. Non di rado accade allorchè si presentano tutti due i ginocchi , che la natura ne spinga fuori uno : in questo caso non è difficile all' operatore di prenderli , e tirarli senza disimpegnare i piedi , specialmente se il feto è molto premuto dall' utero , per le acque già perdute da qualche tempo .

C A P I T O L O XVIII.

S E Z I O N E III.

DEL PARTO DIFFICILE , E PRETERNATURALE A CAGIONE
CHE IL FANCIULLO PRESENTA LE NATICHE
ALLA BOCCA DELL' UTERO.

§. 612. **I**L feto può presentare le natiche, tanto nella situazione retta , che obliqua dell' utero
Tav. XI. Fig. 4.

§. 613. Ogni volta che si presentano le natiche, essendo l' utero in situazione retta , dalle persone imperite si scambiano facilmente dal capo . Queste spinte e condotte all' orifizio dell' utero si riscontrano dure , e prominenti , e tanto più lo sono , quanto maggiore è la forza dei dolori , colla quale saranno state compresse dopo lo spargimento dell' umore dell' amnio . Si conoscono

A Per l' apertura dell' intestino retto situato nel lungo incavo , il quale è terminato in una dell' estremità dalle parti genitali , e nell' altra dall' osso del coccige .

E c

L' aper-

- B L'apertura dell'intestino retto si distingue da quella della bocca, per essere più stretta, e non avere la lingua, e le mascelle. (Si consulti il §. 518.) .
- C Il meconio denso, nero, tenace, glutinoso, poco fetido, e che sgorga da essa parte, fa sì che non si possa confondere con la bocca.
- D Quando si possa condurre le dita più addentro, gli arti che hanno relazione, o sono attaccati alle natiche, tolgono di mezzo ogni dubbio.
- E Non vi si sente inoltre osso alcuno mobile, o acuto nel margine, come si riscontra quando si presenta il capo.

§. 614. Questo parto differisce poco dal parto facile descritto nel Cap. VIII. purchè sia ampia la pelvi, e piccolo il feto. Da ciò nasce ancora che la vescica formata dalle acque, spinta dai dolori alla bocca dell'utero si distenda in una superficie larga, in vece di essere di figura lunga, come per lo più si trova in quei parti ne' quali il feto presenta ogni altra parte fuori del capo (si consulti il §. 594.). Con somma facilità ancora si apre l'orifizio dell'utero, ed il feto esce fuori.

§. 615. Al contrario ogni qualunque volta che la pelvi sia stretta, o che il feto sia grosso, con le cosce ripiegate le quali aumentano il volume delle natiche, difficilmente il feto può passare per l'apertura della pelvi, se non a forza di dolori forti e frequenti. Le cosce ancora voltate sul basso ventre lo premono violentemente, fanno uscire il meconio, comprimono i vasi, e ritardano la circolazione. In questo caso vi è da temere per la madre le convulsioni, e la rottura del perineo.

§. 616. Se l'operatore vi si trovasse avanti che sieno versate le acque, è meglio che metta in uso l'aiuto della mano, che aspettare l'esito della natura, il quale

quale è molto incerto se sia per essere favorevole (§. 614.)
Laonde

- A Sul momento stesso, che l' umore dell' amnio principierà a perdersi, l' operatore introdurrà la mano nell' utero.
- B Nell' introduzione di questa rispingerà da un lato le natiche del fanciullo, per preparare la strada ai piedi, che esso andrà cercando.
- C Di poi prenderà l' uno, e l' altro piede sopra i malleoli.
- D Volterà il feto sopra la parte sulla quale penderà, e lo estrarrà.
- E Compirà il parto come si è detto al §. 596.
- F Se ciò riescirà molto difficile, i piedi si potranno fermare col nastro, e mentre questo si tirerà si rispingerà il corpo.

§. 617. Se poi il Professore arriverà troppo tardi, o in tempo che l' utero sia fortemente serrato intorno alle natiche del feto, e i dolori si mantenghino ancora in tutto il loro vigore, è migliore espediente ch' ei lasci operare alla natura, che forzare l' utero, con dilatarlo violentemente. Procuri per altro

- A Di rispingere il perineo, e l' osso del coccige, per rendere più ampia l' apertura inferiore della pelvi.
- B Allorchè compariscono gl' inguini del fanciullo, esso porterà uno o due dita, piegate a guisa d' oncinio da ambe le parti nelle piegature, che i medesimi formano, e tirerà con forza e maestrevolmente il feto, prendendo il tempo, che i dolori lo fanno avanzare.

§. 618. Ma se l' azione dei dolori venisse a cessare, o diminuisse per la debolezza della partorienti, non deve starsene nella inazione, ma bensì deve preferire l' opera e l' ajuto delle tanaglie, o di un oncinio a punta ottusa (Tav. XIV. Fig. 3.) e con l' uno, o l' altro di questi strumenti tirare il feto, avendolo investito nella piegatura degl' inguini.

§. 619. Quando l' utero è situato obliquamente, e che si presentano le natiche, ordinariamente una è spinta nell' orifizio dell' utero, l'altra si arresta nel contorno della pelvi. Facilmente si concepisce che un tal parto non si può compire dalle sole forze della natura, perchè la violenza dei dolori sempre più spinge contro gli ossi della pelvi la natica, che è arrestata, e la fa tumefare. Molto meno si deve sperare nell' efficacia della natura, quando cessano del tutto le doglie a cagione di un ostacolo insuperabile.

§. 620. Più sicura cosa è adunque per la partorientente, che il Professore, introducendo immantinentemente la mano nell' utero, prenda la polpa della gamba che si presenta la prima, disimpegni il piede, e nell'atto di disimpegnarlo lo porti sulla banda opposta; in modo che la natica la quale è arrestata si renda libera. In questo caso si ha un parto agrippino, col feto che viene avanti con un sol piede. In questo medesimo caso si afferra il feto per la fura, affinchè si possa smuovere e tirare con maggior forza, e senza timore di rottura.

§. 621. Succede ancora che una natica si arresti nelle ossa del pube, e l'altra nell' osso sacro. In questo caso

- A Senza perder tempo si cercano i piedi del fanciullo, e questo si volta sul suo basso ventre.
- B Se non si possono prender bene i piedi, si sosterranno le natiche con le dita, e portando il pollice nella piegatura degl' inguini, si volteranno le natiche in modo che la faccia rimanga voltata verso l' osso sacro.
- C Qualora le natiche per la forza dei dolori sieno talmente impegnate nella pelvi, che non si possa nè guadagnare i piedi, nè far cambiare situazione al feto, si aspetti per operare, che la forza delle doglie abbia fatto uscire le cosce: allora si deve rivoltare il feto, e far che torni sul suo ventre (§. 596. lett. G).

CAPITOLO XVIII.

SEZIONE IV.

DEL PARTO PRETERNATURALE A CAGIONE
DELLA SITUAZIONE TRASVERSALE DEL FETO

§. 622. **Q**Uando il feto è situato trasversalmente possono presentarsi differenti membra di esso all' orifizio dell' utero. Cioè

- A Il collo.
- B La spalla, e la scapula.
- C Il braccio.
- D Il petto.
- E Il basso ventre, e gl' ipocondrij.
- F Il dorso.
- G I fianchi.

§. 623. Per lo più ancora

A Cala qualche volta il tralcio ombellicale in modo, che non essendo per anco versate le acque, non si può sentire che il solo volume di esse acque rinchiuso nella membrana dell' amnio (§. 594. letr. C.) e lo stesso tralcio dietro all' orifizio dell' utero.

B La donna sente un gran dolore in un lato, il quale non è prodotto da altro, che dalla distensione dell' utero in tal parte.

§. 624. Delle situazioni trasversali, quella suol' essere la migliore, nella quale il feto è voltato per la parte anteriore del suo corpo. Tav. X. Fig. 3. Poichè,

A Con minor difficoltà il professore introduce la sua mano nell' utero.

B Ed i piedi ripiegati sopra il basso ventre si prendono, e si tirano più facilmente.

§. 625.

§. 625. Allorchè il feto è situato trasversalmente, si deve rivoltare per i piedi, acciò si possa estrarre; onde la partoriente si deve collocare secondo le regole sopra esposte al §. 391. e segg. ed introdurre la mano nell' utero (§. 351.); lo che fatto.

- A L' operatore profitterà dell' intervallo, che le doglie lasciano, per introdurre la mano tra il feto, e le membrane, e non abbandonando mai il corpo di esso, lo seguirà lungo il torace ed il basso ventre.
- B Con la mano introdotta rispingerà moderatamente la parte superiore del corpo, che chiude l' apertura superiore della pelvi.
- C Allontanerà dolcemente col dorso della mano l' utero, quando stringesse troppo il corpo del feto.
- D Osserverà di non prendere le mani in vece dei piedi; facilmente si distingueranno dalla loro conformazione, e dalla loro positura.
- E La situazione dei piedi si deve attentamente esaminare. Quando i piedi sono posti sul basso ventre, si tirano a dirittura; quando poi sono piegati sul dorso, (Tav. XII. Fig. 1.) prima di tirarli si rivoltano sul basso ventre, poichè il dorso non si può piegare indietro (§. 78.).
- F Ogni qualunque volta che si può far ciò, il feto si deve estrarre per ambidue essi piedi, osservando, che mentre si mettono insieme i piedi per rirarli, non resti serrata fra le gambe qualche altra parte del corpo. Se poi non si potesse fare la detta unione dei piedi, si dovrà esser contenti di uno di essi.
- G Avanti di tirare il feto nella detta maniera per un piede, si cerchi di liberare anche l' altro, arrestato forse e trattenuto dalla parete dell' utero.
- H Avanti di cominciare l' operazione, il Professore esamini con la mano introdotta nell' utero se il feto sia vivo, o morto (§. 388.).

§. 626. Accorso che egli sia, faccia l' operazione più pre-

presto che sia possibile , e nello stesso tempo in cui si rompono le membrane . Anzi talora conviene che egli stesso le rompa ; imperciocchè in quel tempo l' utero non anco fortemente stringe il feto , nè la parte con la quale viene innanzi trovata ancora introdotta nell' orifizio . L' angustia della pelvi accresce ancora molto la difficoltà dell' operazione (si consulti il §. 598. e segg.).

A §. 627. Se le membrane non sono per anco rotte , Si prenderanno le medesime fra l' indice , ed il pollice , e si romperanno , profittando degli sforzi della madre ; o si foreranno con un ago molto lungo , o con un ago inguainato e corredato di molla , condotto con la guida della mano già introdotta nell' utero , quando non si sieno potute aprire colle dita .

B Per l'apertura fatta nelle membrane s'introdurrà tosto la mano , che ferrava la bocca dell' utero , andando con essa a cercare i piedi del feto , i quali trovati , per mezzo di essi si estrarrà .

C Quando si possa ottenere , si cerchi che i piedi del feto guardino con i calcagni la palma della mano dell' operatore , acciò voltato esso sul suo ventre si possa tirar fuori .

§. 628. I. Il *collo* ordinariamente per se stesso non si può distinguere , ma bensì per le parti adiacenti , quali sono il mento , la faccia , le orecchie , la nuca , l' occipite , la scapula , la clavicola , e le vertebre .

§. 629. Se per troppo lungo tempo il collo resta trattenuto e forzato sull' orifizio uterino , esso collo si allunga , il capo alquanto si allontana , i vasi sono compressi , s' interrompe la circolazione , la faccia si gonfia , e il feto muore .

§. 630. Laonde quanto più presto si può si cerchino i piedi del feto , e per questi si volti ; se poi questo rivoltamento non si può fare , si deve respingere il

il petto , affinchè si presenti la faccia , la quale presentata che si sia si deve deprimere la fronte .

§. 631. II. La *spalla*, e la *scapula* Tav. XI. Fig. 2. si conoscono alquanto per la propria configurazione, o struttura, e per le parti adiacenti ancora , come sono il collo, le vertebre, e le braccia .

§. 632. Sollecitamente si deve aiutare il parto colla mano , avanti che la forza dei dolori abbia fortemente impegnato nell' orifizio dell' utero quella parte del feto , colla quale si presenta .

§. 633. III. Le differenti parti del *braccio* possono pure presentarsi nella situazione , tanto naturale , che trasversale del feto, nella dirittura o obliquità dell' utero , e presentarsi tanto sole, che combinate con altre parti , come per esempio con la testa , con i piedi , e con il cordone ombelicale .

§. 634. Qualche volta la sola natura compisce il parto , nel caso che si presenti la mano con la testa . Quando poi vien fuori o sola , o con altra parte del corpo , indicante situazione trasversale nel feto , il parto non può essere ultimato senza il soccorso dell' arte (§. 625) .

§. 635. Quando adunque l' utero è nella situazione retta , e si presenta la testa unita all' estremità di una mano , tanto poco è lo spazio occupato da essa mano , che questo parto con sicurezza si può abbandonare alla natura .

§. 636. Se poi l' utero è situato obliquamente , sul principio , cioè avanti che si rompano le membrane , a traverso di esse si sente la sola estremità della mano , ma dopo lo spargimento dell' umore dell' amnio , per la violenza dei dolori è spinto avanti tutto il braccio Tav. XI. Fig. 1., la testa è portata verso un lato , e l' utero diviene più obliquo . Onde la naturale azione dei dolori nuoce più di quel che giovi , e non rimane altro soccorso se non quello dell' arte .

§. 637.

§. 657. Nella situazione retta dell' utero ancora, presentandosi la testa col *braccio intero*, ella si discosta dall' asse; perciò anche in questo caso è d' uopo che il Professore metta in opera quelli ajuti, che l' arte gli suggerisce.

§. 638. Succede del *gomito* lo stesso, che del braccio intiero, potendo totalmente uscire per lo sforzo dei dolori. Allorchè il braccio rimane piegato per l' avanti sopra la spalla, lo spazio diviene più angusto, e la situazione diventa peggiore.

§. 639. Se mai il tralcio esce nel medesimo tempo, come spesso accade, questo parto non solo non si deve rilasciare alla natura, ma bensì estrarre il fanciullo prima che si possa, per timore che la testa non comprima il tralcio, e quello muoia.

§. 640. Pertanto ne' casi accennati al §. 634. e 635. e segg. il feto si deve estrarre per i piedi (§. 625. e seg.). L'operatore introducendo la mano distesa nell' utero con la palma voltata verso il feto, molto facilmente con essa incontra il petto del medesimo.

§. 641. Ma può accadere che prendendo il fanciullo per un piede, o per tutti due insieme ancora, il corpo del medesimo non venga fuori, a motivo della testa arrestata dalle ossa del pube, o perchè uno dei bracci si trovi inserito, e stretto fra le sue cosce. In questo caso certamente per estrarre il feto

A Bisogna legargli con un nastro uno, o tutti due i piedi;

B E con la mano introdotta nell' utero rispingere il feto verso la parte contraria a quella del piede, per cui si pensa tirarlo; facendo risalire verso il fondo dell' utero la spalla, e il petto del medesimo.

C Con l' altra mano poi è espediente tirare il nastro fuori dell' utero, al quale sono legati i piedi.

§. 642. Il nastro

- A Sia di seta , e con stropicciarlo , e batterlo gli si tolga la incartatura, o rigidità che potesse avere ; sia più lungo di due piedi , e poco più stretto di un pollice ; e in una dell' estremità abbia un foro bislungo .
- B Avanti di adoprarlo si unga con olio .
- C Indi si faccia passare l' estremità non bucata per quella forata , e si formi una specie di fionda .
- D L' operatore tenga questa fionda con la mano destra in modo , che due o tre delle sue dita restino dentro il nastro , e l' indice e il minimo , o auricolare , lo tenghino o stringhino per di fuori .
- E Così accomodata e tenuta la fionda si porti ad un piede , ovvero a tutti due insieme , mentre la sinistra mano terrà l' altra estremità del nastro .
- F Dopo che con maestria farà essa fionda condotta sopra i malleoli del piede , o come si è detto di tutti due i piedi , con la mano destra si terrà ferma nel posto ove deve stare , e con la sinistra si tirerà , e ferrerà .
- G Il portare il nastro nell' utero sopra i piedi per mezzo di piccole guide di legno , secondo il metodo SIGMUNDIANO , il quale fu ingegnosamente corretto da PUGH , e WALBAUM , rende senza necessità l' operazione lunga , e tediosa .
- §. 643. Gl' imperiti con opera gettata , ed anco nociva , tentarono di rispingere nell' utero la mano ; imperciocchè da per se ella risale , tosto che il feto è stato voltato , e si estrae per i piedi .
- §. 644. Neppure si deve tagliare il braccio , se non v' è una estrema necessità . Questa mutilazione disfigura il fanciullo allorchè sopravvive , e lo rende oggetto compassionevole morto . Molto meno si deve tirare il braccio con l' intenzione di liberare il feto , posciachè sempre di più si viene a impegnare il petto di esso nella pelvi , e facilmente il braccio si stacca dal resto del corpo .

§. 645. Quando si può prendere il feto per tutti due i piedi, si suole estrarre felicemente. Quando non se ne possa prendere che uno, si deve cercare e prender quello, che è dalla parte opposta al braccio uscito fuori.

§. 646. Se poi per disgrazia sia passato lungo spazio di tempo dacchè il braccio è escito fuori, o questo sia stato tirato violentemente (§. 644.) e perciò l'utero con molta forza tenga stretto il feto, in modo che una parte ancora del petto resti impegnata, e ritenuta nell'orifizio dell'utero, senza che si possa con forza alcuna penetrare con la mano tra l'utero, e il corpo del feto, non vi rimane altra speranza che di mettere in pezzi il feto.

§. 647. Accade ancora che escano insieme tutte due le mani, e in mezzo di esse la testa. In questo parto

A La natura è sufficiente per liberare la donna, qualora il capo sia piccolo, ben situato, e la pelvi ampia.

B Qualora poi questa sia stretta, il capo troppo grande, o situato obliquamente, il feto si deve voltare per i piedi.

C Quando l'azione dei dolori abbia impegnato sì fortemente la testa dentro la pelvi, che non si possa in alcun modo arrivar' a prendere i piedi, si deve estrarre il capo, dopo averlo vuotato del cervello.

§. 648. Quando le braccia nell'escire sono incrociate talmente avanti la testa, che nè le braccia, nè il capo possano ulteriormente scendere, si deve estrarre il feto per i piedi, poichè la testa coll'ajuto del nastro non può in tal maniera venire (§. 641.).

§. 649. IV. Il *petto*. Le parti ancora contigue ad esso, e specialmente le costole fanno conoscere il petto.

§. 650. In questo caso ordinariamente si rivolta il feto. Quando i piedi sono piegati sul suo ventre, tal cosa riesce molto facile, mentre si prendono, si tirano, e felicemente si fa l'estrazione del feto.

§. 651. Quando poi sono ripiegati sul suo dorso, come non di rado accade, si devono avere le appres-
so cautele.

- A Bisogna introdurre la mano lungo l' osso sacro fin sotto gl' ipocondrij del feto, in modo che la palma guardi il feto, ed il dorso l' osso sacro della madre.
- B Si piegherà in alto, e si prenderà la coscia che corrisponde al piede superiore, o più lontano.
- C L' operatore volterà e abbascerà essa coscia, e la farà sdrucchiolare in giù verso il carpo della sua mano.
- D Estrarrà il feto nella consueta maniera.

§. 652. V. Lo stesso metodo tenuto riguardo al petto, si deve tenere allorchè si presentano gl' *ipocondrij*, e il *basso ventre*. Se il feto è situato in questa maniera, il cordone ombellicale suole uscir fuori quasi sempre, di modo che comparendo, è segno presentarsi il feto sicuramente col basso ventre (Tav. XII. Fig. 1.)

§. 653. La distinzione, che passa tra il feto idropico, e la vescica formata dalle acque, consiste

- A Nel sapere che l' umore dell' amnio è uscito.
- B Nel non osservare manifesto e grande ondeggiamento di fluido (§. 180.).
- C Nell'imbattersi a trovare, andando avanti col dito per spiare la grandezza del tumore, il petto, o le parti genitali;

§. 654. Rare volte il basso ventre e gl' ipocondrij restano impegnati nell' orifizio dell' utero, onde acciò si possa riscontrare la parte, che si presenta all' orifizio, si deve introdurre tutta la mano nella vagina. Per la medesima ragione se l' umore dell' amnio (§. 72.) presto si sparse, la bocca dell' utero si trova poco dilatata.

§. 655. VI. Il *dorso* (Tav. XI. Fig. 3.) si distingue mediante la colonna delle vertebre, e per non si trovare in vicinanza quella parte dalla quale ha origine il cordone ombellicale.

§. 656. Quando i piedi sono ripiegati sopra il dorso, sono comodi a prenderli, ma non bisogna tirarli per diritto, poichè il corpicciuolo non si può piegare indietro; si devono guadagnare le ginocchia, e secondo che si presenta il dorso all' orifizio dell' utero, o col suo centro, o piegato verso l' alto, o verso il basso, bisogna girare e voltare i piedi, ora in sù, ora in giù, acciò mediante i medesimi si possa interamente rivoltare il feto, e comodamente tirarlo fuori.

§. 657. Se in questa maniera il feto non viene, si deve estrarre per mezzo del nastro avvolto ai piedi di esso (§. 642.).

§. 658. Allorquando i piedi sono ripiegati sul suo basso ventre, s' introduce la mano nell' utero, lungo la parte posteriore della vagina, portandola sotto gl' ipcondrij, ed il rimanente si compisce nella maniera descritta al §. 651. Se mai il feto puntasse full' osso sacro, bisogna portare la mano nell' utero accolto alle ossa del pube.

§. 659. VII. Più difficilmente si conoscono i *fianchi*, quando si presentano, nè si conoscono se non dalle parti contigue ad essi; per esempio dalle natiche, dalle ginocchia, dai lombi ec.

§. 660. In questo caso non vi è altro compenso che estrarre il feto per i piedi, e ciò si può fare facilmente, se per anco non è uscito tutto l' umore dell' amnio: perchè i piedi essendo più vicini, si prendono facilmente. Difficilmente però si ottiene l' intento, se l' utero stringe fortemente il feto. L' operatore soprattutto si guardi di non lasciare in braccio alla natura, per qualunque difficoltà che gli si presenti, un parto, che essa natura non può mai effettuare.

CAPITOLO XVIII.

SEZIONE V.

DEL METODO DA TENERSI PER ESTRARRE IL CAPO
STACCATO DAL CORPO, E RESTATO NELL' UTERO.

§. 661. **A** Llorchè si tira il feto per i piedi, se il capo è troppo grosso, o colimento è arrestato nelle ossa del pube, incontra tanta difficoltà a uscire, che si ricerca una somma prudenza nell'operatore per liberarlo, e tirarlo fuori (§. 597. e segg.). Quando al contrario,

A Senza la dovuta circospezione, ma violentemente si tira il feto, le parti che uniscono il capo col collo, o che collegano le vertebre cervicali fra di loro, si intrappano, e non si tira fuori altro che il tronco, rimanendo nell' utero la testa.

B Questo accidente può succedere al più abile Professore, quando il feto è putrido, o macerato, ed i ligamenti pure sono molto gracili e deboli.

C La stessa debolezza di fibre nei ligamenti si trova tanto nell' aborto, quanto nel feto che nasce avanti il tempo.

D Il capo ancora può restare nell' utero, se il feto si taglia in due parti, e si estraè l' inferiore prima della superiore.

§. 662. Raro è che il capo restato nell' utero sia mandato fuori dalla forza dei dolori. Perchè

A Quando il capo è troppo grande, le doglie lungi dal mandarlo fuori, piuttosto lo trattengono; perchè presentandosi l' occipite, il fondo dell' utero comprime gli ossi del vertice, e rendendoli appianati, fa che occupino maggiore spazio (§. 252. lett. C). E

B E allorchè il mento è arrestato nelle ossa del pube, l'azione delle doglie ve lo impegna maggiormente, ed impedisce il di lui avanzamento.

§. 663. Quantunque ancora i dolori fossero efficaci, mal si farebbe di affidarsi ai medesimi, perchè la donna si trova estremamente indebolita dal parto contro natura, che ha preceduto. Se l'utero viene a ferrarsi, e se la placenta, essendo tutta o in parte staccata, cagioni una emorragia, i dolori operando con minor forza non producono altrimenti effetto alcuno, e per poco che si tardii non vi rimane altro scampo.

§. 664. Adunque se i dolori non continovano vigorosi, o interrompendo non ricompariscono egualmente forti, non vi è luogo in verità a poter lasciare l'espulsione del capo alla natura, ma più presto che sarà possibile si deve con l'arte estrarlo, massimamente se vi fosse perdita di sangue, acciò la madre non perisca miseramente di emorragia.

§. 665. Molto lontano è ancora che i medicamenti irritanti producano qualche giovamento, posciachè piuttosto infinitamente nucono, spingendo gran quantità di sangue all'utero, accendendo la febbre, e rendendo l'utero teso, ed infiammato.

§. 666. L'opera della mano, e nei casi più gravi gli strumenti, possono essere utili. Allorchè per altro il capo è levigato, e rotondo, con le incavature non abbastanza falde per poter sostenere l'azione delle dita, che piegate a forma d'uncino debbono potervisi adattare ed insinuare, rendono difficile la presa del capo, tanto più tal difficoltà cresce, se l'orifizio dell'utero sia molto ferrato. Per la qual cosa l'operazione riesce più facile e perfetta, quando si fa subito nel tempo che le parti sono per anco aperte.

§. 667. La stessa operazione si eseguisce col seguente metodo.

Si

A Si comincia dal tagliare il cordone ombellicale, e ponendo da parte il tronco del fanciullo, si lascia la placenta nell' utero.

B In qualsivoglia operazione un assistente comprima leggermente il basso ventre, acciocchè l' utero non torni indietro dall' apertura della pelvi.

C S' introduca la mano nell' utero col metodo descritto al §. 351.

D Se il capo è malamente situato, si volti in modo, che la faccia rimanga discosta dalle ossa del pube.

E S' introduchino, se è possibile, le dita indice e medio nella bocca di esso, il pollice si collochi sotto il mento verso l' occipite, e gli altri si accomodino dai lati per modo, che resti fortemente tenuto.

F Preso così possesso del capo, si smove, ma senza violenza, e si estrae. Impiegandovi gran forza non si ottiene l' estrazione di esso, ma bensì gli si rompe la mascella inferiore.

§. 668. Se questi indicati mezzi non sono sufficienti, si ricorra ai seguenti, che sogliono giovare.

A Si ponga il pollice sopra la faccia.

B Il dito medio e l' indice s' introduchino per la bocca fino all' occipite.

C Il medio s' insinui dentro al gran forame occipitale, se non vi si oppone impedimento alcuno per causa delle vertebre.

D Dopo aver preso bene in tal guisa il capo, smovendolo e girandolo si estrae.

§. 669. Qualora poi l' appoggio della bocca o sia della mandibula venga a mancare, o per esser rotta, e non si possa introdurre il dito nel canale delle vertebre rimaste, bisogna aspettare il ritorno delle doglie, o prendere il capo colle Tanaglie. Le *Tanaglie lunghe, e curve* descritte al §. 440. sono state immaginate singolarmente per questo effetto. Il tire-tete a tre branche di M. LEVRET può in questo caso egualmente servire.

§. 670.

§. 670. Siccome poi la eccessiva mole del capo richiede esser diminuita, questa diminuzione si fa nella seguente maniera.

A Si conduce la sommità del capo all' orifizio dell' utero, ed ivi si tiene fermo con la mano stata introdotta, e mediante la direzione del dito indice s'introduce lo strumento.

B Si apre il cranio col metodo descritto al §. 442. e segg., e si vuota del cervello.

C Uscito che sia il cervello, s'introducono le dita nell' apertura già stata fatta, e con l' ajuto di esse si estrae il capo.

D Se ciò non si può fare, si ricorre alle tanaglie, ovvero all' oncinio, introducendo questo o nell' apertura stata fatta nel cranio, o nel gran foro occipitale, e con questi strumenti si tira fuori il capo.

§. 671. Supposto che la sommità del capo non si possa condurre fino alla bocca dell' utero, per applicarvi lo strumento perforatore,

A Si deve dirigere detta sommità del capo verso l' uno, o l' altro lato della pelvi.

B Si deve forare coll' introduzione di un oncinio appuntato.

C Si deve indi tirare a se l' oncinio, per accrescere l' apertura, affinchè il cervello esca più facilmente.

D S' introduca la mano per dirigere lo strumento, e difendere le parti genitali.

E Mentre una mano tira l' oncinio, l' altra tenga ferma la testa, prendendola per la mascella inferiore, osservando che la medesima non cangi situazione.

Allorchè si negligentano le precauzioni sopra descritte, gli oncini non servono a nulla; perchè quando la testa è arrestata, la loro applicazione è perniciosa, (§. 448.) e molto più lo è quando ella è movibile.

§. 672. Per estrarre il capo che è restato nell' utero

- sono stati inventati diversi altri strumenti , quali sono ,
- A Il *Tira-testa* di M. MAURICEAU , e di M. BURTON , (§. 447. lett. B) i quali possono essere inutili, se non si fa uscire il cervello ; nulladimeno sono più adattati nel caso del capo rimasto solo , che quando debbono estrarre il capo intiero unito al resto del corpo del feto .
- B La *Borsa* di M. GREGOIR , e di M. AMAND sarebbe comodissima per estrarre il capo , se la di lei applicazione fosse tanto facile , quanto è ingegnosa per l'invenzione . Premendo ancora il cranio nel vertice , ne viene ad aumentare la larghezza (§. 662.) .
- C La *Fionda* di M. MAURICEAU , di M. WALDGRAVE , di M. DYONIS , di M. VANDER-STERREN , di ROGIER , di ROONHUYSEN , di CHIAPMANN , e di PLEVIER , hanno il medesimo difetto . Tra queste si può annoverare ancora la fionda descritta dal RATHLAW .
- D Le *legacce* elastiche di M. SMELLIE , e di BURTON sono di un più facile uso , e fanno presa sul capo , quando non è o fissato , o fermo .
- §. 673. Allorchè il capo è putrefatto , di rado si estrae intiero , ma per lo più in pezzi , mediante l' opera ripetuta della mano .

CAPITOLO XIX.

DEL PARTO DIFFICILE , E PRETERNATURALE A CAGIONE
DEL VENIR FUORI IL TRALCIO OMBELICALE .

- §. 674. **I** L tralcio altrimenti detto *funicolo* ,
- A Può venir fuori solo , o con qualche altro membro , per causa della positura trasversale del feto (§. 623.) .
- B Più spesso però viene fuori se è troppo lungo , ed il capo sia situato obliquamente .

C Ma quando la testa del feto si trova in situazione retta, è molto raro ch' egli esca avanti di quella qualunque lungo, se le acque dell' amnio sono copiose.

§. 675. In qualunque maniera esca il primo, l'aria, e la compressione che soffre, molto lo danneggiano. Quando comincia a cessare in esso la pulsazione, il feto soffre indebolimento; quando poi sia passato lungo tempo dalla cessazione del battito, il feto sicuramente è morto.

§. 676. La testa essendo dritta,

A Se l'orifizio dell' utero è affatto aperto, avanti che si rompano le membrane, e i dolori sieno forti, e frequenti, riesce vano ed inutile qualunque soccorso si potesse apportare. Il feto certamente nasce debole, ma nientedimeno con facilità si ristora (§. 407.).

B Quando poi i dolori sono lenti, il mezzo più pronto per compire il parto, è quello di estrarre il capo colle tanaglie.

§. 677. Se il feto è situato trasversalmente, si deve estrarre per i piedi, con l'avvedutezza di rimetter dentro il cordone, acciò il medesimo non venga ad esser premuto fra la mano, e il corpo del feto.

§. 678. Lo stesso si faccia tutte le volte che esce fuori il cordone, trovandosi il capo in situazione obliqua, eccettuato il caso di una tanto piccola obliquità, in cui con minor briga si possa condurre e tener fermo esso cordone dietro al capo con due dita.

§. 679. Allorchè il capo sigilla la capacità della pelvi, che non sia permesso il girarlo, si deve cercare di portare il cordone su quella parte nella quale la testa lascia qualche spazio (§. 8.); ordinariamente però in queste circostanze il feto si cava fuori morto.

CAPITOLO XX.

DEL PARTO DIFFICILE , E PRETERNATURALE
PER MOTIVO DI PERDITA DI SANGUE.

§. 680. **N**El tempo del parto molte sono le cause che possono produrre una perdita di sangue pericolosa ; ma la più frequente è quando prima del feto *si presenta la placenta* . Imperciocchè quantunque nella situazione retta dell' utero , la placenta soglia essere attaccata al fondo del medesimo : nulladimeno si osserva qualche volta essere attaccata ai lati, e fino alla stessa cervice dell' utero , anzi che alle volte si osserva la medesima essere attaccata al collo istesso .

§. 681. Se ciò accade, i seguenti accidenti ne danno indizio .

A Quando si riscontra la gravida negli ultimi mesi, non si sente col dito il capo , quantunque l' orifizio sia situato nell' asse della pelvi ; ma dietro al segmento inferiore dell' utero si tocca un corpo spugnoso, che agli inesperti comparisce una mola .

B Avvicinandosi maggiormente il tempo del parto, all' improvviso e senza cagione alcuna conosciuta succede uno sbocco di sangue non grande, e che cessa immediatamente .

C Succede indi altro sbocco più copioso, e di durata maggiore .

D Ne sopraggiungono finalmente altri sempre più copiosi, più frequenti, e più lunghi .

E Quando vengono i veri dolori del parto, la perdita è quasi continova, escono dei grumi di sangue, ed il feto muore ; la madre pure corre rischio di morte quando il feto non sia mandato fuori assai presto,
fia

sia dalla natura, o sia per mezzo degli ajuti dell' arte. I segni che annunziano il pericolo nel quale ella si trova sono la diminuzione dei dolori, o la loro totale cessazione, il freddo dell' estremità, l' offuscamento degli occhi, il polso debole, frequente, ed intermittente, i deliquj, le agitazioni, le smanie, i sudori freddi, le convulsioni. Non di rado accade che le donne sieno sorprese da convulsioni, e sircopi mortali. Altre finalmente muojono per debolezza nel puerperio.

F Una emorragia anticipata spesso produce un simil parto.

§. 682. Questa emorragia nasce dai vasi dell' utero aperti, per essere la placenta in tutto o in parte staccata, lo che certamente suole accadere per la dilatazione del segmento inferiore dell' utero imminente il parto, e da ciò nasce che la perdita del sangue sia più abbondante nel tempo che i dolori producono questa violenta separazione. Prima che sopravvenga l' emorragia, bene spesso si tocca il corpo spugnoso della placenta, e si può anche in questa specie di parto sentire colle dita la di lei adesione coll' utero verso il segmento inferiore.

§. 683. Questa sorte di accidente non si può attribuire al distaccamento della placenta dal fondo dell' utero, nè alla sua calata nel di lui orifizio; imperciocchè non si vede quale sia la cagione atta a staccare tutta la placenta, nè quale strada possa prendere per arrivare all' orifizio senza offesa delle membrane; senza fondamento di ragione viene attribuita tal coesione al coagulo del sangue (§. preced.).

§. 684. Vi sono dei casi nei quali la placenta ferra l' orifizio dell' utero, e questi sono i più pericolosi; meno pericolosi poi sono quelli nei quali ella è aderente al collo, lateralmente all' orifizio; e secondo questi casi variano i pronostici, ed i soccorsi.

Quan-

A Quando si stacca una piccola porzione della placenta dall' utero, ne nasce una piccola emorragia, le forze della madre e dei dolori sono vigorose, e l' utero insieme col feto è situato bene, il caso è meno pericoloso, e si può sicuramente lasciar' operare alla natura.

B Qualora poi si sia staccata una porzione maggiore della placenta, sia molto tempo che si versi il sangue, i dolori sieno deboli, le forze della madre illanguidite, e tanto l' utero, che il feto, si trovino in cattiva situazione, senza dubbio bisogna ricorrere all' ajuto dell' arte.

§. 685. Pertanto si deve prontamente estrarre il feto; ma avanti di venire a questo, vi è da fare qualche osservazione sulla placenta.

A Se sia di già tutta staccata, sia arrestata nella vagina, e si opponga al passaggio della mano, si deve tirar fuori insieme con i grumi del sangue accagliato, che riempiono e otturano essa vagina.

B Ma se l' introduzione della mano non è difficultata, si lasci pure la placenta, acciò si chiuda quella strada; per la quale il sangue e l' umore dell' amnio, che distendono l' utero, potrebbero uscire.

C Ogni volta che la placenta, o tutta, o in parte, si mantiene aderente all' utero, più vantaggiosa cosa è sempre per la madre e per il feto il lasciarla.

§. 686. Quando si deve procedere all' operazione, ecco come si eseguisce.

A La donna stia per quanto è possibile quieta, e ferma, e non sia da calore artificiale riscaldata.

B Le s' introduca la mano nella vagina fino all' orifizio dell' utero, e si esami in qual luogo la placenta sia staccata.

C Siccome esso orifizio è ordinariamente dilatato, o facilmente può dilatarsi, s' introduca la mano a poco a poco, e si allarghi, e si scostino le membrane si-

no a tanto che tutta la mano non resti introdotta.

D Dopo aver rotte le membrane (§. 627.) la mano si porti subito ai piedi , e si tirino , benchè il capo posi sopra la pelvi .

E Se a caso non si possono arrivare i piedi , lo che succede di rado , si può tirare il capo colla tanaglia .

F Se il fanciullo estratto è vivo , si deve ristorare esso e la madre con cose leggiere , nutritive , e corroboranti (§. 407.) . Talora la madre , benchè debolissima e quasi senza polso , vien ristorata e salvata , e parimente si ravviva il feto quantunque paja morto .

§. 687. Si propongono ancora altri metodi per un parto così pericoloso .

A Con gli astringenti si perde il tempo .

B Se foriamo la placenta , o le membrane , per dare esito all'umore dell'amnio , facciamo certamente nell'utero uno spazio , il quale facilita la di lui contrazione , e per conseguenza il ristringimento dei suoi vasi aperti ; l'emorragia diminuisce alquanto , ma sussistendo sempre la cagione che la produce , ella ricomincia ben presto , ed il parto naturale che ne segue è più lento .

C Il Sig. PUZOS non approva il parto eseguito per mezzo dell'arte , perchè teme , contro l'esperienza , d'una emorragia continovata , per cagione di tal parto precipitoso ; poichè i vasi non si chiudono con egual prontezza . Perciò preferisce il parto naturale , ed unicamente ajutato con dilatare la bocca dell'utero nell'uscita che fa il feto , mentre escendo il feto in tal modo naturalmente , e senza violenza , anche i vasi dell'utero si chiudono a poco a poco : immaginandosi che per quanto il feto sta nell'utero , i medesimi sieno come ermeticamente chiusi dal di lui corpo .

§. 688. Vi sono altre cause , che nel tempo del parto producono l'emorragia . Tali sono ,

La

- A La rottura del cordone ombellicale .
- B La rottura di qualche vaso grande dell' utero .
- C Il distacco di una parte della placenta medesima dall' utero .


Tali cagioni si conoscono e si distinguono , dalla placenta quando si presenta la prima , dal non esservi nel collo dell' utero attaccato alcun corpo spugnoso , e per l' emorragia che segue nell' atto stesso del parto .

§. 689. A. Quando l' emorragia è abbondante , la sola estrazione del feto può rimediarvi .

- B Quando poi , essendo il parto per tutto il resto naturale , la perdita del sangue sia moderata , e le forze della partoriente e dei dolori sieno in vigore , giova aiutare il parto naturale della seconda e terza specie ; negli altri casi poi si deve voltare il feto per i piedi .

C A P I T O L O X X I .

DEL PARTO DIFFICILE , E PRETERNATURALE A CAGIONE DELLE CONVULSIONI CHE SOPRAGGIUNGONO ALLA PARTORIENTE .

§. 690.  Ordinariamente sogliono essere molestate da questo parto quelle donne , che naturalmente sono soggette alle convulsioni , come le pletoriche , le isteriche , le febbricitanti , e le troppo delicate , le quali si conosceranno dal noto loro temperamento .

§. 691. La pletora specialmente si conosce da' suoi propri segni generali , primieramente dal polso della partorientee pieno , dalla faccia colorita , dal non essersi fatta cavar sangue in tutto il tempo della gravidanza , e dall' abbondante mestruazione che soffriva avanti d' ingravidare .

§. 692. Generalmente le donne sono soggette alle convulsioni più nel primo , che negli altri parti.

§. 693. Diverse sono le cause, che risvegliano queste convulsioni nelle partorienti . Tali sono la grandezza e obliquità della testa del feto , la grandezza delle sue natiche , allorchè sono le prime a presentarsi, il feto putrido , la scarsa quantità dell' umore dell' amnio , la forza grande e precipitosa dei dolori, la lentezza del parto cagionata per esempio dal tralcio avvoltato intorno al collo del feto, la soppressione dell' orina , che si distingue dai dolori violenti nella regione del pube , e dalla funzione d' orinare sospesa , qualche lesione dell' utero cagionata dall' imperizia di chi opera , le violente agitazioni del corpo , le gravi passioni dell' animo , come farebbe l' ira ec.

§. 694. Anche ad una moderata perdita di sangue sogliono esservi congiunte pericolose convulsioni ; si consulti il Capitolo precedente .

§. 695. I segni che annunziano le prossime convulsioni sono: un acerbo dolore di capo ; il delirio ; i frequenti tremiti e dibattimenti ; un vomito violento di più giorni , e che dura fino al tempo del parto ; i leggieri sussulti dei tendini ; e i dolori acuti che la tormentano .

§. 696. Ordinariamente le convulsioni assaliscono repentinamente le partorienti, e si uniscono di tratto in tratto coi dolori , per modo che con difficoltà da quelli riesca distinguerle . Per il solito sono simili alle epilettiche, poichè le partorienti dibattono le mani , scalciano coi piedi , si rivoltano con impeto , e talora con tal forza , che difficilmente si possono tenere ; mandano fuori degli urli straordinarj ; storcono gli occhi ; ruffano ; fanno spuma per bocca , e nei casi forti si mordono anche la lingua ; il parto si effettua in tali circostanze senza che la donna se ne avvegga ;

alcune volte questo parto è lento , e dura più di un giorno , altre poi le dette convulsioni cessano un' ora , o due avanti il momento del parto .

§. 697. Questa specie di parto varia molto , sia per riguardo alla sua durata , sia a riguardo delle conseguenze . Tutto succede felicemente quando non sopraggiunge qualche sinistro accidente, come per esempio

- 1 In alcune donne si uniscono ai dolori le convulsioni ; mentre in altre queste mancano totalmente . Se esse convulsioni non sieno molto frequenti , e gl' intervalli che lasciano sieno con buona quiete e chiarezza di mente , finito il parto cessano immediatamente , e la mente torna stabilmente chiara . La puerpera resta sana , e salva .
- 2 In altre tutto accade come nel caso suddetto , fuorchè la permanenza della donna nell' alienazione della mente per qualche spazio di tempo finito il parto . Egualmente però anche questa resta salva .
- 3 Scampa ancora nel caso più forte , quale è quello di perdere essa ogni conoscimento negl' intervalli dei dolori , e di restare in un profondo sopore dopo il termine del parto , il qual caso però è molto raro .
- 4 Quella che nel mezzo ai dolori perde affatto la cognizione , e resta come stamortita compito il parto , sia poi questo naturalmente , o per mezzo dell' arte , continuano le convulsioni , le inquietudini , il vomito , l' assopimento , molto più se il feto restò putrido nell' utero , e abbia comunicato alla madre gli effetti della sua corruttela ; e se dopo essersi sgravata comparissero dei deliquj , l' estremità fredde , offuscamento di occhi , contrazione di polso , sospensione , o intermittenza del medesimo , dolore dei lombi , sudori freddi , singhiozzo , deliquio , e sopore , muore apopletica .
- 5 La donna costituita nelle circostanze del caso o grado antecedente , ed accompagnata da segni cattivi , muore avanti che venga a capo di partorire .

- §. 698. Nel primo e secondo grado ,
- A Se non accade niente di sinistro si può abbandonare tutta l'opera alla natura .
- B Si può rimediare alla pletora , e all'estrema sensibilità della donna colla cavata del sangue , la quale si replicherà occorrendo ; con gli attemperanti ed emollienti , con i leggieri anodini , e usati tanto internamente , che esteriormente in forma d'infusioni , e di cataplasmi .
- C Se il parto è difficile , si conduce secondo le regole insegnate di sopra .
- D Si rimedia alla soppressione dell'orina col discostare il capo dagli ossi del pube , oppure col mezzo della sciringa (§. 506.) .
- E La donna tenga tanto il corpo , che l'animo in molta quiete , e non accresca la violenza dei dolori con sforzi volontarj .
- F La partorientesi si tenga ferma ad ogni comparsa o ritorno di convulsioni .

§. 699. Se questi mezzi non sieno punto bastanti , ma le convulsioni si vedano più tosto crescere , e l'accompagnamento degli altri segni minaccino i gradi ulteriori e peggiori , allora non vi rimane altra speranza (e questa non anche di sicuro e ottimo successo) che nella liberazione o uscita del feto , sia naturale o artificiale . Per la qual cosa essendo le cose in sul principio , e avanti che simil treno di mali opprima la partorientesi , e ammazzi il feto , miglior consiglio è quello di estrarlo . Venuto fuori il feto resta tolta ogni causa d'irritazione .

§. 700. Sebbene poi saviamente si volti il feto per i piedi , accade tuttavia , che si debba prendere e tirare il di lui capo colle tanaglie , quando fortemente l'utero lo stringa . Se la calvaria sia eccedentemente grande , è espediente vuotarla del cervello . L'opera-

tore in tal caso faccia ciò nell' intervallo dei dolori , e delle convulsioni ; e quando essi dolori o le convulsioni prendono vigore , ed in conseguenza l' orifizio dell' utero si stringe , ritiri la mano , o avendola introdotta la lasci nell' utero immobile . Questa operazione richiede molto coraggio .

CAPITOLO XXII.

DEL PARTO DEI DUE FETI.

§. 701. **D**ue feti , che nel tempo stesso sieno stati concepiti nell' utero , si chiamano *gemelli* . Crescono ivi insieme , e devono venire parimente nello stesso tempo alla luce . L' esperienza ci rende informati , che talora se ne generano insieme anche tre . Molto raro poi è che se ne ingenerino quattro embrioni , o maggior numero .

§. 702. Avanti il parto è molto difficile a conoscersi il numero dei feti esistenti nell' utero . Gli embrioni immersi nei rispettivi loro umori talmente sono fra di loro accosti e situati , che distendono l' utero senza lasciare ineguaglianza alcuna . Perciò spesse volte le donne portano due o più feti nell' utero egualmente disteso , come quando ne contiene un solo . In vano nelle gravide di due feti si cerca il solco , o la fossetta , che divida in due parti il basso ventre , egualmente che le due prominenze nella regione degli ipocondri ; anzi una tal fossetta si vede bene spesso nel basso ventre delle gravide di un feto solo .

§. 703. Neppure una gran mole del ventre denota esservi due feti . La copia dell' umore dell' amnio , il feto grande più del consueto , e similmente la seconda
mol-

molto grossa rialzano in tal maniera il basso ventre. Il feto, e la seconda piccola, e la minor copia dell'umore dell'amnio lo tengono molto minore.

§. 704. Quando il feto è grosso si muove con maggior forza, i suoi moti si fanno sentire in più parti dell'utero, e ancora del basso ventre, di sorte che fa credere falsamente che vi sieno due feti; onde questo moto non è un segno certo dell'esistenza dei gemelli, anzi i gemelli alle volte si muovono più debolmente.

§. 705. Quanto maggiore è la mole dell'utero, tanto maggiore è la compressione dei vasi, e del basso ventre, e però tanto maggiori sono i sintomi cagionati da questa compressione, come sarebbero le varici, l'enfiagione de' piedi, e delle parti genitali, la difficoltà di camminare, l'incontinenza o la soppressione delle orine, i difetti della digestione, la difficoltà di respirare, e cose simili. L'utero poi può ingrossare egualmente tanto nel caso di contenere un feto, quanto in quello di contenerne diversi (§. 703.) e la forza o grandezza degl'incomodi, o dei sintomi sopraccennati, può esser la medesima tanto nel primo, che nel secondo caso.

§. 706. Non sempre, ma sovente accade che la donna due o tre settimane avanti il giusto termine della gravidanza partorisca più feti, ma minori del dovere; la qual cosa può nascere per cagione delle fibre dell'utero divenute tese, e non suscettibili di ulteriore estensione, le quali trovandosi prossime alla rottura, tendono a contrarsi con tutta la loro forza, se sono niente di vantaggio irritate. Che ciò vada così, ce lo dimostra la cessazione dei dolori solita a succedere escluso il primo feto, e il riaffacciamento dei medesimi allorchè il secondo feto scende nel segmento inferiore dell'utero, e lo comprime, facendo sforzo di uscire (§. 102.).

§. 707.

§. 707. Sebbene si trovino nell' utero due feti, il nutrimento da esso somministrato loro non è più abbondante; perchè il sangue non si porta in tal viscere, e nei feti in quantità maggiore di quella che vi si porti quando vi è racchiuso un feto solo: perciò neppure di vantaggio l' utero si dilata (§. 64.). Questo produce che i gemelli sono di mole e peso minore, che un sol feto dato alla luce dalla medesima madre in altro tempo. Spesso ancora sono di vantaggio minori, se nascono avanti il termine (§. preced.); un feto solo nato al giusto termine suole pesare quasi dov' stesso che due feti nati insieme.

§. 708. Il parto dei gemelli pertanto mette al coperto la donna da quelle cattive conseguenze, che ne vengono dalla eccedente grossezza del feto (Cap. XVII. Sez. 1.). Anzi il parto dei due feti per questa parte si deve giudicare più facile, e meno doloroso che quello di un feto solo, particolarmente se l' operatore ha cura d' impedire il prolafso dell' utero (§. 565.).

§. 709. Sono vani parimente i timori che il parto di due feti suole apportare a quasi tutte le donnicciole, e a molti degli operatori. Quando l' utero è in situazione retta, i gemelli vi stanno egualmente che il feto unico, e non prendono situazione più contraria di quello, e scesi all' orifizio dell' utero non si fanno fra di loro contrasto; ma per lo più uno è posto sopra l' altro, in guisa che il secondo non comparisce all' orifizio dell' utero avanti di essere escito il primo (Tav. XII. Fig. 2.). Quando si trovano alcuni loro membri intralciati, ciò accade ordinariamente per essere stata presa l' imprudente risoluzione di rompere le membrane, nelle quali ciascuno di loro era rinchiuso (§. 71.).

§. 710. Laonde il parto del primo feto si ultimava affatto nella stessa maniera, nella quale si compisce quello di un feto solo, nè vi è segno alcuno, che dia sospetto

spetto del feto posteriore. Quando s' estraе il primo feto per i piedi, coll' introduzione che si fa della mano nell' utero s' incontra molto facilmente il sacco del secondo, e allora si è certi della di lui esistenza. Si deve avere tutta l' attenzione di non rompere senza necessità le membrane, che gli contengono, perchè allora il parto si rende sicuramente molto più arduo.

§. 711. Essendo uscito il primo feto, si conosce esservene un altro dai segni sopra insegnati al §. 318. e segg. Accorgendosi pertanto che vi sia restato nell' utero il tralcio e la placenta del primo, subito s' introduca la mano nel medesimo utero, per riscontrare la conformazione e situazione di esso secondo feto.

§. 712. Se sarà situato male, bisogna immediatamente, e avanti che l' orifizio dell' utero si chiuda, tirarlo fuori per i piedi; e tanto più facile e pronta riesce questa operazione, trovandosi l' orifizio dell' utero considerabilmente dilatato dall' uscita che ha fatta il primo; facilmente ancora si possono prendere i piedi, a cagione dell' umore dell' amnio, che mantiene l' utero spazioso, e la testa come più piccola non produce ostacolo alcuno (§. 708.).

§. 713. Quando poi il capo del secondo feto si trova nell' asse della pelvi, e che le doglie forti non vanno a mancare, o almeno intermettono per brevissimo spazio di tempo, la più sicura cosa è di lasciar' operare alla natura; ed il secondo parto è molto più facile, perchè il feto entra nella strada già fatta. Se poi la madre è debole, nè vi è punta speranza che i dolori ritornino vigorosi, è meglio estrarre il feto per i piedi, che abbandonare tal parto alla dubbiezza dell' esito; tanto più che non di rado è necessità di ricorrere qualche giorno dopo a fare quello stesso, che fu trascurato.

§. 614. Le placente inoltre dei gemelli, sieno poi queste

ste insieme unite, o disgiunte, miglior partito è quello di staccarle dall' utero con la mano, che semplicemente tirarle per il tralcio. Quando sono attaccate insieme, formano volume tale, che difficilmente si conduce a escire con la sopraddetta tiratura, ma bensì con facilità si può condur fuori prendendolo con la mano. Quando poi sono disgiunte, si corre rischio tirandole insieme di apportare offesa all' utero, la qual cosa si deve evitare.

§. 715. Se a caso le membrane del secondo feto fossero state rotte per imperizia dell' operatore, che senza effetto fossesi affaticato per estrarre il primo feto, o per qualunque altra violenza cagionata: osservi attentamente chi opera di non prendere i piedi di uno per quelli dell' altro: per prevenire questo accidente, legherà un nastro al piede già escito, e con la scorta del pollice di quel piede, condurrà la mano lungo esso e la gamba fino alle parti genitali del feto, e da quelle ritornando indietro per l' altra gamba, andrà a trovare i malleoli dell' altro piede.

CAPITOLO XXIII.

DELL' ABORTO.

§. 716. **S**I chiama *parto immaturo*, quello che succede tra il fine del settimo e nono mese dopo il primo concepimento, *aborto* poi quando l' embrione esce avanti il detto tempo; quest' ultimo accade per lo più intorno al terzo mese della gravidanza.

§. 717. L' osservazione c' insegna, che il feto immaturo può vivere, ma non già l' embrione escluso.

§. 718. La medesima contrazione dell' utero, che
com-

compisce il parto giunto al suo termine , produce ancora l' immaturo , e l' aborto . Due poi sono le cause che fanno contrarre l' utero avanti il debito tempo .

I. *Disponente* la prima , la quale prepara la costituzione dell' utero in maniera , che le fibre motrici facilmente obbediscano allo stimolo che sopraggiunge .

II. *Occasionale* è l' altra , la quale produce stimolo nell' utero , e toglie di mezzo la cagione che lo distendeva (§. 94.) .

§. 719. Queste alcuna volta senza frapposizione di mezzo alcuno , mettono in azione la forza che ha l' utero di contrarsi ; tantosto poi vi suscitano la contrazione ; avendo staccata in sul principio dall' utero la placenta ; donde ne nascono due specie d' aborto .

Una che accade col precedente stacco della placenta .

L' altra senza il distaccamento di essa .

§. 720. Di quanto maggior momento poi è la causa disponente , tanto più debole può essere l' occasionale in produrre l' aborto , e viceversa . Quindi ne avviene , che alcune donne sieno estremamente soggette ad abortire , e che altre ne sieno esenti , benchè le medesime si esponcano imprudentemente al pericolo dell' aborto .

§. 721. Le cause che dispongono ad abortire sono :

L' utero che non può distendersi più oltre di un certo determinato grado , a cagione della sua costituzione , e produce l' aborto periodico .

L' utero che resta commosso da ogni benchè leggerissima mutazione , talmentechè immediatamente si metta in contrazione .

Il feto che manca di nutrimento , e perciò la placenta stia attaccata più debolmente all' utero , e il feto non acquisti il giusto accrescimento , di modo che non possa a sufficienza resistere alla contrazione dell' utero , ma possa restare offeso da ogni minima irritazione di quello . Altrettanto può dirsi del feto morto .

- 4 La pienezza del sangue cagionata nell' utero inturgidisce i vasi, comprime i nervi, irrita, mette in moto, rompe la coesione della placenta, e produce l' emorragia.

§. 722. Le cause occasionali sono :

- A Le violenze esterne cagionate alla madre, le quali in parte sollecitano l' utero a contraersi, in parte vi determinano tanto sangue da produrre lo staccamento della placenta. Riduconsi a questo capo: tutti i moti violenti del corpo, come per esempio il ballare, il ridere smoderatamente, inoltre i medicamenti gagliardi, i veleni, le cavate di sangue, e le perdite del medesimo fatte in altro qualunque modo.
- B Le diverse malattie, come la febbre, principalmente acuta e soprattutto contagiosa, e infiammatoria; i dolori, le convulsioni, le passioni veementi dell' animo, e gli ajuti che si danno per spingere i mestruai.
- §. 723. Possono pure, sebbene più di rado, produrre l' aborto anche le cause seguenti.
- A Il cordone ombellicale, quando è troppo corto, o avvolto intorno al feto; posciachè in questi casi ogni più vivace moto del feto può staccare una parte della placenta, e cagionare una perdita di sangue.
- B Una ferita dell' utero, la quale per il dolore e il flusso sanguigno che cagiona, stimola lo stesso utero alla contrazione.
- C Una malattia parziale dell' utero, come un tumore, un' ulcera, ed un sarcoma. Il dolore cagionato dalla tensione ineguale delle fibre irrita l' utero, il quale già malamente soffre di esser dilatato.
- D Le malattie proprie della placenta, e del tralcio, le quali privano il feto di nutrimento.
- E La placenta attaccata al collo dell' utero, la quale per la di lui dilatazione si stacca (§. 681. lett. F).

§. 724. Accade sovente, che le giovani dissolute sconsiglia-

figliatamente procurino in varie maniere di abortire ,
tuttavolta se non v' è la causa disponente (§. 721.)
in vano, e con gran pregiudizio della loro salute, af-
faticano il loro corpo con violenze esterne ; senza
considerare , che l' aborto violentato è infinitamente
più pericoloso di quello, che viene in altra maniera
da per se stesso .

§. 725. Si conosce , e si presagisce l' aborto , cono-
sciuta la causa occasionale ; dalla orripilazione , dalla
refrigerazione delle estremità , dai dolori presagienti ri-
sentiti , veri , e successivamente aumentati, dall' orifizio
dell' utero più aperto , e assottigliato , ma non anche
spianato , dalla perdita del medesimo umore dell' am-
nio, e dall' uscita dell' embrione . Alcune volte l' abor-
to è accompagnato da tutti quanti gli accidenti del
parto .

§. 726. Tutte le volte che la placenta è staccata ,
i sintomi accennati al §. precedente sono preceduti,
e accompagnati dall' emorragia , la quale è copiosa, ma
interrotta, e che di volta in volta riaffacciandosi, tor-
na più copiosa , e di sangue più acceso : dipoi com-
pariscono dei grumi sanguigni, e finalmente un gran-
dissimo sbocco di sangue .

§. 727. Dai seguenti segni per lo più si distingue
questa emorragia, dal flusso mestruale .

- A Il flusso mestruale apparisce nel suo tempo determi-
nato, e l' emorragia che precede l' aborto non corrispon-
de, nè mantiene esattamente questo periodo .
- B Il flusso mestruale è più scarso .
- C Nel mestruale non comparisce umore alcuno stranie-
ro al sangue , nè con esso corpi fibrosi , come ordi-
nariamente si veggono nell' aborto .
- D Il flusso mestruale non è precipitoso , nè accompa-
gnato da alcun dolore della natura dei presagienti .
- E L' orifizio dell' utero non s' apre in tutto il suo tratto
fino all' orifizio interno. Non

F Non è preceduto da alcuna causa occasionale capace di cagionare l' aborto.

§. 728. I segni presenti prefagiscono l' esito dell' aborto.

1 Secondo IPPOCRATE *morb. mul.* Lib. I. l' aborto è sempre più pericoloso, che il parto naturale.

2 Gli aborti accompagnati da perdita grande di sangue sono i più frequenti, e i medesimi sono molto più pericolosi, che gli aborti semplici.

3 Quando sopravviene ad una donna gravida l' emorragia, la refrigerazione dell' estremità, la debolezza, la celerità e intermittenza del polso, l' offuscamento della vista, il mormorio degli orecchi, la difficoltà di respirare, la sincope o deliquio che più volte si riaffacci, il sudor freddo, e la convulsione, è segno pessimo, anzi secondo IPPOCRATE (Afor. V. 56.) ne segue sicuramente la morte.

4 Se l' emorragia dura lungo tempo, la madre muore immediatamente, ovvero muore di consunzione in capo a qualche tempo, ovvero quando abbia la fortuna di scamparne, resta debole ed infermiccia.

5 L' aborto è quasi sempre mortale, quando sopraggiunge una febbre continova, massimamente contagiosa, e infiammatoria.

6 La placenta si stacca più difficilmente nell' aborto, che nel parto maturo (§. 348. num. I.).

§. 729. Quando la donna temendo di abortire sente dei dolori significanti il parto, e gli prova senza accompagnamento di altro accidente aggravante, può alcune volte evitare l' aborto mettendosi quieta in letto, e facendosi cavar sangue, ed anche replicatamente, e facendo uso degli anodini in varie forme. Gli astringenti sono inutili, anzi nocivi.

§. 730. Allorchè poi, malgrado queste precauzioni usate, i dolori continovano, e divengono anzi più forti,

ti, e si uniscono tutti gli altri sintomi che sogliono significare il parto, ella abortisce assolutamente. In questo caso la donna cooperi pure ad abortire, facendo gli sforzi necessarj, e quando non vi si uniscano sintomi gravi, come l' emorragia, e la rottura delle membrane, lasci in tutto il resto operare alla natura. Dipor- tandosi così, non di rado ella si sgrava dell' uovo, o sia del sacco tutto intiero.

§. 731. Nel caso che l' embrione sia grande,

A Se accade che le membrane sieno lacerate, e si presenti la testa, l' esclusione dell' embrione si suole intieramente effettuare dalla natura.

B Presentandosi poi all' orifizio qualche altra parte del corpicciuolo, l' embrione si deve estrarre per i piedi. Tosto che tutto il corpicciuolo è fuori, avverta l' operatore che non gli si stacchi il capo, e resti questo nell' utero; ma cautamente introduca un dito in bocca del fanciullo, e con l' altra mano lo prenda per la sommità delle spalle, o per l' occipite, non pensando a liberare le braccia, le quali attesa la loro piccolezza, e mollezza fanno poca resistenza, ed in questa maniera tiri fuori esso capo (si consulti il §. 599. e seg.).

§. 732. Quando poi l' embrione sia piccolo, come è quello che non giunge alla metà del tempo, può tirarsi fuori per il capo, o per i piedi egualmente, secondo qual sarà di esse la parte presentata, e secondo che l' operatore la troverà più comoda. Per lo più per questa operazione non sono necessarie altre che due o più dita. Tosto che il tronco dell' embrione è fuori, si prende il capo del medesimo con due dita piegate a guisa d' oncinio, e tirerà fuori.

§. 733. Non si deve mai tirare la placenta per il tralcio (§. 348. num. 1.), ma bensì si deve leggermen- te tener teso esso tralcio, e con le dita staccare essa placenta. Nell' aborto di un embrione piccolo, posso-
no

no riescire a far ciò alcune sole dita (si consulti il Cap. XIV.). Acciocchè poi meglio la placenta si stacchi, si abbiano le seguenti avvertenze.

- A Con due dita, introdotte nell' orifizio, dopo che la placenta è staccata nel contorno, si prenda e si tiri a se.
 B Dipoi nuovamente ella s' investa colle stesse due dita più alto, e si tiri, e così successivamente si vada facendo finchè non sia staccata intieramente.

Quella placenta, che con troppa fretta si pretende di tirar fuori, si strappa; e si strappa parimente quando vi s' impiega troppa forza o violenza.

§. 734. Tutte le volte che l' aborto è accompagnato da emorragia, bisogna ricorrere a frenarla con i rimedj prescritti dall' arte (§. 729.) quando la violenza dei dolori, e l' affacciarsi delle membrane che racchiudono le acque non annunzino la prossima uscita dell' embrione.

§. 735. Se l' embrione è di poco tempo, il professore procurerà di estrarlo col sacco tutto intiero, onde


- A Con due dita dilati l' orifizio dell' utero.
 B Colle medesime prenda il sacco, e alquanto lo tiri.
 C Lo prenda successivamente più alto, e di nuovo lo tiri (§. 733. lett. B) finchè non sia tutto staccato.

§. 736. Le cause disponenti, egualmente che le occasionali, si devono evitare, e togliere colla necessaria quiete, con la debita dieta, colla cavata di sangue in tempo, in una sola parola con quei mezzi che la patologia insegna per questo genere di malattia.

CAPITOLO XXIV.

SEZIONE I.

DELLA MOLA.

§. 737. ltre il vero embrione, diversi altri corpi ancora possono racchiudersi nell'utero, e far sì che la donna comparisca gravida, dei quali

A Alcuni sono *fissi*, o sieno aderenti, i quali formano colla sostanza dell'utero un sol corpo continuato, come sono i varj tumori dell'utero, ed i polipi.

B Altri sono *sciolti*, e soltanto al contatto dell'utero, nel numero dei quali meritano di esser posti l'acqua, l'aria, e l'uovo informe.

§. 738. Chiamasi mola secondo noi l'uovo informe, nel quale appena si possono distinguere le parti dell'embrione, e delle solite membrane. Che un tal corpo riconosca origine da un vero concepimento, è dimostrato,

A Dalla sua medesima struttura, la quale è composta di fibre, e di membrane di varia specie, che nell'utero non si possono produrre dal solo coagulo del sangue, anzi vi si distinguono alcune volte dei veri canali, e una cavità ripiena di liquido.

B Qualche volta si trova il piccolissimo embrione in tal cavità.

C Più frequentemente però, tanto nella specie umana, che nei bruti, trovasi nell'utero insieme col feto.

§. 739. Le mole che si trovano nell'utero degli animali, c'insegnano che le medesime si formano dalla placenta di quell'uovo cresciuta in modo, che abbia

gua-

guastato o distrutto l'embrione. Confermano ciò ancora i sintomi, che accompagnano la mola nell'utero della donna.

§. 740. Nelle stesse mole si osserva una diversa forma esterna; per lo più è eguale, e sferoidèa, lo che deriva dalla compressione dell'orifizio dell'utero, più frequentemente ancora ella consiste in un ammasso di vescichette insieme unite, mediante un attacco membranoso. Tali mole si chiamano mole vescicolari.

§. 741. La donna che ha dentro di se una mola, sperimenta i medesimi sintomi di quella, che è gravida di un vero embrione, sennonchè la mola cresce più presto dell'embrione, e per conseguenza fa che alla donna cresca anche più sollecitamente il corpo, e le mammelle: per la qual cosa il basso ventre essendo premuto duole, la donna prova debolezza in tutta la persona, e principalmente nelle gambe, e soffre più altri incomodi. Altri segni, i quali si sogliono assegnare per caratteristici della mola, non solo sono equivoci, ma per lo più sono falsi.

§. 742. Le mole per lo più non seguitano a stare nell'utero più in là di quattro mesi; anzi si trovano delle donne, che si sgravano delle medesime periodicamente in capo al mese.

§. La mola si manda fuori con getto di sangue, nell'istessa maniera che l'aborto, con questa differenza che nel caso della mola non si arriva a sentire vescica alcuna piena d'acqua, che si affacci all'orifizio dell'utero, ma bensì un ammasso fibroso e mencio. Le conseguenze dell'escita sono pure le stesse (§. 728.).

§. 744. La donna egualmente pure che nell'aborto si deve aiutare

A Con due o più dita si vada ad aprirle l'orifizio dell'utero.

B Dove la mola è fortemente aderente all'utero si stacchi.

Si

Si prenda la medesima nel luogo più alto che sia possibile, e movendola per più versi si estragga.

D Se la porzione ch'è stata presa in principio si strappa, si prenda allora la mola più in alto, finchè non sia staccata tutta.

E La donna deve avvalorare i suoi sfrozi con tossire, o soffiare nel pugno.

F Non si adopri veruno strumento, nè alcun rimedio.

G Si usino in questi casi le cautele insegnate al Cap. XIV.

§. 745. Se una donna gravida soffre emorragia, l'operatore badi bene di non prendere l'orifizio dell'utero per una mola, e di non essere tanto inconsiderato di tirarlo a se, perchè la donna correrebbe rischio di perdere la vita. Per evitare questo accidente, porterà un dito in giro per sentire se la parte che si presenta sia continuata, o nò, coll'orifizio dell'utero. Se non lo è, e possa passare il dito fra essa e l'orifizio, farà segno esser quella una parte diversa da esso orifizio.

§. 746. Nella stessa maniera ancora avanzerà il dito tra questa parte che si presenta, e l'utero, per conoscere se ella faccia, o nò, un corpo continovato col medesimo utero. Nel caso che si riscontri essere tal corpo continovato, certamente egli è un polipo, che non si deve in modo alcuno tirare, e che per poco che si tiri è doloroso; altrimenti egli è una mola, che si può estrarre senza temere cosa veruna.

CAPITOLO XXIV.

SEZIONE II.

DEI CONCEPIMENTI SPURII.

§. 747. **L**'Acqua ancora, e l'aria contenuta nell'utero, avanti di esser mandata fuori, produco-

no ordinariamente i medesimi sintomi che la mola (§. 741.), laonde ciò si può appena distinguere.

§. 748. Tosto che l' utero è disteso da un tal fluido, si contrae, il di lui orifizio si apre, ed il fluido che esce mette in chiaro ciò che innanzi s' ignorava.

§. 749. Se poi il fluido è contenuto da una membrana particolare, può ingannare nel presentarsi all' orifizio dell' utero, emulando un vero parto. Effettivamente il volume di questo fluido essendo spinto a poco a poco dalla violenza dei dolori, si rompono le membrane, e sgorgano le acque, ma non vi si scorge in conto alcuno rudimento di feto.

§. 750. L' arte in questo caso non ha quasi niente da fare; perchè la contrazione spontanea dell' utero (§. preced.) pone termine al male, la cagione del quale viene ignorata fintanto che non sia passato. Per altro è sempre ottimo espediente l' ammolire, e dilatare l' orifizio dell' utero.

CAPITOLO XXV.

DELLE DIVERSE PARTI DEL CORPO, NELLE QUALI ALCUNA VOLTA CONTRO IL CONSUETO ACCADE CHE SI FACCIA IL CONCEPIMENTO, SICCOME DELLE VIE O MANIERE PER LE QUALI IN TALI CASI SI VIENE A CAPO DI PARTORIRE; E DELLE CONSEGUENZE DI QUESTI PARTI.

SEZIONE I.

DEL FETO CONCEPITO FUORI DELL' UTERO.

§. 751. **L'** Uovo certamente formato per via della generazione, secondo le leggi consuete della na-

natura scende e si ferma nell' utero , ed ivi prende nutrimento (§. 50.) qualche volta però rimane nell' ovaja , o veramente si ferma in una delle tube del FALLOPPIO , o casca nella cavità del basso ventre , e prende adesione a qualche parte all' utero adiacente ; ivi la placenta a poco a poco cresciuta irrita le parti alle quali è attaccata , ed il sangue portandovisi , per causa di tale irritazione , in maggiore abbondanza , prende nutrimento , e cresce . Onde ne nascono quei concepimenti che accadono ,

- A Nelle ovaje ,
- B Nel basso ventre ,
- C Nelle tube falloppiane .

§. 752. In questi casi il basso ventre si distende , e so-
praggiungono gli altri segni della gravidanza (Cap. VII.)
ma non si produce verun cangiamento nell' orifizio dell'
utero , non si sente nè il capo , nè la vescica formata
dall' umore dell' amnio , ed il tumore del basso ventre
non suole occupare la regione di mezzo , ma quel luogo
che contiene il concepimento . Lo stesso segue ri-
guardo al moto dell' embrione . La gravidanza è per
il solito molto incomoda , a cagione della straordinaria
pressione , e della dilatazione della parte che racchiude
il feto . Per lo più cessa lo sgravio mestruo , e non
di rado per tutto il corso della vita ancora , forman-
dosi delle ostruzioni in quei vasi . Se il concepimento
è succeduto nel basso ventre , il tumore si riscontra mo-
bile , e a traverso degli integumenti dello stesso addo-
me della donna si sente il corpo del feto .

§. 753. Per la ragione poi , che queste parti som-
ministrano minor copia di nutrimento di quello che
porta l' utero tutto vascolare , gli embrioni contenuti da
tali parti sono più piccoli , ed hanno un esito vario ,
e per lo più nascono avanti il termine , o la maturi-
tà dei parti veri , e naturali .

- A Alcuni rompendo il loro ricettacolo , cascano nella cavità del basso ventre della madre .
- B Altri formano un ascesso , a traverso del quale aprendosi il passo , escono a pezzi .
- C Altri poi si seccano , e restano chiusi in una cistide , o sacco , che diventa duro , e osseo , nel quale la madre gli porta per tutto il tempo di sua vita ; ovvero si disciolgono nell' umore , dentro il quale erano immersi .

§. 754. Siccome l' esito è vario , diverso pure per la cognizione deve essere l' ajuto da apprestarsi . Vi è da sospettare che il feto , rotto avendo il suo ricettacolo , sia caduto nella cavità del basso ventre ,

- A Se precederono i segni accennati al §. 752.
- B Se sopravvengono nei consueti intervalli dei dolori nel basso ventre , simili agli spurj .
- C Se i medesimi sono tanto vivi , quanto farebbero se fosse tagliato o lacerato il basso ventre . Il feto spesso ancora in tal tempo si agita gagliardamente .
- D Se l' orifizio dell' utero non soffre mutazione veruna , non esce alcun' umore , e non apparisce quella vescica formata dalle acque , come accade nel parto ordinario .
- E Se questi dolori cessano istantaneamente .
- F Se la madre cade in deliquio .
- G Se si arriva a sentire colle orecchie un rumore di rottura nel basso ventre .

§. 755. In queste circostanze non si può salvare la donna , che per mezzo dell' operazione cesarea , la quale senza dilazione si deve fare nel luogo stesso della tumefazione . Aperto col taglio il basso ventre , si deve estrarre il feto , fermare l' emorragia , e ripurgare la parte dagli umori stravasati .

§. 756. La donna infallibilmente muore allorchè si differisca l' operazione , o , come non di rado succede , si trovi

trovi sfacelata la parte rotta ; nel qual caso suol precedere non solo l' infiammazione di quella parte, ma di tutti gli altri visceri ancora contenuti nel basso ventre, con l' accompagnamento della febbre acuta e infiammatoria. Alle volte i medesimi sintomi sono prodotti dalla pressione, quando il concepimento è accaduto nel ventre.

§. 757. Quando il feto sia indurito, ovvero ossificato (§. 753. lett. C.) detto comunemente *impietrito*; non si può apportare verun soccorso alla madre, e quello che s'impiega diviene inutile, tanto maggiormente che i segni indicanti questa mutazione sono incertissimi: per l'ordinario sono i seguenti.

A La gravidanza si prolunga fino all' intero e perfetto termine del parto.

B Arrivato cotesto termine, cominciano i dolori del parto, i quali diminuiscono a poco a poco, anzi cessano affatto senza che la donna partorisca, e alle volte durano con intervalli irregolari per un altro intero mese.

C Il moto dell'embrione ancora a poco a poco cessa.

D Il feto divenuto secco e ossificato, incomoda la donna per tutto il restante della di lei vita con il peso, e dolori vaghi, e ottusi che cagiona.

E La tumefazione del basso ventre sussiste.

F Il feto talora si fa distinguere al tatto a traverso gl' integumenti del basso ventre.

G Quando il feto sia in una delle tube falloppiane, non impedisce alla donna di concepire, e di partorire altri feti.

H La donna rimane soggetta alle volte a più e diverse malattie croniche, le vengono a cessare i mestruì, e non lascia di avere sempre il latte al petto.

Perciò è meglio che ella soffra i sopradetti incomodi, i quali non portan seco sinistra conseguenza, che sperimentare l' operazione piena di rischio.

§. 758. Accade ancora, che molte parti del feto si sciolgano nell' umore dell' amnio, e altre induriscano e facciano adesione e corpo colle membrane che le involgevano.

A Alcune volte dopo che l' umore dell' amnio è prosciugato, le parti del feto rimaste senza essersi sciolte s' induriscono nella forma accennata nel paragrafo precedente, e restano nel loro ricettacolo senza apportar nocumento. E' accaduto per altro, che si sia formata un' ulcera nelle parti adiacenti, accompagnata da una febbre lenta.

B Alcune volte ancora si accresce l' umore, e questo produce un' idropisia cistica. Allora bisogna ricorrere alla paracentesi, e all' operazione cesarea, estrarre le parti del feto, produrre la suppurazione nella cistide, per scioglierla o abolirla, e cicatrizzare in fine la piaga.

§. 759. L' ascesso si manifesta da se stesso. Egli è preceduto dai segni descritti al §. 752. e 754. lett. B C. D. I dolori cessano, e ritornano a riprese, la partoriente è molestata da diversi mali, e soprattutto ella sente un peso molto incomodo nel posto dove si forma e rompesi l' ascesso. L' embrione comprimendo il sacco che lo contiene, egualmente che le parti e gl' integumenti adiacenti, dà occasione alla formazione dell' ascesso, il quale è frequentemente accompagnato da una febbre lenta.

§. 760. L' ascesso si deve aprire secondo le regole consuete, estrarre sollecitamente le parti del feto contenute in esso, e purgarlo e consolidarlo. Le parti molli dell' embrione sogliono per il solito disfarsi, e rimanere le ossa solamente. Se vi è una piccola apertura conviene dilatarla. Alle volte le ossa si fanno strada ed escono per l' intestino retto.

CAPITOLO XXV.

SEZIONE II.

DEL FETO CHE ESCE PER QUALCHE STRADA INSOLITA.

§. 761. **I**L feto concepito e nutrito nell'utero, qual-
che volta è soggetto ai medesimi accidenti
e alterazioni (§. 753.) di quello il quale trovasi in
altro luogo fuori dell' utero , e che non esce per la
solita via .

§. 762. Accade alle volte, che nel tempo del parto
l' *utero* si *rompa* , e che tutto il feto , o qualche suo
membro entri nella cavità del basso ventre. Produco-
no questo accidente le seguenti cagioni , le quali si
trovano alcune volte combinate :

A La eccessiva violenza dei dolori , nel tempo che il fe-
to abbia incontrato un ostacolo da non si potere na-
turalmente superare , e l' arte non sia concorsa a ri-
muoverlo ; per motivo di una pessima situazione , e par-
ticularmente trasversale , o che l' utero parimente , o
la testa trovisi in situazione obliqua , e la medesima te-
sta sia deforme , o troppo grossa , tanto per vizio pro-
prio , quanto per vizio relativo delle parti genitali .

B L' azione ineguale dei dolori gagliardi , cagionata da
un difetto dell' utero , come per esempio farebbe un
tumore duro e scirroso in esso viscere , per il quale la
parete dell' utero , non potendosi contrarre egualmente ,
rompe e lacera le fibre vicine forzate dal contatto del
feto ; l' attacco laterale della placenta ; l' obliquità dell'
utero ec.

C La troppa sottigliezza di tutto l' utero , lo che è ra-
ro ,

ro , o di qualche sua parte, cagionata dalla situazione obliqua del feto , che l' abbia di tratto più del dovere, ovvero prodotta da qualche altra qualunque cagione.

D La violenza , che l' utero ha sofferta dalla mano imperita di un operatore , ovvero per motivo di una calcata, di un colpo , e di una compressione nella regione del basso ventre sofferta dalla donna ec.

§. 763. I corpi tutti si sogliono rompere nel posto più debole : perciò le rotture dell' utero si osservano massimamente nel segmento inferiore, essendo questo più sottile di tutte le altre sue parti (§. 65.) particolarmente se l' ostacolo all' uscita del feto nasce più che per altra causa dal feto medesimo . Il fondo pure dell' utero è soggetto a rompersi, ma questo caso è più raro, e quelli che lo hanno descritto ne hanno parlato succintamente . L' utero serrato attorno al basso ventre del feto può farci dubitare di una rottura , e non ostante tale accidente farci sperare un parto felice . L' utero stesso ancora può aver mutato luogo in modo da ingannare l' operatore , il quale introducendo la mano per la parte laterale inferiore, si creda di avere sfondato il di lui fondo .

§. 764. Ecco quali ordinariamente sono i segni , che indicano la rottura dell' utero prodotta da cause interne , e che nello stesso tempo fanno conoscere quale ne sia stata la vera cagione .

A Dolori più violenti , e frequenti senza intervallo alcuno , e senza che il feto si avanzi ; strappamenti come di visceri sofferti dalla madre , con nausea , vomito , e moto straordinario del feto , con tumefazione maggiore di basso ventre , e con situazione più alta dell' orifizio uterino .

B Si sente talvolta coll' orecchio un rumore nell' addome . Indi

C Subito i dolori o cessano , o divengono minori senza nota cagione .

La

D La partoriente ha il polso debole, e frequente, con l'estremità fredde, e cade frequentemente in deliquio, e in convulsioni.

E La parte del feto che si presenta, il quale in questo caso si osserva senza moto, suole allontanarsi, o almeno alquanto scostarsi dalla bocca dell'utero, e allora esce qualche volta un poco di sangue.

F Cresce la tumefazione del basso ventre, e muta luogo, e figura.

G Qualche volta a traverso degli integumenti si sentono distintamente le parti del feto.

H La mano del Professore che riscontra l'utero viene con affluenza imbrattata di sangue, e penetrata per la ferita nella cavità del basso ventre, può distinguere i visceri, che vi si contengono.

I Finalmente la partoriente totalmente indebolita, dopo una serie di diversi accidenti, che presagiscono il di lei fine, più presto o più tardi se ne muore.

§. 765. Accade pertanto alcuna volta, sebbene questo caso sia raro, che la madre scampi, quando cioè riesca liberarla presto dal feto, e che la rottura dell'utero si rammargini, ovvero che il feto si sciolga, o si ossifichi, e nella ferita dell'utero si faccia una simile consolidazione. La maggior parte però muore in sequela di sfacelo, o di emorragia, che sopravviene; ma siccome le ferite dell'utero ammettono guarigione, non si deve perciò giammai disperare della vita della malata.

§. 766. Adunque quando il parto è laborioso, meglio è sempre ricorrere all'arte per fare l'estrazione del feto, e prevenire la rottura dell'utero, che indugiare ad apportar soccorso alla madre negli estremi.

§. 767. Anche nel caso della rottura dell'utero, e benchè sia molto dubbioso del come aiutare la partorienti in queste circostanze, non deve essere abbandonata, ma soccorfa.

1 Quando le sole estremità del feto son penetrate per la rottura dell' utero nel basso ventre, ed il resto del suo corpo trovasi ancora dentro l' utero, si deve estrarre per quanto è possibile per la via ordinaria. Rispinga con la mano le intestina, se fossero entrate per la ferita nell' utero, con la medesima mano le impedisca di rientrarvi, e le tenga al loro luogo fintantochè l' utero non si sia debitamente contratto. (S. 368. lett. A)

2 Ogni volta che tutto il feto, o almeno il tronco insieme con il capo, come spessissimo suole in tal caso accadere, sia uscito fuori della cavità dell' utero, non vi è che l' operazione cesarea, e sollecitamente istituita, la quale possa salvare la madre, ed il feto. Il Professore poi per quanto può con gli appropriati rimedj ripari alla contusione, alla cancrena, e allo sfacelo, che all' utero sopraggiungesse.

S. 768. Il più delle volte la violenza dei dolori fa crepare l' utero (S. 761. lett. A) soprattutto quando il feto oppone un ostacolo non vincibile dalla natura. Qualche volta ancora gl' integumenti del basso ventre, irritati dalla forza dei dolori, premono talmente il feto, e l' utero, che ne nasce l' infiammazione, e la suppurazione.

S. 769. Quantunque la maggior parte dei segni dell' ascesso dell' utero convengano con quelli della sua rottura, nondimeno alcuni sono fra loro diversi. Ordinariamente sono i seguenti.

A Tutte le cose si dispongono per il parto, versandosi ancora l' umore dell' amnio.

B Si uniscono ai dolori grandi i segni della cattiva situazione del feto.

C I dolori cessano repentinamente.

D La parte presentata si torna indietro coll' orifizio dell' utero.

E La placenta e le membrane alle volte escono da per loro.

La

- F La donna è affalita da diversi mali procedenti da infiammazione, come per esempio dalla febbre ec.
- G In qualche parte del basso ventre sollevasi un tumore, la di cui mollezza denota un ascesso, o la cancrena.
- H Esce dalle parti genitali della marcia, o materia icorosa.

§. 770. Il solo mezzo di salvare la donna, è di aprire per tempo l'ascesso, di detergerlo secondo l'arte, e di estrarre il feto a pezzi (§. 760.),

§. 771. Qualche volta il feto si consolida, o petrifica (come comunemente si dice) nell'utero stesso, la qual cosa si rileva dai segni di sopra accennati ai §§. 757. lett. A e 765. e soffre le stesse conseguenze.

CAPITOLO XXVI.

DELL' OPERAZIONE DI TAGLIARE, O SIA DI METTERE
IN PEZZI IL FETO NELL' UTERO.

§. 772. **N**on si deve ricorrere a questa operazione, sennonchè nel caso in cui il feto non si possa salvare con l'operazione cesarea, nè estrarlo dall'utero in altra forma. Si eseguirà adunque.

A Quando il feto essendo già morto si troverà situato trasversalmente nell'utero, ed in modo da non poterlo voltare, e tirare per i piedi.

B Particolarmente se la mano del feto, con una parte ancora del petto, si troverà impegnata nell'orifizio dell'utero, e la mano dell'operatore in niun modo possa insinuarsi tra l'utero ed il feto (§. 646.).

C Tutte le volte che il feto è mostruoso, e non vi è luogo a potersi servire per estrarlo di metodo più sem-

plice , ed in circostanze che non vi sia alcuno interesse per la sua conservazione (§. 750.).

§. 773. Nel caso che un braccio sia fuori, ecco quanto l'operatore deve fare:

- A Prenderà il braccio, più vicino che sia possibile alla spalla , e lo sforcerà in guisa da staccarlo nell' articolazione .
- B Se ciò non gli riescirà, taglierà con un coltello bene appuntato gl' integumenti , e con le dita separerà le altre parti , e staccherà l' umero , la spalla , e la clavicola . L' uso delle cesoje è meno sicuro .
- C Si servirà d' un coltello che abbia il manico lungo , e lo dirigerà con una mano posta fuori delle parti genitali ; che abbia inoltre la punta curva , e questa sarà sempre portata verso il feto , acciò non resti offesa la partoriente . L' altra mano sarà condotta dentro le parti genitali , in opposizione al coltello , per difenderle dal medesimo .
- D Con questo coltello si taglieranno le cartilagini delle costole , che si presenteranno .
- E La maggior parte delle costole del lato presentatosi, afferrate con le dita , e smosse per più versi, si staccheranno , e porteranno fuori .
- F Con le dita si lacereranno gl' integumenti del petto , e le viscere in esso contenute, e si tireranno egualmente fuori .
- G Con un coltello curvo , o con cesoje grandi, si taglieranno le cartilagini , che uniscono le vertebre fra di loro , e con le dita si strapperà loro ogni connessione fibrosa .
- H Disimpegnato in tal guisa il tronco , si potrà tirare con la mano , quando essa sola sia sufficiente a poter ciò fare , altrimenti s' investirà con un uncino nelle costole , in modo che abbracci insieme costola e vertebra . Con una mano tirerà l' uncino , e con l' altra condotta den-

dentro dirigerà l' oncinò , e prenderà le vertebre superiori.

I Così tagliato e afferrato il tronco si tirerà fuori a norma delle regole dell' arte , mentre la partorientente ancora dal canto suo si ajuterà con i debiti sforzi.

K Se a caso il collo si trovasse attaccato al tronco per mezzo di una porzione di pelle , questa si taglierà.

L Finalmente si estrarrà la testa col collo , secondo le regole insegnate al Cap. XVIII. Sez. V.

§. 774. Quando la parte inferiore del tronco si presentasse alla bocca dell' utero , uno si deve condurre nella stessa maniera , alla riserva di non doverli tagliare o disarticolare il braccio . In vece di tagliare il torace , si aprirà e si vuoterà il basso ventre . Vi sono dei casi nei quali è necessario tirar fuori prima d' ogni altra parte quella del tronco superiore ; ma la situazione prescrive in questo la regola .

§. 775. Le medesime regole appunto possono servire per mettere in pezzi il feto mostruoso .

CAPITOLO XXVII.

DEL PARTO CESAREO.

§. 776. **S**I chiama *parto cesareo* quello , in cui si estrae il feto dal basso ventre della madre per un' apertura fatta col taglio .

§. 777. Allorchè sia impossibile l' estrazione del feto per la via naturale , è necessario ricorrere ad aprire il basso ventre col taglio ;

A Nella donna gravida dell' intiero suo tempo , e che abbia la pelvi talmente stretta , che l' operatore non possa introdurre nell' utero la mano , o quando riesca introdurla , non possa venirne fuori il feto .

Quan-

B Quando l'orifizio dell' utero , o della vagina , ovvero il suo canale , benchè la pelvi sia ben formata , non si possa dilatare naturalmente , o artificialmente , quanto è necessario per dare ingresso alla mano dell' operatore , ed esito al feto . A questo caso si devono riferire i diversi tumori di queste parti , e altri vizj delle parti genitali (§. 339.) non superabili mediante l' arte Chirurgica ;

C Quando il feto è fuori dell' utero , non indurito , e divenuto osseo , o che l' utero stesso è incarcerato in un ernia . Altrettanto si può dire dell' ascesso formato dal feto chiuso nell' utero . *Si consulti il Cap. XXV.*

In tutti questi casi è meglio tentare un rimedio incerto , che non tentarne alcuno , ed esporre la madre ed il feto ad una morte sicura .

§. 778. Ogni volta che il feto non possa venir fuori intiero , e sia morto o mostruoso , e perciò non produca premura nessuna a essere conservato , e contemporaneamente sia in potere dell' operatore la introduzione della mano , e degli strumenti nell' utero , ed il feto messo in pezzi possa estrarsi per la pelvi senza la morte della madre , si deve preferire la dissezione del feto , sebbene laboriosa , ed esigente somma destrezza , all' operazione cesarea , l' esito della quale è moltissimo incerto . Al contrario poi quando il feto sia vivo , e si possa conservare , ma che non possa escire intiero per la strada ordinaria , se l' utero è sano , e non per anco abbia veruna disposizione alla cancrena , dato che la madre sia in tutte le sue forze , e acconsenta all' operazione , miglior cosa è il farla , che mutilare , ed uccidere il feto .

§. 779. Quando similmente il capo del feto è fortemente inchiodato nella pelvi , e l' apertura superiore della medesima è tanto stretta quanto l' inferiore , è espediente passare ad aprirlo . Imperciocchè non
solo

solo il feto è allora ordinariamente morto, ma ancora la di lui testa non si può ritirare indietro per l'apertura superiore della pelvi senza la morte della madre.

§. 780. E' fuori d'ogni dubbio che tutte le gravide morte senza aver partorito si debbono aprire, perchè non sentono male alcuno, ed i feti possono ancora vivere, specialmente se per tempo si faccia l'operazione.

§. 781. L'operazione cesarea in vero è molto dubbia per l'esito, a cagione della ferita grande e profonda, che si è obbligati a fare, e per le forze della donna, le quali sogliono essere in tali circostanze molto abbattute; ma non perciò ella è assolutamente mortale, avendola eseguita con successo anche operatori affatto ignoranti. Si legge ancora che alcune donne che l'avevano sofferta sono state in grado di nuovamente aver figliuoli; anzi ve ne sono state alcune sulle quali tale operazione è stata reiterata più volte. Imperciocchè

- A A tutti è noto, che le ferite del basso ventre sono guaribili.
- B La ferita fatta nell'utero si riserra dalla contrazione stessa dell'utero, per la qual cosa cessa l'emorragia, e la ferita vien disposta a consolidarsi.
- C La gran quantità di sangue che si ferma allora nell'utero, fa sì che l'emorragia sia meno pericolosa.
- D Gl'integumenti del basso ventre immediatamente sovrapposti all'utero, impediscono che il sangue si versi nella cavità di esso basso ventre.
- E Il sangue si sgrava liberamente dall'orifizio dell'utero aperto.

§. 782. Perchè l'operazione riesca il meglio che sia possibile, si abbiano le seguenti avvertenze.

- I Si trovi in pronto tutto l'apparato degli strumenti, che abbisognano, nascosti per altro alla malata, e non si tra-

- si trascurino tutte quelle precauzioni, che si debbono avere in qualunque operazione Chirurgica.
- 2 Quando la vescica è piena di orina, e che s'inalza sopra le ossa del pube, per non offenderla con il coltello, si faccia orinare l'inferma, o si sgravi di essa orina per mezzo della sciringa.
 - 3 La malata stia a giacere supina in letto, e non solo tengasi ferma da alcuni assistenti, ma le sia impedita la vista di quanto deve essere sopra di essa operato.
 - 4 Indi l'operatore presa una comoda situazione, tagli diligentemente gl'integumenti del basso ventre, i muscoli, ed il peritonèo.
 - 5 Si serva di un hysterotomo corredato di manico, sottile per quanto è possibile, lungo, largo, bene appuntato, e fabbricato a posta per questa operazione. Non si adoprinò le cesoje, perchè cagionano vivo dolore e contusione nelle carni. I coltelli ordinarj sono troppo piccoli. Il rasojo non è molto sicuro a maneggiarsi.
 - 6 Se il feto trovisi fuori dell'utero, o che l'utero soffra un'ernia, quando non vi sieno d'altronde altri impedimenti, il taglio si farà nel posto più prominente del basso ventre; o veramente essendovi un ascesso, si farà sulla maggiore elevatezza del medesimo.
 - 7 Ogni volta poi che il feto è nell'utero, e l'utero occupa la consueta situazione nel basso ventre, si fa il taglio nel medesimo luogo ove si suol fare la paracentesi agl'idropici, o nel mezzo appunto del basso ventre.
 - 8 Tagliati gl'integumenti, ed i muscoli per il lungo del basso ventre, si apra con diligenza il peritonèo, s'introduca un dito, ovvero una tenta scannellata nella fatta ferita, e con tal guida si passi a dilatarla con lo strumento detto hysterotomo. Si rimettino le intestina, se a
caso

caso fussero escite fuori , e da un astante si ritenghino nel loro posto .


- 9 Supposto che il feto non sia nell' utero , ma nella cavità del basso ventre , si etrae prontamente .
- 10 Se il feto poi e contenuto nell' utero , nella tuba , o nell' ovaja , l' operatore continoverà con diligenza il taglio fino a tali parti , ed avrà tutta l' attenzione di non offendere le di lui membra .
- 11 Dopo essere stato tirato fuori il feto , si ripulisca ed asterga la ferita con qualche decozione vulneraria e calda ; con le mani si accostino diligentemente le di lei labbra , e si fermi l' emorragia con delle fila , e qualche medicamento astringente .
- 12 Si soccorra l' inferma abbattuta con qualche medicamento leggermente corroborante , e si abbia tutta la debita cura ancora riguardo al fanciullo .
- 13 La ferita dell' utero , o delle tube , si abbandoni alla natura , e solo si abbia avvertenza di difenderla dall' aria , e di tenerla pulita .
- 14 La ferita del basso ventre si cuopra , e si stringa con una fascia unitiva , con lasciare nella parte inferiore libero scolo alle materie .
- 15 Si passi alla cucitura quando la esiga la necessità .
- 16 Tengasi in letto col corpo alquanto declive per dare facile scolo agli umori .
- 17 Qualche ora dopo l' operazione si levi l' apparato , e si tolga la cucitura , se faccia duopo , acciò si possa esaminare lo stato della ferita , e cavare i grumi di sangue che vi si potessero esser formati .
- 18 Riguardo a tutto il resto uno si conduca secondo le regole generali usate nel medicare le ferite grandi , e particolarmente del basso ventre .

§. 783. Le descritte precauzioni si abbiano ancora a riguardo della donna già morta . Quando un grave deliquio riduca una gravida a comparir morta , e indi si

ravvivi, l'operatore non si troverà giammai pentito d'averle tagliato l'utero con tutte le possibili cautele, e diligenze.



SPIEGAZIONE DELLE TAVOLE.



SPIEGAZIONE DELLA I. TAVOLA.

L A Tavola I. Fig. 1. rappresenta la parte superiore del bacino colle rispettive dimensioni.

A. Alcune vertebre dei lombi.

B. La parte superiore dell'osso sacro.

CC. Gli ossi ilei.

D. Il pube.

IIII. La circonferenza dell'apertura superiore, la quale porta la distanza d'una parte all'altra di circa pollici 5. e mezzo, e questa viene a formare ciò che si dice asse trasverso; l'asse conjugato poi forma la minor distanza, che è dal davanti al di dietro, cioè dalla finis degli ossi del pube all'osso sacro, ed è di pollici 4. e mezzo in circa.

Fig. 2. Rappresenta il bacino rovesciato.

A. La parte superiore dell'osso sacro.

B. Il coccige.

CC. La cresta anteriore degli ossi ilei.

D. Il pube.

E. La di lui cresta interna.

FF. Gli ossi ischj.

GG. I forami ovali. La distanza che corre da una tuberosità e l'altra degli ossi ischj, e che si chiama l'asse trasverso, di rado supera 4. pollici; la distanza poi che passa tra il coccige B. e la cresta interna E. del pube, che forma l'asse conjugato, non arriva a 4. pollici.

Fig. 3. Dimostra gl'ossi della sommità della testa di un fanciullo nato di fresco, colle sue dimensioni.

A. La fontanella.

B. L'osso frontale.

C. L'occipite.

D. L'osso parietale.

M m z

E. La

E. La futura lamdoidea.

F. La futura sagittale. Le di cui dimensioni sono dal davanti al di dietro di pollici 4. e tre decimi, da un orecchio all'altro di pollici 3. e mezzo; più in avanti, cioè verso la parte ove è segnato dalla linea tirata a traverso gli ossi frontali, la distanza è di pollici 3.

Fig. 4. Altra testa di fanciullo parimente nato di fresco, colle sue rispettive dimensioni.

A. La sommità del capo.

B. L'occipite.

C. La fronte.

D. Il luogo ove risiede la futura sagittale. La linea tirata dalla cima del mento fino alla fine della futura sagittale ove confina colla lamdoidea, è di pollici 5. e 6. decimi. La linea che cala dalla fontanel-la è va perpendicolarmente fino alla base del capo è di pollici 3. e 6. decimi. La linea finalmente tirata dalla parte anteriore del capo fino alla posteriore è di pollici 4. e 3. decimi. (1)

SPIEGAZIONE DELLA II. TAVOLA.

La seconda Tavola fa vedere il bacino in due diversi aspetti, cioè uno di faccia, e l'altro per parte, ed in ambi due vi sono le linee, che rappresentano la grandezza dell'utero di una donna al termine della sua gravidanza.

Fig. 1. A A A A A. Le cinque vertebre dei lombi.

B. La parte superiore dell'osso sacro.

C. Il coccige.

D. L'osso ilco.

E. Il pube.

F. La di lui cresta interna.

G. L'osso ischio.

H. Il forame ovale.

III. La grandezza dell'utero quando è arrivato agli ultimi gradi di dilatazione nel nono mese della gravidanza.

K. La linea tirata dal centro del bacino fino al fondo dell'utero: le altre due linee accennano l'asse coniugato superiore, ed il coniugato inferiore, il pri-

(1) Tutte queste misure sono formate a pollici di piede Inglese.

primo dei quali è di 4. pollici e mezzo, l'altro poi non arriva a 4.

Fig. 2. Questa figura dimostra una pelvi, o bacino veduto di faccia, con l'utero dilatato, come nella figura prima.

- A. Le cinque vertebre dei lombi.
- B. La parte superiore dell'osso sacro.
- C. Il coccige.
- DD. Gli ilei.
- E. Il pube.
- FF. I capi de' femori.
- GG. Gli ischj.
- HH. Le aperture ovali.
- II. L'utero. Due linee, una delle quali dimostra l'asse trasverso superiore, che è di pollici 5. e mezzo, e l'altra l'asse trasverso inferiore, che di rado supera 4. pollici.

SPIEGAZIONE DELLA III. TAVOLA.

La Tavola III. dimostra un bacino mal conformato.

- A. Le cinque vertebre dei lombi.
- B. L'osso sacro.
- C. L'osso del coccige.
- DD. Gli ossi ilei.
- EE. Gli ossi ischj.
- F. La sinfisi del pube.
- GG. I forami ovali.
- HH. Le cavità cotiloidee.

Questa figura a bastanza fa vedere il pericolo che corre tanto la madre, che il feto, allor quando si trova un bacino così mal conformato, perchè l'asse coniugato superiore non ha che due pollici di distanza, e l'istessa distanza vi corre da un osso ischio all'altro.

SPIEGAZIONE DELLA IV. TAVOLA.

La Tavola IV. rappresenta le parti esterne della generazione di una donna.

- A. La parte inferiore del basso ventre.
- BB. I gran labbri aperti.
- C. Il clitoride, ed il suo prepuzio.

DD.

- D D. Le ninfe.
- E. La fossa magna.
- F. Il meato orinario.
- G. Il frenulo delle labbra, ovvero forcella.
- H. Il perinèo.
- I. L'ano.
- K. La parte che copre l'estremità del coccige.
- L L. Le parti che ricoprono le tuberosità degli ossi ischj.

SPIEGAZIONE DELLA V. TAVOLA.

In questa V. Tavola si vede di faccia l'utero con le sue parti adiacenti in sito, e sospeso nella vagina, e perchè tutte queste parti interne si vedano bene, si sono levate le parti anteriori degli ossi ischj, e del pube, le parti pudende, il perinèo, e l'ano.

- A. L'ultima vertebra dei lombi.
 - B B. Gli ossi ilei.
 - C C. Le cavità cotiloidee.
 - D D. Le parti inferiori, e posteriori degli ossi ischj.
 - E. La parte che ricuopre l'estremità del coccige.
 - F. La parte inferiore dell'intestino retto.
 - G G. La vagina aperta per lo lungo, e ripiegata da ambedue le parti del collo uterino, per dimostrare come vi stà sospeso l'utero.
 - H H. Parte della vescica urinaria dilatata oltre l'una e l'altra parte della vagina.
 - I. Il collo dell'utero.
 - K. Il fondo del medesimo.
 - L L. Le tube falloppiane con le loro fimbrie.
 - M M. Le ovaje.
 - N N. I ligamenti larghi, e rotondi.
 - O O. La parte superiore dell'intestino retto.
- Fig. 2. Rappresenta le parti interne vedute dall'inguine destro, essendo la pelvi tagliata per lo lungo.
- A. La vertebra inferiore de' lombi.
 - B. L'osso sacro.
 - C. Il coccige.
 - D. L'osso ileo sinistro.
 - E. La parte inferiore dell'osso ischio sinistro.
 - F. L'osso del pube dell'istessa parte.
 - G. Il forame ovale,
 - H. La

- H. La cavità cotiloidea .
- III. La parte inferiore dell'intestino retto , e l'ano .
- K. L'apertura esterna, è la vagina con l'orifizio dell'utero che si avvanza .
- L. La vescica urinaria .
- M.N. Il collo , ed il fondo dell'utero , di cui si scuopre la cavità ugualmente , che gli attacchi della vagina , tanto esternamente , che alla circonferenza dei labbri dell'orifizio dell'utero ; si vede ancora la situazione dell'utero , e in che forma questo viscerale è spinto all'ingìù , e all'indietro per la pressione degli intestini , e della vescica , nel concavo inferiore dell'osso sacro .
- O. Il ligamento largo , e rotondo .
- PP. La tuba falloppiana con le sue fimbrie .
- Q. L'ovaja .
- RR. La parte superiore dell'intestino retto , e la parte inferiore del colon .
- Fig. 3. Questa figura fa vedere l'utero nel primo mese della gravidanza . Si è portato via la parte anteriore di questo viscerale , per fare vedere l'embrione a traverso l'amnio e il corio , e come gli angoli acuti dai quali era terminata l'interna cavità dell'utero sieno convertiti in archi .
- A. Il fondo dell'utero .
- B. Il collo dell'utero , con delle piegature di questa cavità , che si conducono a quella del fondo di questo viscerale .
- C. L'orifizio dell'utero .

SPIEGAZIONE DELLA VI. TAVOLA.

Questa tavola VI. è incisa nell'istesso punto di vista , e collo spacco o taglio delle medesime parti che sono nella prima figura della tavola precedente .

La figura I. rappresenta l'utero o matrice tale e quale si trova nel secondo , o terzo mese della gravidanza , tagliata e tolta la sua parte anteriore .

- F. L'ano .
- G. La vagina colle sue rughe , o pieghe .
- HH. La parte posteriore , e inferiore della vescica urinaria , distesa dall'una , e l'altra parte , e da cui è levata la parte d'avanti , e quella di sopra .
- II. L'orifizio , e il collo dell'utero .
- K.K.

KK. L'utero esteso come lo è ordinariamente nel secondo, o terzo mese della gravidanza; esso contiene l'embrione colla placenta aderente al suo fondo.

La *Fig. 2.* Rappresenta l'utero nel quarto, o quinto mese della gravidanza nei medesimi punti di vista, e spacco, che la precedente, a riserva che non è levata la parte d'avanti del collo dell'utero.

L'orifizio è il collo dell'utero nello stato naturale sono ricoperti dalla vagina, e queste parti sono unite insieme, ma qui la vagina *G.* è un poco più discosta dal collo, e dall'orifizio *I.* che nella prima figura, ad oggetto di lasciar meglio vedere le parti.

K. La parte inferiore del fondo dell'utero, di cui alcuna volta si scorge l'estensione a traverso della vagina, premendo col dito la parte anteriore, o laterale.

SPIEGAZIONE DELLA VII. TAVOLA.

Questa Tavola dimostra le parti che l'utero contiene nella sua cavità, e lo stato in cui esse sono nel sesto, o settimo mese della gravidanza.

A. L'utero dilatato fino alla regione ombellicale.

BB. La parte superiore degli ossi ilci.

CC. Le cavità cotiloidee.

DD. Le parti posteriori e residue degli ossi ischi.

E. L'ano.

F. La vagina.

G. La vescica urinaria.

H. Il collo dell'utero più corto che nella Tavola VI. *Fig. 2.* e risalito più alto a motivo della dilatazione dell'utero, e portato sopra i contorni della pelvi.

I. I vasi dell'utero più dilatati di quello che sieno nell'utero non gravido.

K. La placenta attaccata alla parte inferiore dell'utero.

LL. Le membrane, che vestono il feto, la testa del quale è situata nella parte inferiore dell'utero. Questa situazione della testa è la più ordinaria secondo *SMELLIE*, quando vi è una gran quantità d'acqua.

SPIEGAZIONE DELLA VIII. TAVOLA.

La Tavola VIII. rappresenta l'utero nello stato dell'ottavo,

tavo , o nono mese della gravidanza , nella medesima vista o taglio che è la precedente .

- A . L' utero dilatato quasi all' ultimo punto .
- B B . La parte superiore degli ossi ilei .
- C C . Le cavità cotiloidee .
- D D . Le parti posteriori degli ossi ischj .
- E . Il coccige .
- F . La parte inferiore dell' intestino retto .
- G G G . La vagina distesa da ciaschuna parte .
- H . L' orifizio dell' utero , le di cui labbra appariscono più larghe , e più flosce , sul fine della gravidanza .
- I I . Porzione della vescica urinaria .
- K K . La placenta aderente alla parte superiore e posteriore dell' utero .
- L L . Le membrane .
- M . Il cordone ombellicale .

SPIEGAZIONE DELLA IX. TAVOLA.

- Tavola IX. *Fig. 1.* Rappresenta la placenta per la parte che risguarda il feto ; una porzione lascia vedere l' amnio come deve essere nell' estensione A A A . B B B B . ma esso amnio è tagliato in B D D E . per far vedere il corion , il quale è fortemente aderente al cordone ombellicale D . Il corion poi si vede in E F F . spogliato dopo averne portato via l' amnio .
- HHHH . Il corion levato via per far vedere la parte interna della placenta .
- I K L . L' involucro membranoso , che rimane dopo che il corion è stato levato ; la porzione k è più adesa verso l' estremità della placenta , ed è ineguale nella sua superficie , a motivo di molti corpicciuoli , che vi sono aderenti .
- M . Le arterie ombellicale .
- N . La vena ombellicale .
- OOO . La parte della placenta , ove le principali ramificazioni delle vene e delle arterie entrano dopo molte anastomosi .

Fig. 2. Rappresenta la parte della placenta aderente all' utero .

AAAA . Le parti che formano più di prominenza .

BBB . I solchi che sembrano dividere la placenta in differenti

N n

par.

parti , secondo che essa diviene segmento di un cerchio tanto più maggiore , quanto più si avvanza la gravidanza .

CCCC. Parte del corion sopra del quale appariscono dei piccioli corpi come nella *Fig. 1.* lett. k .

DDDD. Le parti della placenta , che si attaccano più fortemente alla matrice , opposte a quelle ove i vasi entrano nella sostanza O O O . *Fig. 1.*

SPIEGAZIONE DELLA X. TAVOLA.

Fig. 1. Un feto nella situazione naturale quando è per nascere.

Fig. 2. Un feto , che si presenta all' orifizio dell' utero con i piedi , e per i quali il Professore tenta di tirarlo fuori .

A . L' estensione dell' utero avanti la rottura delle membrane , e dello sgorgo delle acque .

B . L' utero quando si contrae , e si stringe sul corpo del feto .

Fig. 3. Un feto rannicchiato per una forte contrazione dell' utero , sotto una forma rotonda o ovale . Il davanti del feto voltato verso la parte inferiore dell' utero , con avere un piede e una mano nella vagina . Quivi è levata la parte anteriore della pelvi con un taglio longitudinale , che attraversa appunto il centro dell' apertura ovale .

A A . Le parti superiori degli ossi ilei .

B . L' utero dilatato .

C . Il suo orifizio dilatato di maniera che pare una cosa stessa colla vagina O O O O .

D . La parte inferiore o posteriore dell' orifizio interno .

EEEE. Le parti residue degli ossi del pube , e dell' ischio .

FFFF. La membrana adiposa .

Fig. 4. Un feto il quale non presenta che un solo piede , restando l' altro parallelo al suo corpo : vi si vede ancora come l' utero si contrae dopo essere sgorgate le acque .

Fig. 5. Un feto che presenta le ginocchia prima che le membrane sieno rotte .

SPIEGAZIONE DELLA XI. TAVOLA.

Fig. 1. In questa figura si vedono le medesime parti che nel-

nella figura terza della tavola precedente , ma la situazione del feto è molto diversa. Il braccio sinistro è avanzato nella vagina a segno , che tutta la metà del braccio si vede fuori dell' orifizio esterno ; la spalla si trova conseguentemente avanzata fino dentro l' orifizio dell' utero .

Fig. 2. Un feto , che si presenta al passaggio con la parte posteriore d' una spalla .

Fig. 3. Un feto situato trasversalmente nell' utero , col dorso voltato verso l' orifizio .

Fig. 4. Un feto , che presenta le natiche all' orifizio dell' utero .

SPIEGAZIONE DELLA XII. TAVOLA .

Fig. 1. Un feto rannicchiato in forma di gomito . Il ventre che si presenta all' orifizio interno con la regione ombellicale A .

B. Cordone ombellicale cascato nella vagina , e fuori dell' orifizio interno .

Fig. 2. I gemelli si trovano spesso situati diversamente in differenti casi . Quivi i due feti sono di faccia . Uno ha la testa situata convenevolmente verso la parte inferiore dell' utero , e l' altro è in una situazione preternaturale , avendo la testa verso la parte opposta . Il corpo di ciascuno è attorcigliato dal suo rispettivo cordone , ciò che avviene spesso nella situazione naturale , e non naturale .

A. L' utero dilatato con le membrane , e le acque .

B.B. Le parti superiori degli ossi ilei .

C.C. Le cavità cotiloidee .

D.D. Gli ossi ischj .

E. Il coccige .

F. La parte inferiore dell' intestino retto .

G.G. La vagina .

H. L' orifizio interno dilatato alla larghezza di un dito in circa , e la tumefazione formata dalle membrane e dalle acque nel tempo dei dolori .

I.I. La parte inferiore dell' utero disteso dalle acque , che sono per d' avanti alla testa del fanciullo , che si presenta .

- KK. Le due placente attaccate alla parte posteriore dell' utero.
 LL L. Le membrane che appartengono a ciascheduna placenta.

SPIEGAZIONE DELLA XIII. TAVOLA.

Fig. 1. Seggiola di M. DEVENTER.

A. Spalliera attaccata al sedile con due cerniere, mediante le quali si può alzare, e abbassare a piacimento. Si accomoda, e si fissa per mezzo di una spranga di ferro, che si fa passare colle due punte nei battenti per la parte di dietro, ciò che non si è potuto rappresentare nel rame; questi battenti hanno più forami, l'uso dei quali è di tenere fissa la spagliera all'altezza che si vuole. Si vede in F. La parte inferiore dell'asse di dietro, che è fissa, e alla quale è attaccata la spalliera A. con gli sportelli, ovvero battenti BB. mobili per mezzo di due cerniere, da ciascheduna parte delle quali l'inferiore si vede in C.

DD. Cuscino traforato, sopra del quale la partoriente siede, è fatto di un asse massiccio, coperto di panno, e ripieno di borra, affinchè sia sodo e cedente nel tempo stesso. Per di sotto sono attaccate due forti bandelle di ferro, terminate per di dietro da un oncinio, che entra dentro ad un anello attaccato alla parte immobile della seggiola. Così, allorchè la spalliera si abbassa sotto al livello del cuscino, per dare al capo una situazione uniforme all'estremità anteriore del cuscino, si può essa fissare nei buchi delle bandelle di ferro E. che sono attaccate a ciascheduna parte laterale.

GG. Due manichi, o prese, che la donna abbranca colle mani, e col loro ajuto può fare qualunque maggiore sforzo. Questi manichi possono mandarsi avanti e indietro a piacimento, e si tengono fissi per mezzo di un pernio, che si alza, o si abbassa mediante il bottone k. che vi è attaccato.

L. Altro cuscino, la di cui incavatura è differente, e da preferirsi a quello che si vede rappresentato al di sopra della seggiola nei parti difficili, perchè porge maggior facilità di accostarsi verso la donna, e lascia più libertà di operare.

M. Piccolo braciere nel quale si può mettere della cenere calda , per non fervirsi del fuoco vivo . Si può ancora mettervi del fuoco , ma bisogna procurare che sia di brace quasi consumata .

Questa sedia è molto commoda . E' vero che dà un libero accesso all' aria , alla quale rimedia il calore del braciere ; ma un inconveniente al quale sarebbe forse facile il rimediare , si è che bisognando trasportare sul letto la donna subito dopo che ha partorito , essa può lasciarsi riposare qualche tempo sul piccol letto ordinario , coll' abbassare la spalliera della seggiola , e con accomodare per davanti un asse , che si alzi al livello del fedile per sostenere le gambe della puerpera ; Così si potrebbe formare una specie di letto , sopra del quale potrebbe assai commodamente riposare qualche tempo avanti di trasportarla nel letto , dove ella deve passare il restante del suo puerperio .

Fig. 2. Tanaglia di M. LEVRET,

A. Una branca della tanaglia di M. LEVRET considerata dalla sua estremità A. fino al pernio ; ridotta però alla metà della sua vera grandezza per ogni verso , e in tutte le dimensioni ; talchè per averne la sua giusta misura , deve raddoppiarsi proporzionatamente in ogni parte , con osservare le leggi della conveniente curvatura .

Fig. 3. Tanaglia di M. SMELLIE , la quale ha due pollici di larghezza , e sei di lunghezza in ciascheduna branca , e con cinque pollici e mezzo nei manichi , onde è lunga in tutto undici pollici e mezzo della misura d' Inghilterra .

B. Indica la parte esterna di ciascheduna branca di essa tanaglia , per far vedere la lunghezza e la larghezza della sua apertura , e la forma e dimensione di tutta la branca .

Fig. 4. Cesoje destinate per forare il cranio . Queste cesoje sono forti , e lunghe nove pollici Inglesi in circa ; vi si vede in mezzo alle lamine un risalto , mediante il quale si fa più facilmente una ulteriore dilatazione .

SPIEGAZIONE DELLA XIV. TAVOLA.

Fig. 1. Un pajo di uncini curvi , uniti insieme alla maniera delle

delle tanaglie, dei quali può farsene uso, o di tuttidue così uniti, o pure di un solo separatamente secondo le circostanze e il bisogno.

Il filo punteggiato per l'estensione interna d'una delle branche dell'uncino rappresenta la guaina, che deve vestire la punta finchè siasi introdotta quanto basta. La legatura segnata su i manichi con due linee punteggiate, serve a stringergli insieme dopo aver tirata fuori la guaina.

La punta di questo uncino guarnita della guaina, può ancora servire di uncino smuffato.

A. La punta dell'uncino veduta di faccia.

B. La parte esterna d'uno degli uncini, la quale ha dodici pollici Inglese di lunghezza.

Fig. 3. Leva di ROONHUYSEN veduta per piano, e di faccia, o sia per la larghezza o grossezza. In queste figure però tale leva non si rappresenta che per metà; cosicchè è necessario raddoppiarla tutta in qualunque sua dimensione per ridurla grossa, larga, e lunga quanto appunto è la misura prescritta dall'Autore.

Fig. 3. Uncino spuntato.

CC. Due differenti sciringhe per le donne.

DD. Due pessarij, o sosensorj d'una nuova specie per riparare al prolasso dell'utero. Dopo aver rimesso l'utero al suo luogo, bisogna introdurre nella vagina il pessario per la parte dell'estremità più larga, e adattare contro l'orifizio dell'utero la sua concavità, dove sono tre aperture per dare scolo alle materie. Vi sono nell'estremità minore due fori per passarvi de' nastri, e da legarvi altri cordoni attaccati a una cintura che sia fermata intorno al corpo della donna. Con questo mezzo il pessario si tien benissimo fermo, e obbligato al suo posto. La malata può levarlo quando va a letto, e rimetterlo la mattina; ma perchè talvolta cagiona incomodo per la confricazione dell'orifizio esterno, ordinariamente si usa il pessario orbicolare segnato E. il quale si fa di legno, d'avorio, o di sughero, cuoprendolo di tela e poi tuffandolo nella cera per fargli una superficie tersa. Questo pessario bene untato di pomata, deve introdursi nella

va-

vagina verticalmente, e coll'ajuto di un dito messo nel foro di mezzo girarlo per piano, e avanzarlo fino all'orifizio interno, che deve corrispondere al centro di quest'apertura. Bisogna averne di più larghezze adattabili alla diversa proporzione della vagina, per impedirne l'allentamento o l'uscita anche nel caso di qualche sforzo straordinario.

SPIEGAZIONE DELLA XV. TAVOLA.

STRUMENTO, O SIA TENAGLIA, CHE AGISCE PER MEZZO D'UN MECCANISMO INVENTATO DAL GALLETTI TRADUTTORE PER ESTRARRE LA TESTA DEL FETO STACCATA, E RESTATA NELL'UTERO.

Fig. 1. Strumento colla Tenaglia aperta.

aa. aa. Le due Branche munite di un piccolo rialto nell'estremità superiore della loro superficie interna, e vuote a tutta sostanza.

bb. Due Cerniere aderenti alle Branche.

cc. Due Cerniere aderenti al Ferro di mezzo *d*.

bc. bc. Due Leve fermate nelle loro estremità per mezzo di altrettanti Pernj alle due Cerniere *bb. cc.*

fb. fb. Porzione delle Branche, incavata per la parte di dentro.

d. Ferro di mezzo di figura quadra, o sia Albero, a cui sono fissate le due Leve.

e g. Dado, o Massello d'acciaio, il quale per la porzione *e.* serve di base alle due branche, e per la porzione *g.* serve di Ghiera al Manico d'ebano.

ff. Due Pernj fissati nel Dado d'acciaio, intorno ai quali ruotano le due Branche.

h. Manico, o Manubrio d'ebano.

i. Estremità vera del Manubrio; giacchè l'estremità apparente è una Palla.

l. Palla mobile, che girata per un verso apre la Tenaglia, e per un altro la ferra, senza che la Palla si discosti punto dal rimanente del Manubrio.

m. Smusso o Piano nell'estremità interiore dell'una e dell'altra Brancha, il quale per la sua complanazione, e levigazione facilita l'ingresso della testa dentro le Branche.

n. Gi-

n. Gigliettino d' ottone a riscontro d' altro segno posto presso l'estremità *i.* del Manubrio, per indicare all' Operatore a che grado si apra, e si richiuda la Tanaglia nel girarsi la Palla.

Fig. 2. Strumento con Tanaglia ferrata, il quale nella sua lunghezza dalla sommità delle Branche fino all'estremità della Palla, e in tutte le altre sue dimensioni contiene la metà appunto della vera misura dello Strumento effettivo.

Fig. 3. Spacco del Manubrio.

- a a. Manubrio esterno tagliato per metà in tutta la sua lunghezza fino al Sodo *g.* e spogliato della parte di sopra.
- bb. bb. Manico interno, o Cilindro attaccato alla Palla, o piuttosto Tubo, essendo tutto vuoto; perchè possa giuocarvi dentro la Vite maschia *ff.*
- cc. cc. Due Pernj fissati nel Manubrio esteriore; uno più basso verso la Palla, ed uno più alto, i quali ferrano in mezzo il Cilindro, o Tubo interno; essendo situati uno al di sopra (che è il più lungo) e l'altro al di sotto del Cilindro medesimo.
- dd. Due Solchi circolari fatti nella sostanza del Cilindro o Tubo interno, ne' quali incastrano i due Pernj *cc. cc.* Questi Pernj coll'ajuto de' Solchi lo tengono a stretta in forma, che possa girare intorno a se stesso, ma non si muova punto nè poco dal suo posto.
- e. Madrevite fissata nella sostanza del Cilindro, o Tubo.
- ff. Vite maschia, che è una continuazione dell'Albero *b.* La Madrevite *e.* col moto del Tubo interno, nel quale è fissata, ruotandosi intorno alla Vite maschia *ff.* ora a sinistra, ora a destra, la manda fuori, o l'afforbisce a proporzione del bisogno, che v'è, d'alzare, e abbassare l'Albero per aprire, e chiudere le branche.
- g. Porzione del Manubrio lasciata intiera, perchè è quella da incastrarsi nel Dado, o Massello di acciaio, e vien fermata con forti viti acciecate.
- h. L'Albero sciolto dalle Leve.
- ii. Due Appoggi d'acciaio fissati lateralmente nella Palla per maggior facilità, e sicurezza di regolarne il moto.

MANIERA DI ADOPRARE QUESTO NUOVO TIRE-TETE O TIRATESTE.

Siccome vi è in questo strumento il ghigliettino *n.* a riscontro dell' altro segno posto presso l' estremità *i.* del manubrio; si premiette, che non può darsi una regola fissa ed invariabile comune a tutti gli strumenti, per lume ed istruzione dell' operatore. In ogni strumento la celerità dell' aprirsi e ferrarsi sarà maggiore, o minore a proporzione, che più grandi, o più piccoli faranno i pani della vite maschia *ff.* (Fig. 3.) che fa girare le branche. Onde l' operatore dovrà prima d' ogni altra cosa, misurare la gradazione del moto del proprio strumento, non osservare quanto aprano le branche, nel farsi colla palla, o gruccia un giro intero, e di qui calcolare quante volte bisognerà girarla per condurre le branche a una dilatazione proporzionata alla mole del capo, che si computa di tre in quattro dita e mezzo in circa nelle sue dimensioni trasverse cioè da un orecchio all' altro, e dalla fronte all' occipite; senza la quale diligenza si opererebbe sempre all' azardo, e con pericolo.

La situazione del corpo della paziente, siccome la disposizione di tutto il rimanente, dovrà essere la stessa che nell' altre ordinarie operazioni di parto, secondo che minutamente descrive il celebratissimo M. LEVRET nel suo Trattato completo che ha per titolo: *Observations sur les causes & les accidens de plusieurs accouchemens laborieux*, a pagine 42. dove tra le altre saviamente suggerisce di riscaldare un poco lo strumento (parlando egli di quello di sua invenzione) tanto da fargli perdere la rigidità metallica, e di ungere con olio, o butirro le branche, nel che mi fo un pregio di calcare le orme di sì gran Professore. Tornerà bene che l' operatore introduca prima destramente una mano, dopo untata con qualche materia oleaginosa, dentro la vagina, e con le due dita, indice e medio, si conduca fin dentro l' utero, per riscontrare in che situazione si ritrovi il capo staccato; se pure l' operatore per qualche particolar circostanza non credesse proprio di risparmiarsi una tale esplorazione.

Fatto questo, prenderà colla mano destra il manubrio, o manico della tanaglia, ferrata, e l' introdurrà nella vagina,

conducendolo a poco a poco fino dentro all'imboccatura della matrice, ed a toccare conseguentemente il capo staccato che vi è dentro; e per agevolarne, e renderne più sicura l'introduzione, può egli prima introdurre nella parte inferiore della vagina le due dita della mano sinistra, indice e medio, voltando la palma verso l'arcatura del pube, le quali dita gli serviranno come di sostegno, o guida, per dirigere il corso dello strumento, e cautelarsi contro qualunque pericolo d'intoppi, o ritardi.

Quindi posta così a contatto del capo l'estremità della tanaglia, deve l'operatore ritirare le due dita, e prendere colla mano sinistra il manubrio *b*. perchè la destra resti libera per far agire la palla, o gruccia *l*. Si giri dunque lentamente la gruccia per aprire la tanaglia, la quale perciò con lentezza uguale anderà discostando le parti dell'utero ad essa lateralmente adiacenti. Si avverta però di tenere ben forte la tanaglia medesima puntata al capo, sì nell'atto di cominciare ad aprirla, sì nel proseguirne l'apertura, ad oggetto di spingerlo piuttosto verso il fondo dell'utero, che lasciarlo venire in avanti, ed evitare così il pericolo, che esso piuttosto spinga indietro la tanaglia; altrimenti non si darebbe luogo alle branche di entrare come debbono, nell'aprirsi tra la superficie esterna del capo, e la superficie interna delle pareti dell'utero.

Dovranno dunque aprirsi le branche della tanaglia ad una certa misura proporzionata alla mole del capo: e questa misura si conoscerà dall'operatore per mezzo della calcolazione che egli averà premessa e segnata, come sopra si è detto, per fissare un sistema proprio del suo strumento. Aperse così le branche, la testa entrerà liberamente, e quasi da per se stessa tra le medesime, coll'aiuto dei due smussi *mm*. posti nella parte interna delle due estremità *aa*. (*Fig. 1.*) e l'operatore se ne accorgerà subito dal sentire, che lo strumento non trova che un contrasto affai minore di prima. Onde avanzerà dolcemente lo strumento medesimo per facilitare l'operazione, ed assicurarsi della presa.

Divenuto che sia padrone della testa, comincerà a riserrare a poco a poco la tanaglia girando la palla, o gruccia, per un altro verso, non tanto per tener forte la testa, quanto per comprimerla, ed obbligarla a prendere dentro le branche, o cucchiaie, una figura bislunga, o di cono.

Quindi gradatamente riconducendo verso di se la tanaglia con
dei

dei moti semicircolari , procurerà di tirar fuori il capo , badando sempre di non lacerare , e strappare la commettitura , o unione inferiore delle gran labbra , chiamata forcella , e ciò si ottiene alzando a poco a poco in arco la tanaglia medesima , facendole descrivere una specie di semicerchio , che abbia per centro l'osso del pube , a misura che va estraendosi lo strumento insieme con il capo .

L'aver fatto , dice il non mai abbastanza lodato M. LEVRET , costruire uno strumento , che paresse soddisfaciente allo scopo , che mi era proposto , non bastava per adoprarlo subito sul corpo vivo , ma conveniva che prima di questo tentativo , se ne facesse l'esperienza su i cadaveri . Io pertanto facendomi volentieri imitatore di esempio sì luminoso , ho fatte replicatamente ancor io le prove del mio nuovo Tire - tête , in questo Regio Spedale di S. Maria Nuova della Città di Firenze . L'Eccellentissimo Signore D. Ranieri Maffei sì noto alla Repubblica Medica , e Letteraria per le dottissime sue Lezioni d'Anatomia , ed anche per lo zelo particolare in promuovere gli avanzamenti della Chirurgia pratica , mi ha benignamente apprestato il comodo dei cadaveri , su quali ho potuto fare l'esperienze necessarie sotto gli occhi di esso , e di tutti i Giovani studenti del Collegio di quell' Arcispedale , e di non pochi altri Professori tanto Paesani che esteri . E da queste prove riuscite felicemente è stata rilevata abbastanza la sua utilità , ma meglio deve riuscire nei corpi vivi , per ragione della faultrice naturale disposizione , e azione delle parti , la quale incontrasi in questi , e non nei cadaveri .

VANTAGGI DI QUESTO NUOVO TIRE - TETE .

E' Particolare la facilità con la quale s'introduce questo strumento , senza verun pericolo di ferire , o lacerare , perchè non è nè acuto , nè tagliente , ma bensì in tutte le sue parti liscio , e ben levigato .

La di lui introduzione è facilitata ancora dalla sua curvatura , coll'ajuto della quale passa agevolmente , e s' interna secondando la curvità dell'osso sacro . Cresce la facilità ancora perchè quando è ferrata la tanaglia , come appunto ella è nell'atto d'introdursi , le due estremità smussate *aa* . combagiano talmente fra loro , che sembrano un sol pezzo (Fig. II.)

Lo strumento medesimo non accresce di mole il capo da estrarfi ,

considerata la teoria della sua struttura , e la natura delle parti sulle quali deve agire .

Nell' aprirsi graduatamente , dopo averlo introdotto nella vagina , e nell' imboccatura dell' utero , distrae a poco a poco e quasi insensibilmente le parti , e si dilata con direzione trasversa fra i due punti laterali , tra i quali vi è maggior luogo alla distrazione , e dilatazione medesima , in conformità della figura della pelvi , il di cui asse è più esteso tra l' uno e l' altro lato degli ossi dell' ischio , ed ilei , che tra il pube ed il coccige , come anche la sommità dell' osso sacro , ed il pube medesimo .

Siccome poi le due branche nella loro estremità sono smusate , perciò restano tanto unite insieme , che nell' introdursi non possono offendere punto quel rialto , o cordone , che è il principio dell' orifizio , e della sostanza dell' utero , nel qual rialto altrimenti s' imbatterebbero di fronte , se non lo scansassero , in vigore di questa loro figura , e levigatezza .

Questo dilatatorio nell' introdursi , ed aprirsi così a gradi , viene a forzare delicatamente le pareti dell' utero , e supera anzi la resistenza delle medesime pareti , le quali per loro propria natura tendono sempre alla contrazione di se stesse , e molto più dopo espulso , o estratto il feto ; perchè sono state sì lungo tempo , e con tanta violenza distratte durante la gravidanza . Dal che ne succede , che molto agevole riesca prendere tra le due branche o cucchiaini il capo , anche per essere queste di una figura e costruzione poco dissimile da quelle della tanaglia di M. LEVRET . Anzi avendo esse di più nella loro estremità inferiore lo smusso , o complanazione *m.* (*Fig. 1.*) resta sommamente facilitato l' ingresso della testa dentro le branche medesime , le quali di più essendo di una presa grande , tenaci , e concave , ne succede , che nell' operazione riescano più sicure di qualunque altro strumento .

Entrata così nella tanaglia la testa , ella viene obbligata a prendere una forma e figura molto vantaggiosa per essere estratta senza offendere le parti della madre , che naturalmente resistono al volume della medesima testa ; imperocchè ella verrà a comprimersi , ed allungarsi a piacimento dell' operatore (1) , purchè esso ,

(1) Questo vantaggio non può li pare che più tosto nel tirar fuori la testa debbano o farle prendere
averli negli altri strumenti , i qua-
re

esso, a misura che nel tirar fuori incontra resistenza, ferri a poco a poco lo strumento per mezzo della palla, o grucciona che vi è in fondo.

A questo vantaggio dell'arte contribuisce ancora la natura.

La forza della vite che serve a stringere le branche viene ad essere accresciuta maravigliosamente dalla resistenza che fanno le parti dure, cioè le ossa della pelvi, sulle branche medesime, le quali messe così a stretta nel loro passaggio non possono prendere altra direzione, che quella di unirsi sempre più insieme, e dare alla testa una figura sempre più bislunga.

Vi è per l'operatore il gran vantaggio di sapere a che grado si apra, e si chiuda la tanaglia nel girarsi la palla, o grucciona, per esservi il gigliettino *n.* menzionato di sopra. E' da avvertirsi ancora, che può procurarsi un vantaggio di più nel costruirsi l'istrumento, il quale consisterà nell'avvertire l'artefice, che faccia i pani della vite maschia *ff.* (Fig. 3.) più tosto grandi che piccoli. La ragione si è, che se i pani saranno grandi, si sfuggirà il pericolo di stancarsi nel girare essa palla, e quello che importa molto più, di defatigare, e distrarre troppo colla lunga durata dell'operazione le parti.

C A S O D' O S T E T R I C I A OCCORSO AL TRADUTTORE.

NEl tempo che stava per terminarsi la stampa del presente libro, mi è occorso un caso, il quale fa vedere i pregiudizj dell'indugio a chiamare il Professore, in conferma di ciò che diceasi delle levatrici nella prefazione a pag. xi. La notte del dì 23. venendo il 24. Dicembre dell'anno 1774. all'ore una della mattina fui chiamato a soccorrere la Sig. Anna moglie dell'Eccellentiss. Sig. Dott. Antonio Vincenzio del Chiaro, uno dei Cancellieri della Curia Arcivescovile di Firenze, donna dell'età di 33. anni, e di temperamento gra-

re una figura sferica compressa, a guisa di cipolla, e così difficoltarne maggiormente l'estrazione, o pure mettere in pericolo di

qualche offesa le parti della madre, se sono strumenti da investire di punta, o in altra forma la testa.

gracile , la quale era in travaglio di parto , gravida però di soli sette mesi e mezzo , come asseriva . Dopo dati felicemente alla luce sei figli , aveva essa in questa settima gravidanza cominciato fin dai primi di Novembre a perdere del sangue , il quale incomodo coll' ajuto d' una emissione fattale dal braccio , calmava ed anche spariva affatto , a misura che praticava il consiglio datole da me , benchè poco da lei eseguito , di stare in riposo nel letto . Pertanto la trovai giacente in letto , ma in uno stato assai pericoloso , con i polsi molto deboli , bassi , e frequenti , abbattuta di forze all' ultimo segno , e con doglie rare , languide , e corte , oltre l' esterna apparenza del volto indicante qualche cosa di funesto . Con tutto ciò non vedevo chiaro il perchè la paziente fosse ridotta in questi estremi . Non tardai a scoprirne la cagione , quando trovai dei grumi di sangue nella vagina , e riscontrai , che oltre il poco sangue mostratomi in principio dalle astanti , ve n' era una quantità prodigiosa filtrata in ampia estensione , sì in varj lenzuoli posti di riparo a più doppi , sì nelle materasse e nel saccone del letto . Questa emorragia , o non era stata osservata , o non curata dalla levatrice , benchè fosse cominciata dalle ore nove della sera , come poi mi fu riferito , e la levatrice fosse già arrivata poco dopo le dieci . Dopo sì rilevante scoperta non persi un momento ad accingermi a salvare almeno la vita al feto , che mi riuscì di estrarre vivo con facilità e prestezza , avendo trovato aperto , e ben situato l' orifizio dell' utero , quantunque mi convenisse per procurare lo sgorgo delle acque rompere le membrane , e anchè dalla parte destra si presentasse un corpo spugnoso , che io giudicai , come poi viddi essere in effetto , porzione della placenta già staccata , e pel suo staccamento origine fatale della copiosa emorragia .

Cessò dopo terminata l' operazione l' affluenza del sangue , nè compariva se non nella piccola quantità consueta de' parti ordinarij , e naturali ; per lo spazio di più di un' ora e mezza la puerpera sembrò alquanto sollevata , e quieta , sì per lo sgravio del feto , sì pel conforto dei ristorativi , coi quali fu leggermente aiutata ; a segno che fece nascere negli astanti qualche speranza , e per questo riflesso stavano anche in dubbio i sacri Ministri (già stati avvisati per tempo) se dovevàn munirla degli ultimi Sacramenti . Ma all' improvviso assalita verso le ore tre , e
mezza

mezza da un complesso di fieri sintomi , di smania , convulsioni , vomito , affanno , e deliquij , rendè inutili tutti i soccorsi , che io non lasciai d'apportarle: e questi mortali insulti , per timore dei quali io non l'aveva abbandonata neppure nello stato del suo apparente miglioramento , mi diedero per disperata affatto la sua vita , la quale in effetto terminò dopo le ore cinque .

Ho poi saputo altresì , che essendo insorta una perdita di sangue anche più copiosa negli ultimi quattro o cinque giorni precedenti alle doglie , la partoriente se la passò senza farne gran caso , e senza che pensasse a chiamar me , o altro professore . Si aggiunse anche questo accidente per non lasciar luogo a dubitare , che la paziente sia stata la vittima della propria trascuraggine , non meno che della indolenza , o ignoranza della levatrice , la quale doveva al suo arrivo riconoscere l'occorrente , e trovata l'emorragia già cominciata di più d'un' ora , doveva subito , e non dopo tre ore in circa , far chiamare il Chirurgo ; giacchè la pronta estrazione del feto è l'unico scampo da tentarsi nei casi dei Parti difficili per motivo di perdita di sangue , come prescrive espressamente il nostro ROEDERER nel Cap. XX. §§. 681. 684. 685. e 689.



I N D I C E

DELLE MATERIE.

Il Numero indica il §.

A

A Borto 716 -- preceduto, e accompagnato da perdita di sangue 726 -- sua differenza dai mestrui 727. A. F -- sue cagioni 718 -- disponenti 721. n. 1. 4. -- occasionali 722. A. B -- più rare 723. A. E -- in qual maniera si debbano evitare 736 -- segni che predicono l' aborto 728. n. 1 -- alcune volte come si possa evitare 729 -- e perchè alcune volte non si possa ciò ottenere 730 -- suo regolamento nel caso che l' embrione sia avanzato, o grande 731. A. B -- nel caso che sia piccolo 737 -- emorragie nate in conseguenza di esso 734 -- se ne danno due specie 716 -- il procurato è più pericoloso del naturale, o spontaneo 724 -- suoi segni; ed accidenti 725.

Acque spurie 190 -- loro origine 191. 192.

Acque dette formate 180.

Addome, suoi muscoli 110. 111. 118 -- suo riscontro, o esplorazione 405. n. 1.

Ago lungo, e inguainato 737. A.

Agrippino parto 591 -- V. Parto.

ALBUCASI Medico Arabo 442. C. 444 B.

AMAND Scrittore d' Ostetricia 672. B.

Amnio membrana 68.

Amnio suo umore 180.

Apparato, o preparazione al parto 273. 284.

Apertura dell' orifizio dell' utero gravido. V. Utero.

Ascessi dell' utero. V. Utero.

B

BING Professore 438. n. 2. 442. A.

Borsa 672. B.

Bocca di Tinca 35.

Braccio escito fuori 476. A. B. 633. ec.

BURTON Professore d' Ostetricia 438. n. 1. 447. B. 672. A. D.

C

Calcolo della vescica, e dell' uretra 243. B. 339. N. A.

Capo, sua diminuzione quando sia necessaria 489 -- le cagioni per cui

cui s' ingrossa 416. A. C -- la sua grandezza può superare la capacità delle parti genitali, e della pelvi, 415. n. I. VI -- la sua grandezza nelle ultime settimane 91. 92 -- quando si facciano i primi moti 155 -- mutazione nel parto 195 -- dove si forma il tumore dopo un parto laborioso 468 -- compresso e proporzionato non supera le dimensioni della pelvi 8 -- non si può estrarre colla tanaglia quando è compresso all' ultimo grado 430. 431 -- quando è fortemente incastrato nella pelvi, allora si deve aprire 779 -- mezzo per distinguerlo dal segmento inferiore dell' utero 88 -- si può muovere 89 -- esso può esser situato obliquamente all' osso sacro: segni di tale obliquità 492. A. B. 493. A. F -- cosa debba farsi quando s' arresta nelle ossa del pube 506 A. E -- come si possa toccare 86. 160 -- esso resta alle volte nell' utero 661. A. D -- allora la forza delle doglie non è bastante per spingerlo fuori 662. A. B -- ma è necessario l' ajuto della mano e dell' instrumento 666. 667. A. F. 668. A. D. 669. 670. A. D. 671. A. E -- la sua situazione può essere in molte maniere viziosa 508.

Cervello come si cava dal cranio 445. n. 1.

Cesareo Parto 433. 776.

CHAMBERLIN Chirurgo 438. n. 3.

CHAPMANN Chirurgo 438. n. 3. 672. C.

Clisteri 265. 268.

Colostro 207.

Concepimenti spurj, e loro cagioni 746 -- aiuti in tali circostanze 750 -- spesso si rassomigliano ad un vero parto 449.

Concepimenti succeduti nelle ovaie, 751 -- nelle tube, e nel ventre 751 -- aiuti convenevoli ai medesimi 755. 756. 760 -- loro esito 753. A. C. 758. A. B. 759. 760 -- segni 754. A. F -- accidenti 752.

Convulsioni 690 -- ec.

Cordone ombelicale 74 -- sua attaccatura 77. 347. D -- corto 548. 554 -- avvoltato intorno al collo del feto 544 -- grosso, o grasso 175 -- in qual maniera si debba legare 314 n. 1. 8 -- si deve legare prima di estrarre la placenta 317 -- è questione in qual tempo si debba legare 316 -- si deve ripulire 315. n. 2 -- tagliare 315. n. 1 -- qualche volta si strappa 467. n. 7. 639 -- si può rompere in più maniere 674. A. C -- la sua legatura si deve sciorre o rompere 356 -- sua lunghezza 77 -- pulsazione 388 -- rottura 315. n. 7 -- sanguigno 76 -- cautela con la quale si deve tirare 318 -- riscontro, e osservazione dovuta riguardo al medesimo 115. n. 6 -- cautele che deve usare il Professore nell' estrarre la placenta 354. 359 -- la sua opera non è sempre utile 263 --

Corio membrana 68.

Cranio; maniera di estrarlo dopo averlo vuotato del cervello 446 F. I --

D

DE LA MOTTE Autore 252. 395. C

DENYS Autore 442. D --

DEVENTERO Professore d' Ostetricia 253. 299.

Diaframma 110. 111. 181 --

Dolori conquassanti 184 -- misti 463 -- significanti il parto, e loro divisione 105. 166 -- dopo il parto 22. 203. 205 -- i presagienti differiscono per grado dai veri 167 -- loro origine 169 -- loro incomodi 168 -- come si debbano distinguere dai colici 172 -- richiedono quiete 173 -- come distinguansi dai veri 171 -- si cangiano in veri 173 -- loro effetto 170 -- quali cose presagischino 185 n. 1. 5 -- spurj 452. 453. 467. n. 1 -- come si conoschino 454 A. C -- non si devono confondere con i dolori d' altra natura 462 A. F -- si mutano in veri 457 -- vaghi 336 -- veri 178 -- sensazione e differenza del dolore spurio dal vero 455. A. B -- l' impulso dei dolori veri deve essere efficace 240. 336 -- loro continuazione dopo il parto non è indizio di un' altro feto 321 -- la loro forza non deve essere troppo precipitosa, e mali che indi ne nascono 241. n. 1. 6.

Donna come debbasi considerare 115 -- avanzata in età 328 -- zoppa 236. 330 -- quali non si possano distinguere per vergini 120. 121 -- le gobbe 235. 330 -- le deboli 331 -- le molto giovani 372 -- le macilenti 234. 329 -- le grasse 233 -- quelle che partoriscono per la prima volta 326 -- queste non sono sempre soggette a un parto difficile 245 -- le piccole 235 -- segni della donna che ha abortito 123 -- stato attuale di quella che si deve riscontrare 116 -- se le deboli partorischino più difficilmente 237 -- che cosa si debba fare quando la debole ha l' utero situato obliquamente 332 -- segni in quella che abbia da qualche tempo partorito 124. 125 -- segni della puerpera 208 -- dolori colici 172. 462.

Doux Professore 438 -- n. 2.

DUSSE' Scrittore 438 -- n. 2.

E

Embrione escluso non può vivere 717 -- segni per conoscere il di lui sesso 163.

Emissione di sangue al fanciullo subito nato 407. n. 1 -- alla donna avanti, e nel tempo del parto 270. 271. 327. 398. C. 426.

Emorroidi 243. A. 339. n. 5.

Ernie 238. 243. G. 334. n. 2. 339. n. 5.

Esplorazione V. Riscontro.

F

Fanciullo come si debba collocare 313 -- se vomita si sollevi 407 n. 5 -- si esamini 115. n. 3 -- come si debba rinvoltare nelle fasce 115. n. 4. s' immerga in un bagno d' acqua calda corroborata col vino, oppure si cuopra con pezzette inzuppate in vino caldo 407. n. 3 -- diverse maniere per promuovergli la respirazione 407. n. 4 -- segni quando egli è vivo e vegeto 313 -- le sue membra possono rompersi 409. A. D -- lussarsi 411 A. E -- loro cura allorchè sieno rotte 410 -- quando sieno lussate 312 A. B -- diligenze da farsi dopo l' operazione 406. 407. n. 1 -- Maniera di curare le contusioni-

- tusioni 407. n. 1. 408 -- Come liberarlo dalla mucosità della bocca 313. 407. n. 2 -- Le forze sono da ristabilirsi con acqua mischiata con vino, e per mezzo di cordiali 407. n. 6.
- Fatiche del parto, o dolori veri del medesimo 178.
- Febbre del latte 206.
- Fecondità impedita da quali cause 128. 135 -- giusto tempo di essa 89.
- Femmina V. Donna.
- Feto indurito, ovvero ossificato 218. 757. 771.
- Feto; cagioni che lo ammazzano avanti il parto 390. A. E -- nel parto 389. A. L -- Condizione di struttura del medesimo nell' uovo 78. 79 -- Feto doppio 567 -- Suo esame 319 -- Inconvenienti nati da questo esame trascurato 320 -- Maniera di mettere in pezzi il feto nell' utero 772. A. C -- Nel caso del braccio escito fuori 773 -- A. L. -- quando la parte inferiore del tronco fa ostacolo alla bocca dell' utero 774. 775 -- quando tenta l' uscita per un ascesso 459 n. 1 -- Si deve tirare colle tanaglie perduto l' umore dell' amnio 487 -- Come si possa offendere quando si presenta con la faccia 523 -- Immaturo 219. 220. n. 1. 9 -- Petrificato 757. 771 -- soccorso che gli si deve dare; suoi segni, e accidenti 757 A. H. 771 -- debita proporzione delle sue membra quale sia 228. 326.
- Feto morto 340 -- suoi segni 374. 375. 378. 382. 384. 385. 388 -- segni favolosi 376 -- segni probabili 389. 390 -- cosa si debba fare presentandosi con la nuca 532 -- Non si deve presentare con altra parte che col capo 229 -- Parti dalle quali è contenuto, e per le quali deve passare 1 -- presto, o tardi che nasca si deve lasciare operare alla natura 324 -- quando sia putrefatto quali segni lo dichiarino 385. A. C -- Situazione del feto nell' utero, 80. 82 -- situazione varia del medesimo 83. 85 -- Tirato con violenza, senza avere disimpegnate le sue parti, cagiona più mali 570. E -- Sua uscita dall' utero non per la strada consueta 761 ec.
- Feto esistente nelle tube 218 -- Come debbasi indagare avanti il parto se il feto sia vivo 372. A. F -- In qual tempo si possa conoscere 370. A. B -- In quali circostanze si debba sacrificare la vita della madre 434 -- Difficilmente si conosce se è vivo nel tempo del parto 379 -- Segni di vita ricavati dalla mancanza di moto o pulsazione nel capo 382 -- Dalla tumefazione del medesimo capo 380. 381 -- Dalla turgenza del cervello 384 -- Dalla pulsazione della fontanella 382 -- Segno vitale avanti il parto 371. 373.
- Feto fuori dell' utero 751 -- Deve stare nell' asse dell' utero 227 -- quando l' utero è obliquo ad un certo segno si deve per lo più estrarre per i piedi 484. 486.
- Fionda 672. C.
- Fontanella; non si deve ripulire 315 n. 4. -- Alle volte si può forare con le dita 442. E -- sua pulsazione 382 -- Si deve cuoprire 315. n. 4.
- FREKESIO Autore 438. n. 3.
- Frenulo 315. n. 5.
- FRIED Autore 438. n. 1. 442. D. 444. C.
- Funzioni inferme, e sane del corpo 209.

G

Gemelli sono separatamente considerati di minor mole che un solo feto 707 -- Parto dei medesimi 701.

Genitali v. parti genitali.

GIFEARD Professore 438. n. 3.

GILLES Autore 478. n. 2.

Gravidanza, come debbasi esaminare, e giudicare medicamente 162. non si danno segni di essa avanti il terzo mese 156 -- segni certissimi 149. 154 -- segni comuni 143. 144 -- segni presi dalle mammelle 147. 148 -- la maggior parte dei segni sono equivoci 126. segno speciale 146 -- segni probabili 136. 140.

Gravide, dopo la morte tutte si debbono aprire 780.

GREGOIR 438. n. 2. 3. 672. B.

H

HOORN (VAN) 290. 395. B.

I

Idrocefalo v. Idropisia della testa.

Idropisia della testa, o sia Idrocefalo 416. O. C. 417. 422.

Idropisia, come debba distinguersi dalla gravidanza 151. 319 --

Imene 117. 152. 339. n. 3.

Infante, v. Fanciullo.

Intestino retto alterato da dei tumori 243. B.

IPPOCRATE Professore 163. 221. 233. 300. 444. B. 728. N. 1. 3.

Istrumenti da adoprarli si devono scaldare, ed ungere 404. H -- cautele necessarie nell'adoprarli, e applicazione di questi 417. A. C.

L

Latte delle mammelle 201.

Letto per il parto 284. 288. 395.

Letto che usano gl'Inglese 296.

Letto estemporaneo 290. 294. 395 -- letto più grande 295 -- sua altezza necessaria nel parto preternaturale 392. B.

Leva di ROONHUYSEN 485. C.

LEVRET Professore d'ostetricia 438. n. 3. 5. 669.

Lochj bianchi, e rossi 201.

M

Mano non è dannosa all'utero 361. A. D.

MAURICEAU Autore 442. C. 447. B. 672. A. C.

Meconio 338 -- sua distinzione dall'umore putrefatto 386.

Medicamenti cardiaci 331. 341 -- emollienti 398. C -- stimolanti 665 -- impellenti 336. 337. 541. 436. M -- di quelli che staccano la placenta non se ne deve far conto 362. A. C -- Oppiati 331. 342.

Membrane dell'utero 186. 390 -- maniera di romperle 627. A. C.

MESNARD Professore 395. C. 438. n. 2. 442. C. 444. B. 446. G. 447. A.

MIT-

MITTELAUSERO Scrittore 446. B.
 Mola 738 -- aiuto, e cautela che deve usare il professore intorno ad essa 744. A. G. 745. 748 -- varietà della sua forma, o figura 740 -- maniera di estrarla 343. origine della medesima 738. A. C. segni, e sintomi 741. tempo in cui suol mandarsi fuori 642. -- vescicolare 740. degli animali 739.
 MOSCHIONE Professore 300. 442.

N

Nastro, o nastri 447. C. e 642. A. -- maniera d'adoprarlo 642. B. G.
 Ninfe 116. 121.
 Nuca 522.

O

Occipite impegnato nella cavità della pelvi chiude l'ingresso alla mano, ed in tal caso che cosa si debba fare 505 -- sua proporzione nel tempo del parto 181.
 Operazione di parto deve farsi nell'intervallo dei dolori 404. E.
 Operatore che cosa deve generalmente sapere, ed osservare in qualunque operazione 403. A. E. 404. -- nel tirare il capo lo pieghi un poco verso il perineo 312 -- introduzione delle dita 311 -- unga il dorso della mano 404 -- estraiga il feto movendolo per più versi 312. A. B. unga i labbri esterni e la vagina 311. A. -- sua fatica generale nel parto facile 310 -- sua fatica nella situazione pessima dell'obliquità dell'utero 483. 485. -- cautele che deve usare avanti l'operazione nel parto preternaturale 398. A. B. -- ciò che gli riesce comodo nel parto preternaturale 397. D. H. -- se debba indugiare, o sollecitare l'operazione nel parto preternaturale 399 -- comprima il perineo 311 -- che cosa debba fare nella cancrena dell'utero già formata 402.
 Orina 188. 189. 269. D. 404. D.
 Ossa curve del pube 11 -- loro angolo 7 -- distanza 6.
 Ossi che devono essere immobili nel parto 277. 286.
 Ossi ilei, e loro situazione 7 -- distanza degli ischj 10.
 Oso del coccige cede nel parto 31 -- può essere d'ostacolo 32 -- sua distanza 6. mobilità 30 -- situazione 7. 11.
 Oso sacro 7. 9 -- sua cavità incurvata 9.
 OULDIANO Professore 442. D.

P

PALFYN Professore 438. n. 2.
 Paragonfosi 419.
 Parti genitali escoriate 243. L. 339. n. 18 -- Infiammate 243. I. 339. n. 6 -- loro Malattie locali 243. A. M. -- Queste non ritardano sempre l'uscita al feto 244 -- non devono essere offese da malattia locale 242 -- Tumori edematosi delle medesime 243. M. 339. n. 9.
 Partoriente, non deve fare sforzi nel tempo dei dolori spurj, nè dei colici 464.

- Partoriente, indocile di animo 293. 335 -- se le malattie influiscano al parto 238. A. H -- Segni convulsivi 272 -- Situazioni non comode nel parto preternaturale 396. A. D -- Situazione sulle ginocchia di qualche distante 304 -- ottima 275 -- quando il feto si deve estrarre per la parte posteriore 393 -- situazione prima 374 -- nel parto preternaturale 391. A. D. 394. A. D.
- Parto detto agrippino 251. 282. 591 -- precauzioni da prendersi, e metodo da tenersi allorchè si presentano tutti due i piedi all' orifizio, e allorchè il capo non può uscir fuori 596. A. K. 597. 599. A. F. 600. A. D. 601. A. D. 602. 604. A. D -- quando un piede solo viene fuori 607. A. D. 608. A. G. 606. A. D -- condizioni che lo rendono facile, o difficile 593 -- non deve spaventare, come crederono gli antichi 592 -- segni 594. A. F. 595. A. B.
- Parto cesareo 433. 776 -- precauzioni da prendersi 783 -- il di lui esito è certamente dubbio, ma non sempre mortale 781. A. E -- segni indicanti 435 -- quando si debba fare 777. 778 -- come si deve perfezionare 782. n. 1. 18.
- Parto difficile a cagione delle braccia incrociate sul dorso 161 -- metodo da tenersi 562.
- Parto difficile allorchè essendo uscite le braccia, non viene il resto del corpo 564 -- aiuto 565 -- cagioni 564. 566.
- Parto difficile a motivo della testa staccata dalle spalle 588 -- come accade 589. A. F -- metodo per estrarre il tronco rimasto 590 A. H.
- Parto difficile per la grossezza eccessiva del capo 413. 414 -- gli ostacoli del medesimo si possono ridurre a tre 420 -- primo 421. 425. 428 -- secondo 423. 429. -- terzo 424. A. B. 430. 432 -- prognostico prima che la vescica dell' amnio sia rotta 418 -- dopo esser rotta 419 -- la sua qualità riesce dubbiosa 417 --
- Parto difficile quando le natiche si presentano alla bocca dell' utero 612 -- difficoltà 615 -- segni 613. A. E -- come si debba operare, cessati i dolori 618 -- quando l' utero è obliquo 719. 621. A. C -- essendo retto, avanti e dopo la rottura delle membrane 616. A. F. 527. A. B.
- Parto difficile quando si presenta la faccia in vece dell' occipite 515 -- cagione 516 -- riscontro 517. 518 -- la faccia può presentarsi in tre principali maniere 520 -- prima maniera, e suo soccorso 521. 522. A. D. 524 -- seconda, e debito soccorso 525. 527. A. C. 528 -- terza, e suo aiuto 529. 530. A. C. 531 -- esiti funesti 519 --
- Parto difficile quando la faccia è diretta verso l' osso del pube 509. 510 -- segni 512. A. C -- complicato, coll' arte si libera 514 -- semplice, lo compisce la natura 511.
- Parto difficile quando il feto è doppio, o ha un membro superfluo 567 -- mezzo di rimediarvi 569. A. B. 750. A. D. segni 568.
- Parto difficile quando si presentano le ginocchia 609 -- rimedio 611 -- segni 610.
- Parto difficile quando gl' omeri sono troppo larghi, ed il corpo troppo grosso 557 -- rimedio 559. 560. 563 -- segni 558.
- Parto difficile quando il feto è voltato in un lato 533 -- riscontro 536 -- segni, e difficoltà che ne nasce 534. 535 -- che deve farsi quando

- quando la testa è dentro la vagina 540. A. G. 541. A. E -- se l'ipalle sono nella pelvi, e la testa fuori della vagina 537. A. B. 538. A. F. 539. A. D -- unendovisi altri impedimenti 542.
- Parto difficile per la situazione trasversale del feto, e che può presentare diverse membra 622. A. G. 623. A -- cose da farsi in generale 625. 626 -- se il basso ventre, o questo essendo idropico si presenta 624 -- se si presentano differenti parti del braccio 633. 642. D. G. 643. 647. A. C. 648 -- il collo 628. 630 -- dorso 655. 658 -- spalla, e scapula 631. 632 -- Ipocondrij 652. 653. A. C -- Ilei 659. 660 -- petto 649. 651. A. D -- specie meno pericolosa 624.
- Parto difficile per essere il cordone ombelicale troppo corto 547. 554 -- aiuto, e particolari cautele da prendersi 556. A. B. accidenti 555.
- Parto difficile a motivo, che il cordone sia attortigliato intorno al collo del feto 544 -- mezzi per rimediarvi 546. A. C. 547. 548. n. 1. 3. 549. A. C. 550. A. C. 551. A. E. 552. A. D -- segni incerti 545. A. C.
- Parto difficile a causa delle diverse maniere colle quali esce il cordone 674. A. C -- mali che ne resultano 675. 676 -- mezzo 677. 679.
- Parto difficile per cagione che l'osso del coccige, e l'osso sacro fossero troppo piegati per l'indentro 500 -- rimedj 501.
- Parto difficile a cagione delle convulsioni, che sopraggiungono alla partorientente 690 -- Cause 691. 693. 694 -- effetti 696 -- diversi gradi 697. n. 1. 5 -- aiuti 698. A. F. 699. 700 -- segni 695 -- soggetti 690. 692.
- Parto difficile a cagione dell'emorragia che sopraggiunge 680 -- diverse, e frequentissime cagioni 688. A. C. 680 -- rimedj e precauzioni 685. A. C. 686. A. F. -- diversi metodi per rimediarvi 687. A. C -- origine certa e incerta 682. 683 -- prognostico nel maggiore, e minor caso 684. A. B. -- sintomi 681. A. F.
- Parto difficile per essere il perineo e la vagina più stretti del consueto 464 -- evento dubbio se si lasci operare alla natura 497 -- aiuti prima che il capo comprima fortemente il perineo 498. A. I -- quando il capo è arrestato nella cavità della pelvi 499. A. B -- segni 496. A. F --
- Parto difficile per vizio o dell'utero, o della vagina; tre specie di questo: prima se lo sfintere dell'utero ritarda l'uscita del feto 571 -- cagioni 572. 463 -- operazioni 574. 575 -- seconda specie se la vagina, o l'utero calano 576 -- cagioni 577. A. D. 578. A. C -- quali mali ne nascono 580 -- aiuti 581. A. G. 582. A. B -- segni 589 -- terza specie, se l'utero si rovescia 583 -- rimedj 586. 587. A. G -- origine 584. A. B -- segni 585. A. C.
- Parto difficile per i vizj, o nel corpo del feto, o nell'utero 543.
- Parto facile 211 -- sul principio di esso cosa si debba fare 264 -- laborioso, o difficile 212. 215 -- si deve effettuare, o sul letto, o sulla sedia 282. 302 -- naturale, e suoi requisiti 113. 214 -- perchè si scioglie dopo nove mesi 114. 217. 218 -- di nove mesi e di dieci 223 -- sempre faticoso 210 -- condizioni, che lo rendono perfetto 216. n. 1. 14. 217. 218. 225. 231. 239. 242. 246. 249 -- periodi 196 -- segni, che lo annunziano 165. 166. 174. 176. 466. n. 1 -- segni nell'istante, che accade 178. 184 -- non maturo 222. 324.

- 716 -- preternaturale 213. 215. 391 -- prolungato 341 -- tardivo 223. 324 -- varietà secondo gli antichi 250.
- Parto dei gemelli, 701 -- non è da temersi quanto si crede 709 -- non suol'essere maturo 706 -- migliore del parto semplice 708 -- come debba effettuarsi 710 -- se il feto è mal situato 712. 713 -- segni dubbj 702. 705 -- segni di un' altro feto ; e precauzioni da averfi dall' operatore 710. 711. 713.
- Pelvi : articolazione dei suoi ossi 16 -- unione 17 -- discostamento 24. 29 -- immobilità 18 -- niuna forza nel parto è capace di rompere queste articolazioni 21 -- possono rompersi per violenza esterna 20. 23 -- non si distaccano 19 -- possono separarsi 22 -- si afferma , e si nega la loro separazione 15.
- Pelvi 1. la di lei troppa strettezza 225. 325 -- apertura inferiore 4. 10 -- superiore 38 -- Affe. 5. 6 -- circonferenza 3. 4 -- diametro 3. 4. 8. -- figura 225 -- formata bene 7 -- virile 7 -- viziosa 12. 14. 415. 417.
- Perforatorio 732. 434. 442 C -- cautele per adoprarlo 443. A. E.
- PETIT Professore 438. n. 2.
- Petto : sue malattie 238. C. 334. n. 1.
- Piedi : loro tumori 238. F. 334. n. 3.
- Placenta 153. 69. 157. 318. 680 -- quando è ancora attaccata , come condursi 350. A. C. D. -- propria di ciascun feto 712 -- deve seguirlo il feto 230 -- in quali casi si deve estrarre a pezzi 355 -- come si deve estrarre quando è rotto il tralcio 358 -- non sempre esce quando si tira il cordone 347. A. E -- quando non si deve tirare 438. n. 1. 3. 449. A. C -- se è attaccata in altra parte fuori che al fondo dell' utero , che debba farsi 357 -- se resta nell' utero 337 -- differenza dell' utero 359 -- mali prodotti dalla sua violenta estrazione 360. A. E -- maniera di estrarla 322. A. F. 449. A. B -- ottimo metodo per tirarla fuori 360 -- altre maniere 365. n. 1. 3 -- adesione con l' utero 70 -- cosa debbasi fare quando ne sia restata porzione nell' utero 354. 369 -- naturale discesa nella vagina 345 -- mali che cagiona quando resta nell' utero 352. A. C -- casi di scioglierla con arte 246 -- tre casi nei quali bisogna staccarla 343 -- suo distaccamento in caso di aborto 733. A. B -- distaccamento naturale 344 -- come devono estrarsi le placente unite , o disgiunte dei gemelli 714.
- PLEVIER Professore 672. C.
- Preparazione delle cose appartenenti al parto 273. 288.
- Primipare ; cura di esse 323. A. H -- Parti, che sogliono essere frequenti 422 -- strettezza grande del perineo combinata con quella della vagina 494. 495.
- PUGHIO Professore 438. n. 5.
- PUISSEAU Autore 438. n. 1.
- Pulizia nel parto 397. A. C.
- PUZOS Professore 687. C.

R

RATHLAW Professore 438. n. 2. 672. C.

- RHODIONE Professore 300. n. 1.
 Riscontro del basso ventre 465. n. 1.
 Riscontro 253. 257. 307 -- da farsi alla Donna nel letto ; in quella
 che siede , e che sta in piedi , 259. 262. 426.
 ROONHUYSEN Professore, 438. n. 2. 485. C. 672. C.
 RUFFIO Autore 300. n. 2. 438. n. 1.

S

- Sanità della madre 231 -- se la di lei età apporti qualche giovamento
 al parto 232.
 Scalpello 442. B.
 SCHLICHTING Autore 438. n. 2.
 SCHLICHTZ Professore 395. C
 SCHURER Autore 444. B.
 Seconde 197.
 Sedia per partorire 298. 299. 396. A. C -- diverse specie 300. 301.
 303. 396. D.
 SIEGMUNDIN Scrittore 300.
 SIMPSON Professore 442. C.
 SLEVI Professore 438. n. 1.
 SMELLIE Professore d' Ostetricia 438. n. 4. 442. 2. 446. G. 672. D.
 SOUMAIN Autore 438. n. 2.
 STERREN (VANDER) Professore 672. C.

T

- Tinca, bocca di ec. 35.
 Tira testa 442. B. 672. A.
 Trapano 442. D.
 Tumori dell' intestino retto 243. B.

V

- Vagina 39 -- attaccata ec. 243. D -- suo asse 44 -- suo stato nei primi
 mesi della gravidanza, e avanti il parto 87 -- dilatare , e ungere si
 deve il di lei orifizio 404. C. F -- prolusso 243. F -- tumori 243. E.
 WALBAUM Professore 442. A. 444. D. 642. G.
 WALDGRAVE Autore 672. C.
 Varici 238. E. 334. n. 4.
 Vedove: loro maniera d' ingannare, e imposturare 218.
 Vergine; suo primo commercio 118 -- concepimento succeduto sen-
 za abolizione dell' imene 119.
 Verginità 117 -- segni di essa perduta, 120. 122. 125.
 Vernice che cuopre il corpo del feto 194.
 Vescica dell' umore dell' amnio 467. n. 2. 3.
 Vescica urinaria , e suoi tumori 243. B.
 VIDENMANNIN Professore 300.
 Umore dell' amnio 180. 194. 309. 467. n. 4. 5.
 Uncini 442. 446. F. G -- loro incomodi 448.

VOELTERS Professore, 300. n. 5.

Uovo, suo umore 72. 73 -- unione con l' utero 70 -- proprio di ciascun feto 71 -- maniera di estrarlo nell' aborto 735. C --- tuniche 68.

Utero gravido 49 -- salita. 61 -- deve essere nell' asse della pelvi 226 -- in qual maniera ed a qual punto si contragga, 94 103. 104 -- si contrae più velocemente, o più a lungo, o più tardi, e con più di forza 100. 108 -- dopo il parto 199 -- cresce successivamente 53 -- differiscasi l' operazione quando è infiammato 400 -- circa la metà del terzo mese si colloca sopra l' apertura della pelvi 57 -- facendosi più grave 56 -- nel principio non si muta 51 -- si allarga dall' uovo 67 -- non lo comprime 68 -- supera la capacità della pelvi 57 -- deve ripulirsi 369 -- dove si può rompere 65. 459. n. 2. 461. n. 1 -- sua rottura, e sue cagioni 762. A. D -- stimolo insolito di esso 52.

Utero gravido attaccato da ascesso 768 -- suoi aiuti 770 -- segni 769 -- La cavità dell' utero forma un sol canale con la vagina 112 -- Cavità elliptoidea 54 -- il suo collo non si muta sul principio 54 -- muta bensì nel terzo, e sesto mese 58. 59 -- corpi che può contenere, oltre l' embrione 737. A. B -- cresce di grossezza, e non diminuisce 62. 64 -- non diminuisce punto nel parto 66 -- maggiore è nel fondo, che nel corpo 65 -- cura che si deve avere 367. 368. A. E -- elasticità 95 -- fibre motrici, e loro strati longitudinali, obliqui orbiculari, e trasversali 95. 99 -- maniera di contrarsi e loro forza 100. 102 -- la figura esterna simile all' interna 55 -- figura interna nel sesto mese 59 -- il fondo si muta, e si dilata 53. -- segni della cancrena 461. 402 -- d' infiammazione 400 -- cause della di lui obliquità quando è gravido 449. 450. A. E -- semplice, o unita ad altri vizj 451 -- segni più generali della sua obliquità nel tempo della gravidanza 465. n. 1. 4 -- quando si avvicina il parto 467. n. 1. 7 -- ha varj eventi allorchè non gli si appresti alcun rimedio 477- 480 -- differenti specie di obliquità nel tempo della gravidanza 456 -- prima specie 457. 467. n. 3 -- seconda 458. 459. n. 1. 2 -- terza 460 461. n. 1. 3 -- quarta 470. A. G -- quinta 471. A. F. 472. 473. A. B -- sesta 474. -- settima 475. 476. A. C -- le specie intermedie composte nascono dalle quattro primarie 469 -- ciascuna specie richiede le sue cautele 490. A. B. 491. A. C -- qual sia la peggiore di queste specie 481. 502 -- mai si deve abbandonare alla sola natura 481 -- ciò che deve fare l' operatore in questa specie, avanti, e dopo che è perduto l' umore dell' amnio 483. A. D. 485. A. C -- come farsi l' operazione di questa specie 503. 504. A. D -- sue difficoltà 503. A. D. L' orifizio dell' utero gravido si dilata prima che la parte media del collo 60 -- difficoltà di sentirlo 90 -- le sue labbra si mutano in vari modi 61 -- sua mutazione nel sesto mese 59 -- suo stato non inganna dopo il quinto mese 159 -- tumore di esso orifizio 243. A. 339. n. 1 -- non potendosi dilatare cosa si debba fare 353 -- come dilatarlo con l' arte 351. 404. F. -- si dilata dall' umore dell' amnio 109 -- lacerato, o riattaccato 243. C -- più grosso e più molle alla fine del terzo mese 57. 58 -- voltato posteriormente 465. n. 3 -- discende più oltre


oltre nella vagina 56 -- prolasso 243. F. 368. D -- sua rottura è mortale , e luogo ove succede , segni , e maniera di rimediarvi 763. 765. 766. 707. n. 1. 2. 764. A. E -- segni del suo stato in salute 369 -- segmento inferiore 58 -- situazione nel parto perfettissimo 26 -- condizione de suoi vasi 63 -- contrazione , ed emorragia che cagiona 200 -- dilatazione dei medesimi 53.
 Utero nello stato di verginità 33 -- suo asse 14. 43 -- collo 38 -- corpo 37 -- figura 33. 40 -- fondo 36 -- labbra 48 -- orifizio , e sua rima trasversale 35. 46. 47 -- situazione 33 -- sostanza 45.

I L F I N E.




177
The first of these is the fact that the
the second is the fact that the
the third is the fact that the
the fourth is the fact that the
the fifth is the fact that the
the sixth is the fact that the
the seventh is the fact that the
the eighth is the fact that the
the ninth is the fact that the
the tenth is the fact that the

178



Tab. I.

V. sc.



Tav. II.

Fig. 1. C





Fig: 2





Tav. III.






MC. sc.







Tav. IV.



Msc.




Tav. VI.

Fig. 1.



Fig. 2.




Matteo Carboni sc.




Tav. VII.

Fig. I.




Ms.



Tav. VIII.



M. Sc.






Fig. 1.




Fig. 2.



Fig. 2.




Fig. 1.



Fig. 3.



Fig. 4.



Fig. 2.



Fig. 5.





Fig. 1.



Fig. 2.



Fig. 3.



Fig. 4.








Fig. I.



Fig. II.



11. 11.



11. 11.

11. 11.

Fig. II.



Fig. III.




Fig. IV.




Fig. I. I. $\frac{1}{2}$ P.






Fig. I.




Fig. II.









Fig. III.



M. J.





T. 100



